

Apovit® B-combin stærk, filmovertrukne tabletter

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Apovit® B-combin stærk uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Apovit® B-combin stærk.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Apovit® B-combin stærk
3. Sådan skal du tage Apovit® B-combin stærk
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Apovit® B-combin stærk er et B-vitaminprodukt til forebyggelse og behandling af B-vitaminmangel.

Lægen kan have givet dig Apovit® B-combin stærk for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Apovit® B-combin stærk

Tag ikke Apovit® B-combin stærk hvis du:

- er overfølsom over for calciumpantothenat, nicotinamid, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin og thiaminhydrochlorid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- har en leversygdom
- har mavesår

Vær ekstra forsigtig med at tage Apovit® B-combin stærk

Apovit® B-combin stærk skal anvendes med forsigtighed, hvis du:

- har sukkersyge
- har galdevejslidelser
- har urinsur gigt
- tidligere har haft gulsot, en leversygdom eller mavesår

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Apovit® B-combin stærk.

Vær opmærksom på at Apovit® B-combin stærk kan misfarve urinen.

Alkohol kan hæmme optagelsen af B₁-vitamin (thiamin).

Brug af anden medicin

Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder:

- medicin mod sukkersyge (i tabletform)
- medicin for Parkinsons syge (levodopa)
- medicin mod kræft (cisplatin)

Fortæl det altid lægen eller på apoteket hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må gerne tage Apovit[®] B-combin stærk i de anbefalede mængder.

Amning

Du må gerne tage Apovit[®] B-combin stærk. Nedsat mælkeproduktion kan forekomme.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Apovit[®] B-combin stærk
Apovit[®] B-combin stærk indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Apovit[®] B-combin stærk

Tag altid Apovit[®] B-combin stærk nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 – 3 tabletter daglig. Drik et glas vand til.

Apovit[®] B-combin stærk bør ikke anvendes til børn under 2 år.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Kontakt lægen.

Hvis du har taget for mange Apovit[®] B-combin stærk

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Apovit[®] B-combin stærk, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Tegn på at du har taget for mange Apovit[®] B-combin stærk kan være føleforstyrrelser, røde prikker på huden, kvalme, opkastninger og diaré, forandringer i øjets nethinde og/eller skade på leveren.

Hvis du har glemt at tage Apovit® B-combin stærk

Hvis du har glemt en dosis, kan du tage den, så snart du kommer i tanke om det.

4. Bivirkninger

Apovit® B-combin stærk kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 1.000 behandlede):

Påvirkning af følesans på hænder og fødder, kvalme, forværring af mavesår.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 10.000 behandlede):

Hovedpine, mavepine, diaré, svimmelhed, søvnløshed, kraftsløshed, irritabilitet, sløret syn, lysfølsomhed, forværring af uren hud, udslæt og rødmen, brystspænding og brystforstørrelse, påvirkning af mælkeproduktion ved amning. Forhøjet glukose i blodet.

Tal med apoteket eller lægen hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "bivirkninger" på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Apovit® B-combin stærk utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Apovit® B-combin stærk over 25 °C.

Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Apovit® B-combin stærk indeholder

Aktive stoffer: Calciumpantothenat, nicotinamid, pyridoxinhydrochlorid (vitamin B₆), riboflavin (vitamin B₂) og thiaminhydrochlorid (vitamin B₁).

Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose (E 464), lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), propylenglycol (E1520), riboflavin (E101) og talcum (E 553b).

Farvestof: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Apovit® B-combin stærk er en rund, buet, gul tablet.

Apovit® B-combin findes i pakningsstørrelser à 100 og 250 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev senest godkendt november 2009