

Indlægsseddel
Information til brugeren
Leukeran® 2 mg filmoverttrukne tabletter
Chlorambucil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
Lægen har ordineret Leukeran til dig personligt. Lad derfor være med at give Leukeran til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Leukerans virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Leukeran
3. Sådan skal du tage Leukeran
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Leukeran
6. Yderligere oplysninger

1. Leukerans virkning og hvad du skal bruge det til
Leukeran hører til gruppen af lægemidler kaldet cytostatika, der virker ved at standse kræftcellers vækst.
Leukeran anvendes til behandling af visse kræftsygdomme.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Leukeran
Behandlingen bør forstås af en læge med særligt kendskab til din sygdom.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Leukeran,
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du er gravid.

Vær ekstra forsigtig med at tage Leukeran
Tal med lægen inden du tager Leukeran, hvis
- du for nylig har fået strålebehandling eller anden form for kemoterapi.
- du har nedsat nyre- eller leverfunktion.
- du eller din partner prøver at blive gravid.
- du tidligere har haft krampeanfald.

Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Tal med din læge, hvis
- du skal vaccineres. Der er visse vacciner du bør undgå, når du er i behandling med Leukeran.
- du tager medicin som indeholder fludarabin, pentostatin eller cladribin.

Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Du skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention under behandling med Leukeran.
Du må ikke bruge Leukeran, hvis du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Leukeran påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Leukeran
Leukeran indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Leukeran
Tag altid Leukeran nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.
Doseringen er individuel og afhænger af din sygdom.
Du skal synke tabletterne hele for at undgå hudkontakt med det aktive stof i Leukeran.
Tabletterne bør tages daglig på tom mave (mindst én time før eller tre timer efter et måltid).
Hvis du har taget for meget Leukeran
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Leukeran end lægen har foreskrevet.

ASPEN Artwork Panel			
AW Version: 1		Page: 1 of 2	
New Item Code: 7312966-5783			
Replacement: 7312966-5115			
Market: Denmark-DNK; Iceland-ISL			
Product Name: Leukeran 2mg			
Number of Colours: 2			
Colour Format: Process & Spot			
Black	PMS 2572		
Manufacturing Site: Excella			
Drawing Ref. Number: 148 x 315 2-pg V01			
Originated by: Bernard Sundanum			
Originated at: HM Outsourcing			
Originated on: 24-JULY-2012			
Amended on: NA			

ASPEN Artwork Panel • March 2012 • Version 2

160 mm Measuring Bar

ASPEN Signature Panel	
Artwork Studio's Check:	
Date	Signature
Proof Reader's Check:	
Date	Signature
Technical Site Check:	
Date	Signature
Market Approval:	
Date	Signature

Overdosering kan medføre irritabilitet, rastløshed, manglende evne til at koordinere kroppens bevægelser og voldsomme krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Leukeran
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Leukeran
Du bør ikke stoppe eller ændre på behandlingen uden samråd med lægen.
Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger
Leukeran kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelig (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): Nedsat antal af blodlegemer og undertrykkelse af knoglemarven som kan medføre almen sløvhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt infektioner - kontakt straks læge.

Almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Leukæmi kan opstå efter lang tids brug, blodmangel, krampeanfald (især hos børn), kvalme, opkastning, diarré og mundsår.

Ikke almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hududslæt.

Sjælden (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Nældefeber, hævelse af ansigt, hals og læber, blæreformet udslæt og betændelse i huden ledsaget af feber (Stevens-Johnson syndrom) - kontakt straks læge, kraftig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse) - kontakt straks læge, leverpåvirkning, gulsot og feber.

Meget sjælden (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Vedvarende undertrykkelse af knoglemarven, bevægelsesforstyrrelser, nervesygdom som kan medføre prikkende fornemmelser eller følelsesløshed i hænder og fødder, åndenød pga. øget bindevæv i lungerne (lungefibrose) - kontakt læge, tør hoste pga. betændelse i lungernes bindevæv - kontakt læge, blærebetændelse.

Hyppighed ukendt: Manglende menstruation, dårlig sædkvalitet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Sådan opbevarer du Leukeran
Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares i køleskab (2°C – 8°C)
Brug ikke Leukeran efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger
Leukeran indeholder
Aktivt stof: Chlorambucil.
Øvrige indholdsstoffer: Vandfri lactose, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, stearinsyre, hypromellose, titandioxid (E171), jernoxid gult og rødt (E172), macrogol.

Leukerans udseende og pakningsstørrelse
Leukeran 2 mg er en brun, rund, filmovertrukket tablet. Tabletten er mærket "GX EG3" på den ene side og "L" på den anden.
Leukeran findes i brune tabletglas med børnesikret lukke med 25 tabletter.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen
Aspen Pharma Trading Limited
12/13 Exchange Place,
I.F.S.C.,
Dublin 1, Irland

Fremstiller
EXCELLA GmbH, Feucht, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 2012-07
Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk



7312966-5783



PHARMA CODE N°573

ASPEN Artwork Panel			
AW Version: 1		Page: 2 of 2	
New Item Code: 7312966-5783			
Replacement: 7312966-5115			
Market: Denmark-DNK; Iceland-ISL			
Product Name: Leukeran 2mg			
Number of Colours: 2			
Colour Format: Process & Spot			
Black	PMS 2572		
Manufacturing Site: Excella			
Drawing Ref. Number: 148 x 315 2-pg V01			
Originated by: Bernard Sundanum			
Originated at: HM Outsourcing			
Originated on: 24-JULY-2012			
Amended on: NA			

ASPEN Artwork Panel • March 2012 • Version 2

160 mm Measuring Bar

ASPEN Signature Panel	
Artwork Studio's Check:	
Date	Signature
Proof Reader's Check:	
Date	Signature
Technical Site Check:	
Date	Signature
Market Approval:	
Date	Signature