

## **Apovit® C-vitamin stærk syreneutral, tabletter 500 mg**

**Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.**

Du kan få Apovit® C-vitamin stærk syreneutral uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Apovit® C-vitamin stærk syreneutral.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

### **Indholdsfortegnelse**

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Apovit® C-vitamin stærk syreneutral
3. Sådan skal du tage Apovit® C-vitamin stærk syreneutral
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

#### **1. Virkning og anvendelse**

Apovit® C-vitamin stærk syreneutral bruges til forebyggelse og behandling af C-vitaminmangel.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

#### **2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Apovit® C-vitamin stærk syreneutral**

Tag ikke Apovit® C-vitamin stærk syreneutral hvis du:

- er overfølsom over for ascorbinsyre eller natriumascorbat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Apovit® C-vitamin stærk syreneutral
- har en sygdom, hvor der sker en ophobning af jern (C-vitamin øger optagelsen af jern)
- har tendens til nyresten
- har nedsat nyrefunktion
- har mangel på enzymet glucose-6-phosphat dehydrogenase

#### **Brug af anden medicin**

Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder:

- det jernbindende middel deferoxamin i de første 2 uger af behandlingen
- medicin, der hæmmer blodets evne til at størkne (f.eks. warfarin og phenprocoumon)

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

#### **Graviditet og amning**

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Du kan tage Apovit® C-vitamin stærk syreneutral under graviditet og når du ammer.

### **3. Sådan skal du tage Apovit® C-vitamin stærk syreneutral**

Voksne: 1 - 2 tabletter daglig. Drik et glas vand til.

Apovit® C-vitamin stærk syreneutral må ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

#### **Nedsat lever- og nyrefunktion**

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

#### **Har du taget for mange Apovit® C-vitamin stærk syreneutral?**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Apovit® C-vitamin stærk syreneutral, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tegn på overdosering kan være blæreirritation eller diare (set ved doser over 1 g C-vitamin). I sjældne tilfælde kan store doser C-vitamin medføre et forhøjet indhold af oxalat i urinen med risiko for dannelse af nyresten.

Efter pludseligt ophør med store doser C-vitamin kan der opstå C-vitaminmangel. Dette gælder også for spædbørn, hvis mødre har indtaget store doser under graviditeten.

#### **Har du glemt at tage Apovit® C-vitamin stærk syreneutral?**

Har du glemt en dosis Apovit® C-vitamin stærk syreneutral, skal du tage den så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, springes den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

### **4. Bivirkninger**

Apovit® C-vitamin stærk syreneutral kan, som al anden medicin, give bivirkninger. Der er ingen kendte bivirkninger ved nycoplus® C-vitamin stærk syreneutral.

Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "bivirkninger" på Lægemiddelstyrelsens netsted [www.laegemiddelstyrelsen.dk](http://www.laegemiddelstyrelsen.dk)

### **5. Opbevaring**

Opbevar Apovit® C-vitamin stærk syreneutral utilgængeligt for børn. Brug ikke Apovit® C-vitamin stærk syreneutral efter den udløbsdato, der står på pakningen.

### **6. Yderligere information**

Aflever altid medicinrester på apoteket.

**Apovit® C-vitamin stærk syreneutral tabletter 500 mg indeholder**

De virksomme indholdsstoffer er natriumascorbat og ascorbinsyre svarende til 500 mg C-vitamin. De øvrige indholdsstoffer er croscarmellosematrium, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse og mikrokrystallinsk cellulose (E 460).

**Udseende og pakningsstørrelser**

Apovit® C-vitamin stærk syreneutral er en hvid, oval, hvælvet tablet med delekærv på den ene side.

Apovit® C-vitamin stærk syreneutral findes i pakningsstørrelser à 100 og 200 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

**Markedsføring i Danmark**

Nycomed Danmark ApS  
Langebjerg 1  
DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail [info@nycomed.com](mailto:info@nycomed.com)

**Revideret marts 2007**