

PHARMA CODE N° 909



10000000084083

Indlægsseddel Information til brugeren Kemadrin® 5 mg tabletter Procyclidinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Kemadrin til dig personligt. Lad derfor være med at give Kemadrin til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Kemadrins virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kemadrin
3. Sådan skal du tage Kemadrin
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Kemadrin
6. Yderligere oplysninger

1. Kemadrins virkning og hvad du skal bruge det til

Kemadrin er et antikolinergikum, der virker ved at hæmme ufrivillige bevægelser og muskelstivhed. Kemadrin anvendes til behandling af parkinsonisme (rystelammelse).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kemadrin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Kemadrin

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har ubehandlet grøn stær (snærvinklet glaukom).
- hvis du har problemer med at lade vandet og ikke modtager behandling for dette.
- hvis din mavetarmkanal er tilstoppet.

Vær ekstra forsigtig med at tage Kemadrin

- Din læge vil følge dig nøje
- hvis du lider af hurtig hjerterytme.
 - hvis du lider af for højt blodtryk.
 - hvis du er disponeret for at få grøn stær.
 - hvis du er disponeret for at få tilstopninger i mavetarmkanalen.
 - hvis du har problemer med at lade vandet pga. forstørret prostata.
 - hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 - hvis du er i behandling med lægemidler, som virker hæmmende på nervesystemet.

Kemadrin kan have en euforiserende effekt. Du må kun stoppe eller ændre behandlingen efter aftale med din læge.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Følgende lægemidler kan forstærke virkningen af Kemadrin

- monoaminooxidase-hæmmere (mod depression).
- antihistaminer (mod transportsyge og allergi).
- phentiaziner (mod psykoser).
- tricycliske antidepressiva (mod depression).
- paroxetin (mod depression).

Kemadrin kan påvirke effekten af

- levodopa (mod parkinson).
- metoclopramid (mod forstoppelse, kvalme og opkastning).
- quinidin (mod malaria).
- ketoconazol (mod svamp).

Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at justere dosis.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Kemadrin, og/eller Kemadrin kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom, så spørg lægen eller apoteket.

Brug af Kemadrin sammen med mad og drikke

Du kan tage Kemadrin sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Hvis du er gravid, må du kun tage Kemadrin efter lægens anvisning. Erfaringerne med Kemadrin er begrænsede. Du må derfor så vidt muligt ikke tage Kemadrin, hvis du ammer. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Kemadrin kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken.



PHARMA CODE N° 909

GlaxoSmithKline Artwork Information Panel	RSC A/W Version: 1
Item Number: 10000000084083	
Manufacturing Site: GSK-ContractMfg-Eur-Deu-Germany-Aspen-Bad Oldesloe	
Market or Pack Owner: Aspen; Denmark-DNK	
Market Trade Name: Kemadrin	
No. of Colours: 2 (does NOT include Varnish, if applicable)	
List Colours: (include sample in fields provided below; e.g. spot / spot-CMYK equivalent)	
K	C
Technical Reference No(s).: BE09_110X297 (do NOT include the technical reference doc[s] version no[s].)	
Artwork copyright is the property of the GlaxoSmithKline Group of Companies All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork. The distribution and use of fonts / software without a licence constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers. The GSK certification / audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.	
ATTENTION • ATTENTION	
To Ensure Accurate PDF Viewing and Printing: FOR SCREEN VIEWING: Use Adobe Acrobat 5 Professional or Adobe Acrobat Reader, Standard or Professional (higher than 5). Overprint Preview must be activated for accurate on screen viewing. FOR PRINTING: Use only Acrobat Professional version 5 or higher. “Apply Overprint Preview” or “Simulate Overprinting” must be activated in the print settings for printing accurate hard copies.	

180 mm Measuring Bar

If a status identification banner DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.

Aspen Bad Oldesloe Additional Information Panel
Replacement: 10000000045015

TYPE SIZE: 8/9.5
ORIZ. TYPE SCALE: 100%

FRONT PAGE

Page 1 of 2

PHARMA CODE N° 909



Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Kemadrin
Kemadrin tabletter indeholder laktose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Kemadrin

Tag altid Kemadrin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Voksne: Den sædvanlige startdosis er 2,5 mg 3 gange dagligt. Denne dosis øges hver 2.-3. dag med 2,5-5 mg dagligt indtil den ønskede virkning opnås. Den maksimale dagsdosis er 12 tabletter (60 mg).

Ældre: Det kan her være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Kemadrin tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Kemadrin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er uro, rastløshed, forvirring, søvnløshed, hallucinationer og hurtig hjerterytme. Pupillerne er ofte udvidede og langsomt reagerende.

Ved alvorlig overdosering er symptomerne sygeligt søvnbehov, bevidstløshed og koma.

Hvis du har glemt at tage Kemadrin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Kemadrin

Det er vigtigt, at du ikke pludseligt stopper behandlingen med Kemadrin fra den ene dag til den anden. Behandlingen afsluttes normalt ved gradvist at reducere dosis. Følg lægens anvisninger.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Kemadrin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Forstyrrelser iøjets evne til at indstille sig efter afstanden, mundtørhed, forstoppelse, vandladningsbesvær.

Ikke almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Svimmelhed, nedsat hukommelse, nedsat indlæringsevne, kvalme, opkastning, tandkødsbetændelse, udslæt, uro, angst, nervøsitet, forvirring, desorientering, hallucinationer.

Sjælden (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Psykotiske symptomer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Sådan opbevarer du Kemadrin

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Brug ikke Kemadrin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Kemadrin tabletterne skal senest anvendes 3 måneder efter åbning af tabletglasset. Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Kemadrin indeholder

Aktivt stof: Procyclidinhydrochlorid.
Øvrige indholdsstoffer: Laktosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (type A), povidon, magnesiumstearat.

Kemadrins udseende og pakningsstørrelse

Kemadrin 5 mg er en hvid, let buet tablet med delekærv og mærket "S3A" og "WELCOME".
Brunt tabletglas: 100 tabletter.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Aspen Europe GmbH
Industriestrasse 32-36,
D-23843 Bad Oldesloe
Tyskland

Fremstiller

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret August 2010



Yderligere information om Kemadrin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:
www.laegemiddelstyrelsen.dk

10000000084083



PHARMA CODE N° 909

GlaxoSmithKline Artwork Information Panel	RSC A/W Version: 1
Item Number: 10000000084083	
Manufacturing Site: GSK-ContractMfg-Eur-Deu-Germany-Aspen-Bad Oldesloe	
Market or Pack Owner: Aspen; Denmark-DNK	
Market Trade Name: Kemadrin	
No. of Colours: 2 (does NOT include Varnish, if applicable)	
List Colours: (include sample in fields provided below; e.g. spot / spot-CMYK equivalent)	
K	C
Technical Reference No(s): BE09_110X297 (do NOT include the technical reference doc[s] version no[s].)	
Artwork copyright is the property of the GlaxoSmithKline Group of Companies All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork. The distribution and use of fonts / software without a licence constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers. The GSK certification / audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.	
ATTENTION • ATTENTION	
To Ensure Accurate PDF Viewing and Printing: FOR SCREEN VIEWING: Use Adobe Acrobat 5 Professional or Adobe Acrobat Reader, Standard or Professional (higher than 5). Overprint Preview must be activated for accurate on screen viewing. FOR PRINTING: Use only Acrobat Professional version 5 or higher. "Apply Overprint Preview" or "Simulate Overprinting" must be activated in the print settings for printing accurate hard copies.	

180 mm Measuring Bar

If a status identification banner DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.

Aspen Bad Oldesloe Additional Information Panel
Replacement: 10000000045015

TYPE SIZE: 8/9.5
ORIZ. TYPE SCALE: 100%