

Atenet 50 mg og 100 mg tabletter

Atenolol

Læs denne information grundigt inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Atenet til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atenet
3. Sådan skal du tage Atenet
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atenet er et lægemiddel (betablokker), der virker på hjerte og blodkar.

Du kan bruge Atenet ved:

- forhøjet blodtryk
- uregelmæssig hurtig hjerterytme
- forebyggende behandling af hjertekrampe (angina pectoris)
- blodprop i hjertet
- forebyggende behandling efter blodprop i hjertet

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atenet

Tag ikke Atenet hvis du:

- har alvorlige sygdomme i hjerte og kredsløb
- har for lavt blodtryk
- har nedsat surhedsgrad i blodet
- har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger)
- har ubehandlet fæokromocytom (en svulst som hyppigst forekommer i binyrerne)
- er overfølsom over for det aktive stof eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer

Vær ekstra forsigtig med at tage Atenet

Tal med lægen hvis du:

- får meget lav puls når du tager Atenet
- lider af hvide "døde" fingre og tæer (Raynauds syndrom)
- har smerter, når du går (claudicatio intermittens)
- får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina)

- får allergiske reaktioner ved insektstik eller lignende
- har psoriasis
- har alvorligt nedsat nyrefunktion

Vær opmærksom på at:

- Atenet kan sløre tegn på lavt blodsukker; tal med lægen hvis du har diabetes eller du har fastet i lang tid
- hvis du skal bedøves, skal du oplyse lægen om, at du er i behandling med Atenet
- du altid ved blod- og urinprøvekontrol skal oplyse, at du er i behandling med Atenet

Du må ikke selv stoppe behandlingen med Atenet, da der vil være risiko for en pludselig stigning i blodtrykket, hjertekramper og blodprop i hjertet. I samråd med lægen skal du gradvist nedsætte dosis i løbet af 1 - 2 uger.

Brug af anden medicin

Anden medicin kan ændre virkningen af Atenet, eller Atenet kan ændre virkningen af anden medicin. Tal derfor med din læge, hvis du tager:

- medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedipin, kinidin, amiodaron, lidocain, methyldopa, hjerteglykosider)
- medicin mod migræne og hdestigninger (clonidin)
- smertestillende medicin (NSAID), (f.eks. ibuprofen, indometacin)
- insulin eller tabletter mod diabetes
- medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva)
- medicin mod epilepsi (barbiturater)
- medicin mod psykoser (phenothiaziner)
- kraftigt smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin)

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også lægemidler, som ikke er på recept, lægemidler købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Atenet sammen med mad og drikke

Du bør ikke tage Atenet i forbindelse med et måltid, da mad kan nedsætte virkningen af Atenet.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Du må ikke tage Atenet, hvis du er gravid, eller hvis du ammer. Lægen kan dog vurdere, at fordelene ved at tage Atenet er større end de risici, der er forbundet med behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Atenet kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Atenet

Tabletten synkes med rigelig væske; den kan eventuelt deles eller knuses.

Voksne:

Forhøjet blodtryk

50 - 100 mg 1 gang daglig.

Uregelmæssig hurtig hjerterytme

50 - 100 mg 1 gang daglig.

Forebyggende ved hjertekramper (angina pectoris)

50 - 100 mg 1 gang daglig.

Forebyggende efter blodprop i hjertet

Normalt 50 - 100 mg 1 gang daglig. Lægen kan vælge at ændre dosis.

Ved blodprop i hjertet

Dosis er individuel.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at begynde behandlingen med en lavere dosis. Følg lægens anvisning.

Børn:

Atenet bør ikke bruges til børn.

Nedsat nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at justere dosis ved alvorligt nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion: Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved nedsat leverfunktion.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Du bør kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Hvis du har taget for mange Atenet

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Atenet, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være meget langsom puls, svimmelhed, besvimelse, hjerterstop, vejrtrækningsbesvær, opkastning, blåfarvning af hud og slimhinder.

Hvis du har glemt at tage Atenet

Hvis du har glemt en dosis Atenet, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis springes den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Atenet

Efter langvarig behandling med Atenet må du kun stoppe behandlingen i samråd med lægen.

4. Bivirkninger

Atenet kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Langsom puls, kolde hænder og fødder, for lavt blodtryk, svimmelhed, kvalme, opkastning, diaré, forstoppelse, muskelsvaghed, træthed, øget svedtendens.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Søvnforstyrrelser, forhøjede levertal.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber (alvorlig), hallucinationer (alvorlig), psykoser (alvorlig), hjerteproblemer herunder bryst smerter og væskeophobning i arme og ben (alvorlig), leversygdom (alvorlig), vejrtrækningsbesvær hos astmapatienter (alvorlig), ændringer i blodets sammensætning, forværring af diabetes, mareridt, depression, forvirring, angst, svimmelhed, hovedpine, prikkende fornemmelse i huden, øjentørhed, synsforstyrrelser, forværring af gangudløste smerter i læggene, hvide "døde" fingre og tæer, mundtørhed, hårtab, udslæt, rødme, forværring af psoriasis, kløe, muskelspasmer, rejsningsbesvær.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Nedsat lyst til sex.

Hyppighed er ikke kendt

For lavt blodsukker, sløring af tegn på sygdom i skjoldbruskkirtlen.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Atenet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Atenet efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Atenet 50 mg og 100 mg tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er atenolol. De øvrige indholdsstoffer er magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), natriumstivelsesglycollat, povidon (E 1201), pregelatineret majsstivelse, vandfri kolloid silica (E 551).

Udseende og pakningsstørrelser

Atenet er en rund, hvid/cremehvid, hvælvet tablet med delekærv og mærket henholdsvis ATENOLOL 50 og ATENOLOL 100.

Atenet 50 mg og 100 mg fås i pakningsstørrelser à 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Kontakt Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com hvis du har yderligere spørgsmål.

Revideret september 2008