

Brintoverilte DAK koncentrat til kutanopløsning 3%

Læs denne information godt igennem før De begynder at bruge medicinen

- De kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning skal De altid følge vejledningen i denne information.
- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Brintoverilte DAK
3. Sådan skal De bruge Brintoverilte DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

Brintoverilte DAK koncentrat til kutanopløsning 3% indeholder:

Det virksomme indholdsstof i Brintoverilte DAK er hydrogenperoxid 30 mg/g.
De øvrige indholdsstoffer er phenacetin og rensat vand.

Markedsføring i Danmark

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Pharma AS
Postboks 1540
N-2409 Elverum

1. Virkning og anvendelse

Brintoverilte DAK er en klar, farveløs væske. Brintoverilte DAK er desinficerende og kan fjerne småpartikler i sår.

De kan bruge Brintoverilte DAK til rensning af sår og til skylning af mund efter tandudtrækning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Brintoverilte DAK

Brug ikke Brintoverilte DAK hvis De er overfølsom over for hydrogenperoxid eller phenacetin.

Særlige forholdsregler

De må ikke bruge ufortyndet Brintoverilte DAK ved blærer eller rifter.

De må kun fortynde Brintoverilte DAK koncentrat med vand. Hvis De blander Brintoverilte DAK koncentrat med andre væsker, kan der opstå kraftige kemiske reaktioner. De skal opbevare Brintoverilte DAK i den originale flaske.

De må ikke bruge Brintoverilte DAK i længere tid, da brintoverilte kan beskadige huden og forsinke sårheling.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin i forbindelse med graviditet eller i ammeperioden.

Graviditet

De kan bruge Brintoverilte DAK under graviditet.

Amning

De kan amme, selv om De bruger Brintoverilte DAK.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brintoverilte DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Brintoverilte DAK bør ikke anvendes sammen med følgende desinfektionsmidler:

- chloramin (der dannes klor, som kan beskadige huden og er farligt at indånde)
- kaliumpermanganat (der opstår varme - som ved en forbrænding - der kan beskadige huden)

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis De bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også lægemidler, som ikke er på recept, lægemidler købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal De bruge Brintoverilte DAK

Til rensning af sår: Fortyndes i forholdet 1 : 3 dele vand.

Til skylning af mund efter tandudtrækning: Fortyndes i forholdet 1: 1.

Har De brugt en for stærk blanding af Brintoverilte DAK?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis De har brugt mere koncentreret Brintoverilte DAK, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Brug af for stærk blanding giver irritation og brænden i hud eller slimhinder med en hvid ætsskorpe. Smerten forsvinder i løbet af en time. Skyl med rigeligt, koldt vand.

4. Bivirkninger

Brintoverilte DAK kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Der er ingen alvorlige bivirkninger ved brug af Brintoverilte DAK.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Blegning af og en prikkende fornemmelse i det behandlede område.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
Eksem, luftfyldte blærer i ansigtet, og hvide pletter i huden.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
Allergiske reaktioner.

Endvidere er set mørke belægninger på tungeryggen, vævsbeskadigelse og forsinket heling af sår ved længere tids brug. Hyppigheden er ukendt.

Fortæl læge eller apotek hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under "bivirkninger" på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Opbevar Brintoverilte DAK utilgængeligt for børn.

Opbevar Brintoverilte DAK i originalflasken.

Anvend ikke opløsningen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Har De yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er De velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret juli 2005