

INDLÆGSSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Bromhexin DAK 0,8 mg/ml oral opløsning Bromhexinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer

Du kan få Bromhexin DAK uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Bromhexin DAK.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bromhexin DAK
3. Sådan skal du tage Bromhexin DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Bromhexin DAK virker slimløsnende og kan bruges ved hoste med sejt slim.

Når du tager Bromhexin DAK, vil der opstå en øget mængde slim i luftvejene, som kan hostes op.

Bromhexin DAK bruges endvidere ved tørre slimhinder i mund, svælg og øjne (Sjögrens syndrom).

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Bromhexin DAK for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT TAGE BROMHEXIN DAK

Tag ikke Bromhexin DAK:

- hvis du for nylig har hostet blod op
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for bromhexin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bromhexin DAK

Vær ekstra forsigtig med at tage Bromhexin DAK

Hvis du har mavesår eller sår på tolvfingertarmen.

Hvis du lider af epilepsi eller en leversygdom, må du kun tage Bromhexin DAK efter aftale med din læge.

Vær opmærksom på at Bromhexin DAK indeholder alkohol.

I meget sjældne tilfælde er der forekommet alvorlige hudreaktioner i forbindelse med anvendelse af slimløsnende medicin som Bromhexin DAK. Hvis du oplever ændringer i hud eller slimhinder, blæreformet udslæt og betændelse, eller kraftig afskalning eller afstødning af huden, skal du stoppe med at tage Bromhexin DAK og kontakte lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Bromhexin DAK indeholder alkohol. Du må ikke tage Bromhexin DAK, hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod infektion). Tal med lægen.

Tal med din læge hvis du tager anden medicin mod infektion (antibiotika)

Brug af Bromhexin DAK sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Bromhexin DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid må du kun tage Bromhexin DAK efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Bromhexin DAK, da bromhexin går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bromhexin DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Bromhexin DAK

Bromhexin DAK indeholder sorbitol. Kontakt lægen før du tager Bromhexin DAK oral opløsning, hvis lægen har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter.

Bromhexin DAK oral opløsning indeholder 4 vol% alkohol.

Ved behandling af hoste vil mængden af alkohol pr. dosis højst være 600 mg. Det svarer til 12 ml øl (5 vol.%) eller 5 ml vin (12 vol.%).

Ved behandling af Sjögrens syndrom vil mængden af alkohol pr. dosis højst være 1,2 g. Det svarer til 24 ml øl (5 vol. %) eller 12 ml vin (12 vol.%).

Bromhexin DAK indeholder konserveringsmidlet methylparahydroxybenzoat (E 218). Det kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. SÅDAN SKAL DU TAGE BROMHEXIN DAK

Hvis din læge har ordineret Bromhexin DAK til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Hoste

Voksne og børn over 10 år: 10 - 20 ml (8 - 16 mg) 3 gange daglig.

Børn 6 - 10 år: 5 - 10 ml (4 - 8 mg) 3 gange daglig.

Børn 2 - 5 år: 2,5 - 5 ml (2 - 4 mg) 3 gange daglig.

Sjögrens syndrom

Voksne: Op til 40 ml (32 mg) 3 gange daglig.

Du må kun bruge Bromhexin DAK til børn under 2 år efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er nødvendigt at ændre dosis. Tal med din læge om doseringen.

Hvis du har taget for meget Bromhexin DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Bromhexin DAK, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er kvalme og opkastninger.

Hvis du har glemt at tage Bromhexin DAK

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Bromhexin DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Kvalme, diare, opkastning, mavesmerter.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Svær åndenød.

Ikke alvorlige: Allergiske reaktioner

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk chock). Kan være livsfarligt. Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Ikke alvorlige: Hududslæt.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5.OPBEVARING

Opbevar Bromhexin DAK utilgængeligt for børn.

Brug ikke Bromhexin DAK efter den udløbsdato, der står på pakken.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Bromhexin DAK 0,8 mg/ml oral opløsning indeholder:

Aktivt stof: Bromhexinhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: ethanol 96 %, fortyndet saltsyre (E 570) og rensset vand.

Smagsstof: Levomenthol.

Sødestof: Sorbitol (E 420).

Konserveringsstof: Methylparahydroxybenzoat (E 218).

Udseende og pakningsstørrelser

Bromhexin DAK er en farveløs væske med lugt af menthol.

Bromhexin DAK, oral opløsning, findes i flasker med 150ml, 300 ml og 500 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Pharma AS

Solbærveien 5

N-2409 Elverum

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2011