

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Diazepam DAK 2 mg og 5 mg tabletter
Diazepam

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Diazepam DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diazepam DAK
3. Sådan skal du tage Diazepam DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Diazepam DAK er et lægemiddel, der tilhører gruppen af benzodiazepiner. Diazepam DAK har en angstdæmpende, beroligende og muskelafslappende virkning og bruges ved:

- angst og uro
- muskelstivhed og muskelsammentrækninger (spasticitet)
- behandling af alkoholabstinenser

Lægen kan have givet dig Diazepam DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DIAZEPAM DAK

Tag ikke Diazepam DAK, hvis du:

- er overfølsom over for diazepam, lignende stoffer (benzodiazepiner) eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- har ekstrem muskeltræthed (myasthenia gravis)
- har uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser under søvn (søvnapnø)
- har alvorligt nedsat leverfunktion
- har akut vejrtrækningsbesvær

Vær ekstra forsigtig med at tage Diazepam DAK

Tal med lægen inden du tager Diazepam DAK, hvis du:

- har vejrtrækningsbesvær
- har eller har haft et alkohol- eller medicinmisbrug
- har selvmordstanker

Du kan udvikle psykisk eller fysisk afhængighed eller opleve, at virkningen af medicinen aftager. Dette er især set ved høje doser, ved længerevarende behandling, ved epilepsi,

eller hos personer, som har et alkohol- eller medicinmisbrug. Behandlingen bør derfor være så kortvarig som mulig (normalt 8-12 uger), og lægen bør regelmæssigt følge din tilstand.

Pludseligt ophør med behandlingen kan give abstinenssymptomer (se "Hvis du holder op med at tage Diazepam DAK").

Især hos ældre og børn er der set bivirkninger som rastløshed, mareridt og ophidselse. Hvis dette forekommer, bør behandlingen ophøre. Kontakt din læge.

Hvis du skal opereres, er det vigtigt, at du fortæller lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Diazepam DAK, da det kan påvirke virkningen af bedøvelsen.

Under behandling med især høje doser kan du opleve hukommelsestab. Tal med din læge.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller på apoteket hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder ved:

- medicin mod for megen mavesyre, mavesår (omeprazol, cimetidin)
- medicin mod tuberkulose (rifampicin)
- medicin mod HIV infektion (atazanavir, ritonavir)
- medicin mod svamp (fluconazol, itraconazon, ketoconazol)
- muskelafslappende medicin (suxamethon)
- medicin mod allergi og køresyge (antihistaminer)
- medicin mod psykiske lidelser, sovemedicin eller beroligende medicin
- medicin mod epilepsi (phenytoin, carbamazepin, phenobarbital)
- medicin mod psykoser (clozapin)
- medicin mod depression (fluvoxamin)
- stærk smertestillende medicin (morfin eller morfinlignende medicin)
- medicin mod astma (theophyllin)
- medicin mod alkoholmisbrug (disulfiram)

Brug af Diazepam DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Diazepam DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Når du behandles med Diazepam DAK bør du helt undgå alkohol, grapefrugt og grapefrugtjuice, da det kan påvirke medicinens virkning.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Diazepam DAK efter aftale med din læge. Hvis du planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge, hvordan du afslutter behandlingen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Diazepam DAK, da diazepam går over i modermælken. Tal med lægen

Trafik- og arbejdssikkerhed Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Diazepam DAK kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad vær med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Diazepam DAK

Diazepam DAK indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager medicinen, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DIAZEPAM DAK

Tag tabletterne med rigelig væske. Du kan eventuelt knuse dem. 5 mg tabletterne kan deles.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 2 – 5 mg 3 gange daglig. Den maksimale døgndosis er 30 – 40 mg.

Hvis du er overvægtig, kan der gå længere tid før optimal virkning indtræder og tilsvarende længere tid før den aftager.

Ældre: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Børn: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion: Det er ikke nødvendigt at ændre dosis.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller afslutning af behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Diazepam DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Diazepam DAK end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering ses oftest som nedsat vejrtrækning, usikre bevægelser, sløvhed og sløret tale. I sjældne tilfælde ses også alvorligere tilstande som koma, lav legemstemperatur, for lavt blodtryk og langsom puls.

Hvis du har glemt at tage Diazepam DAK

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Diazepam DAK

Du må kun afbryde eller afslutte behandlingen efter aftale med din læge. Du må ikke pludseligt holde op med at tage Diazepam DAK, da du kan få abstinenssymptomer (som f.eks. angst, panik, hjertebanken, svedudbrud, rysten, mave-tarmforstyrrelser, irritabilitet, vrede, følelsepåvirkninger, utilpashed og appetitløshed) samt få en forbigående forstærket oplevelse af de symptomer, der førte til behandlingen. Du bør derfor altid nedtrappe behandlingen gradvist.

Hos personer, der tidligere har haft krampeanfald, eller har epilepsi, kan pludseligt ophør med behandlingen desuden medføre alvorlige langvarige krampeanfald.

4. BIVIRKNINGER

Diazepam DAK kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):
Døsighed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Usikre bevægelser, nedsat bevægelsesevne, abstinenser ved ophør af behandlingen som kommer til udtryk ved angst, panik, hjertebanken, svedudbrud, rysten, mave-tarmforstyrrelser, irritabilitet, aggressiv adfærd, forstyrret sanseopfattelse, muskelkrampe, utilpashed (appetitløshed, forfølgelsesvanvid, vrangforestillinger, epileptiske anfald), træthed, forvirring.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Hæmmet vejtrækning og blåfarvning af læber og negle (alvorlig), hukommelsestab, koncentrationsbesvær, balancepåvirkning, svimmelhed, hovedpine, sløret tale, mave-tarmforstyrrelser, kvalme, opkastning, forstoppelse, diaré, øget mængde spyt i munden, allergiske hudreaktioner (kløe, eksem, udslæt), muskelsvaghed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Bevidstløshed (alvorlig), vejtrækningsstop (alvorlig), gulsot (alvorlig). Truende/voldelig adfærd og hallucinationer (kan blive alvorlig). Søvnløshed, forstørret brystkirtel hos mænd, øget slimdannelse fra lunger, ophidselse eller pirrelighed, hukommelsestab og mareridt.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Pludselig alvorlig allergisk reaktion som ses ved hududslæt kombineret med åndedrætsbesvær og besvimelse (kan være alvorlig).

Hyppighed er ukendt: Sløret syn eller dobbeltsyn, rykvisse øjenbevægelser (forsvinder efter endt behandling).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Diazepam DAK utilgængeligt for børn.

Brug ikke Diazepam DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Diazepam DAK 2 mg og 5 mg tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er diazepam. De øvrige indholdsstoffer er gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b) og talcum (E 553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Diazepam DAK 2 mg er runde, hvide tabletter uden delekærv.

Diazepam DAK 5 mg er runde, hvide tabletter med delekærv.

Diazepam DAK 2 mg findes i pakningsstørrelser à 25 og 100 stk.

Diazepam DAK 5 mg findes i pakningsstørrelser à 10, 50 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret oktober 2010