

## INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

**Lamotrigin Pfizer 25 mg tabletter**  
**Lamotrigin Pfizer 50 mg tabletter**  
**Lamotrigin Pfizer 100 mg tabletter**  
**Lamotrigin Pfizer 200 mg tabletter**

lamotrigin

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Lamotrigin Pfizer til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

### **Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Lamotrigin Pfizer
3. Sådan skal De tage Lamotrigin Pfizer
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

## **1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

Lamotrigin tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antiepileptika. Det anvendes til behandling af to tilstande – **epilepsi** og **bipolar sygdom**.

**Lamotrigin Pfizer** virker mod epilepsi ved at blokere de signaler i hjernen, der udløser epileptiske anfald (kramper).

- Hos voksne og børn i alderen 13 år og derover kan Lamotrigin Pfizer anvendes alene eller sammen med anden medicin til behandling af epilepsi. Lamotrigin Pfizer kan også anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af de anfald, som opstår ved tilstanden kaldet Lennox-Gastauts syndrom.
- Til børn i alderen 2 – 12 år kan Lamotrigin Pfizer anvendes sammen med anden medicin til behandling af disse tilstande. Den kan anvendes alene til behandling af en form for epilepsi kaldet typisk absenceepilepsi.

### **Lamotrigin Pfizer virker også mod bipolar sygdom:**

Personer med bipolar sygdom (undertiden kaldet *maniodepressiv psykose*) har voldsomme humørsvingninger med maniske perioder (opstemthed eller eufori) skiftevis med perioder med depression (dyb nedtrykthed eller modløshed). Lamotrigin Pfizer kan anvendes alene eller sammen med andre lægemidler til at forebygge de perioder med depression, som opstår ved bipolar sygdom hos voksne i alderen 18 år og derover. Det vides endnu ikke, hvordan Lamotrigin Pfizer udøver denne effekt i hjernen.

## **2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE LAMOTRIGIN PFIZER**

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

**Tag ikke Lamotrigin Pfizer**

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for lamotrigin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se afsnit 6. Yderligere oplysninger).

Hvis dette gælder Dem, **skal De fortælle det til Deres læge** og lade være med at tage Lamotrigin Pfizer.

### **Advarsler og forsigtighedsregler**

#### **Vigtig information om potentielt alvorlige reaktioner:**

Et lille antal personer, som tager lamotrigin får en allergisk reaktion eller potentielt alvorlig hudreaktion, som kan udvikle mere alvorlige problemer, hvis de ikke behandles. De har brug for at kende de symptomer, som De skal se efter medens De tager Lamotrigin Pfizer

- **Potentielt livstruende hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse) er rapporteret ved anvendelse af lamotrigin, og ses først på kroppen som rødlige pletter eller som runde pletter (ofte med blærer i midten).**
- **Yderligere symptomer, man bør være opmærksom på, er sår i munden, i svælget, på kønsorganerne og øjenbetændelse (røde og hævede øjne).**
- **Disse potentielt livstruende hududslæt er ofte ledsaget af influenzalignende symptomer. Udslættet kan udvikle sig til udbredt blæredannelse eller afskalning af huden.**
- **Der er størst risiko for at udvikle alvorlige hududslæt i de første uger af behandlingen.**
- **Hvis De har udviklet Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ved behandling med lamotrigin, må De aldrig mere begynde at tage lamotrigin igen.**
- **Hvis De udvikler hududslæt eller de nævnte hudsymptomer, skal De straks søge læge. Fortæl lægen, at De tager lamotrigin.**

Se også afsnit 4 i denne indlægsseddel under ”Potentielt alvorlige reaktioner: søg lægehjælp øjeblikkeligt”.

#### **Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Lamotrigin Pfizer:**

- **hvis De har problemer med nyrerne**
- **hvis De nogensinde har fået udslæt mens De har taget lamotrigin eller andre lægemidler for bipolar sygdom eller epilepsi**
- **hvis De allerede tager medicin, som indeholder lamotrigin.**

Hvis dette gælder Dem, **skal De fortælle det til Deres læge**, som kan beslutte at nedsætte Deres dosis eller at Lamotrigin Pfizer ikke er hensigtsmæssig behandling for Dem.

### **Tanker om at skade Dem selv eller selvmord**

Midler mod epilepsi anvendes til at behandle forskellige lidelser, herunder epilepsi og bipolar sygdom. Personer med bipolar sygdom kan af og til tænke på at skade sig selv eller begå selvmord. Hvis De har en bipolar sygdom, er der større risiko for, De får disse tanker:

- Ved behandlingens start
- Hvis De tidligere har haft tanker om at skade Dem selv eller om selvmord
- Hvis De er under 25 år

Hvis De får ubehagelige tanker eller oplevelser, eller hvis De bemærker, at De får det dårligere eller udvikler nye symptomer, mens De tager Lamotrigin Pfizer:

- **Kontakt en læge hurtigt muligt eller tag til det nærmeste hospital for at få hjælp.**

Et lille antal personer, som er i behandling med midler mod epilepsi såsom lamotrigin har også haft tanker om at skade sig selv eller begå selvmord. Hvis De på noget tidspunkt får disse tanker, skal De straks kontakte lægen.

### **Hvis De tager Lamotrigin Pfizer mod epilepsi**

Kramperne i nogle typer epilepsi kan i nogle tilfælde blive værre eller forekommer oftere, men De tager Lamotrigin Pfizer. Nogle patienter kan få voldsomme epileptiske krampeanfald, som kan give alvorlige helbredsproblemer. Hvis De oftere får krampeanfald eller hvis De får alvorlige kramper, mens De tager Lamotrigin Pfizer:

- **Kontakt lægen så hurtigt som muligt.**

### **Lamotrigin Pfizer bør ikke gives til unge under 18 år til behandling af bipolar sygdom.**

Medicin til behandling af depression og andre psykiske problemer øger risikoen for selvmordstanker og -adfærd hos børn og unge under 18 år.

### **Brug af anden medicin sammen med Lamotrigin Pfizer**

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig eller starter med en ny medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler, vitaminer og mineraler.

Deres læge har brug for at vide, hvis De tager anden medicin til behandling af epilepsi eller psykiske problemer. Dette er for at være sikker på, De tager den korrekte dosis af lamotrigin. Den medicin omfatter:

- **Oxcarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramet eller zonisamid**, der anvendes til behandling af **epilepsi**
- **Lithium** eller **olanzapin**, der anvendes til behandling af **psykiske problemer**
- **Bupropion**, der anvendes til behandling af **psykiske problemer** eller til **rygeafvænning**

**Fortæl det til lægen**, hvis De tager nogle af disse.

Noget medicin påvirker Lamotrigin Pfizer, eller gør det mere sandsynligt, at De får bivirkninger. Den medicin omfatter:

- **Valproat**, der anvendes til behandling af **epilepsi** og **psykiske problemer**
- **Carbamazepin**, der anvendes til at behandle **epilepsi** og **psykiske problemer**
- **Phenytoin, primidol eller phenobarbital**, der anvendes til behandling af **epilepsi**
- **Risperidon**, der anvendes til behandling af **psykiske problemer**
- **Rifampicin**, som er et **antibiotikum**
- Medicin, der anvendes til at behandle **Humant Immundefektvirus (HIV)** (en kombination af lopinavir og ritonavir eller atazanavir og ritonavir)
- Hormonale **svangerskabsforebyggende** midler, såsom **p-piller** (*se nedenfor*).

**Fortæl det til lægen**, hvis De tager nogen af disse, eller hvis De begynder at tage eller holder op med at tage nogen af disse midler.

### **Hormonale svangerskabsforebyggende midler (såsom p-piller) kan påvirke effekten af Lamotrigin Pfizer**

Lægen kan anbefale, at De bruger en bestemt type hormonel prævention eller en anden type prævention, såsom kondomer, pessar eller spiral. Hvis De bruger en hormonel prævention som p-piller, kan lægen tage blodprøver for at kontrollere niveauet af Lamotrigin Pfizer i dit blod. Hvis De bruger eller planlægger at begynde at bruge et hormonelt svangerskabsforebyggende middel:

**Fortæl det til lægen**, som vil diskutere egnede præventionsmetoder med Dem.

Lamotrigin Pfizer kan også påvirke den måde hormonelle svangerskabsforebyggende midler virker på, selv om det ikke er sandsynligt, at de bliver mindre effektive. Hvis De bruger hormonel prævention, og hvis De bemærker nogen ændringer i dit menstruationsmønster, såsom gennembrudsblødning eller pletblødninger mellem menstruationerne:

**Fortæl det til lægen.** Dette kan være tegn på, at Lamotrigin Pfizer påvirker effekten af Deres p-piller.

### **Graviditet og amning**

Der er en øget risiko for fødselsdefekter hos spædbørn, hvis mødre har taget Lamotrigin Pfizer under graviditeten. Disse defekter inkluderer hareskår eller ganespalte. Lægen kan anbefale, at De tager ekstra **folinsyre**, hvis De planlægger at blive gravid samt under graviditeten.

Graviditet kan også påvirke effekten af Lamotrigin Pfizer, så De vil få taget blodprøver og Deres dosis af Lamotrigin Pfizer skal muligvis ændres.

**Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel. De bør ikke ophøre med behandlingen uden først at tale med lægen om det.** Det er særlig vigtigt, hvis De har epilepsi.

**Fortæl det til lægen, hvis De ammer eller planlægger at amme.** Det aktive stof i Lamotrigin Pfizer passerer over i modermælken og kan påvirke dit barn. Lægen vil tale med Dem om risikoen og fordelene ved at amme, mens De tager Lamotrigin Pfizer, og vil undersøge dit barn ind imellem, hvis De vælger at amme.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

**Lamotrigin Pfizer kan medføre svimmelhed og dobbeltsyn.**

**De må kun køre bil og betjene maskiner, hvis De er sikker på, De ikke er påvirket.**

**Hvis De har epilepsi, skal De tale med lægen om at køre bil og betjene maskiner.**

### **Lamotrigin Pfizer indeholder lactose og farvestoffer**

Lamotrigin Pfizer indeholder en lille mængde af en sukkerart, der kaldes lactose. Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

Lamotrigin Pfizer 100 mg tabletter indeholder sunset yellow FCF og orange yellow S, som kan give allergiske reaktioner.

## **3. SÅDAN SKAL DE TAGE LAMOTRIGIN PFIZER**

**Tag altid Lamotrigin Pfizer nøjagtigt efter lægens anvisning.** Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

### **Så meget Lamotrigin Pfizer skal De tage**

Det kan tage et stykke tid at finde den Lamotrigin Pfizer dosis, som passer til Dem. Den dosis, De tager, afhænger af:

- Deres alder
- Om De tager anden Lamotrigin Pfizer sammen med andre lægemidler
- Om De har problemer med nyrer eller lever

Lægen vil ordinere en lav dosis til at starte med og gradvis øge dosis i løbet af nogle få uger, indtil De når en dosis, som passer til Dem (også kaldet *den effektive dosis*). **Tag aldrig mere Lamotrigin Pfizer end lægen har foreskrevet.**

Den sædvanlige effektive dosis af Lamotrigin Pfizer til voksne og unge i alderen 13 år og derover er mellem 100 mg og 400 mg daglig.

Til børn i alderen 2 til 12 år afhænger den effektive dosis af deres legemsvægt – sædvanligvis er det mellem 1 mg og 15 mg for hvert kilo, barnet vejer. Den maksimale dosis er 400 mg daglig.

### **Brug til børn**

Lamotrigin Pfizer anvendes ikke til børn under 2 år

### **Sådan skal De tage Lamotrigin Pfizer**

Tag Deres dosis af Lamotrigin Pfizer en eller to gange daglig, som Deres læge har foreskrevet. Tabletterne kan tages sammen med eller uden mad.

Lægen kan også råde Dem til at starte eller stoppe med andre lægemidler, afhængig af hvilken lidelse, De behandles for, og hvordan De reagerer på behandlingen.

- **Synk tabletterne.** Tyg eller knus dem ikke.
- **Tag altid hele den dosis, som lægen har ordineret.**

### **Hvis De har taget for mange Lamotrigin Pfizer**

**Kontakt straks en læge, skadestuen eller et apotek,** hvis De har taget mere Lamotrigin Pfizer end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Medbring Lamotrigin Pfizer pakningen, hvis det er muligt.

Hvis De har taget for meget Lamotrigin Pfizer, kan der opstå et eller flere af følgende symptomer:

- Hurtige ukontrollerede øjenbevægelser (*nystagmus*)
- Klodsethed og manglende koordinationsevne, hvilket påvirker balancen (*ataksi*)
- Bevidstløshed eller koma

### **Hvis De har glemt at tage Lamotrigin Pfizer**

**De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.**

**Spørg lægen til råds om, hvordan De skal starte igen. Dette er vigtigt.**

### **De må ikke holde op med at tage Lamotrigin Pfizer uden rådgivning.**

Lamotrigin Pfizer skal tages så længe som lægen foreskriver. De må ikke stoppe med mindre lægen har anbefalet dette.

### **Hvis De tager Lamotrigin Pfizer for epilepsi**

Når De skal stoppe med at tage Lamotrigin Pfizer, **er det vigtigt, at dosis nedsættes gradvist** over ca. 2 uger. Hvis De pludselig stopper med at tage Lamotrigin Pfizer, kan Deres epilepsi vende tilbage eller forværres.

### **Hvis De tager Lamotrigin Pfizer for bipolar sygdom**

Der kan gå et stykke tid, før Lamotrigin Pfizer begynder at virke, og De vil ikke få det bedre med det samme. Når De stopper med at tage Lamotrigin Pfizer, er det ikke nødvendigt at nedsætte dosis gradvist. De skal dog tale med Deres læge først, hvis De vil holde op med at tage Lamotrigin Pfizer.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

## **4. BIVIRKNINGER**

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

### **Mulige alvorlige reaktioner: søg lægehjælp øjeblikkeligt**

Nogle få personer, som tager Lamotrigin Pfizer får en allergisk reaktion eller mulige alvorlige hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige og endda livstruende problemer, hvis de ikke behandles.

Det er mest sandsynligt, at disse symptomer forekommer i løbet af de første få måneder af behandlingen med Lamotrigin Pfizer, særlig hvis startdosis er for høj, hvis dosis øges for hurtigt, eller hvis Lamotrigin Pfizer tages sammen med anden medicin ved navn *valproat*. Nogle af symptomerne er mere almindelige hos børn, derfor skal forældre være særligt opmærksomme at se efter dem.

Symptomerne på disse reaktioner kan omfatte:

- **Hududslæt eller rødme**, som kan udvikles til alvorlige hudreaktioner herunder udbredt udslæt med blistre og afskalning af hud, som særligt forekommer omkring munden, næse, øjne og kønsorganer (*Stevens-Johnsons syndrom*), udbredt afskalning af huden (mere end 30 % af kroppens overflade – *toksisk epidermal nekrolyse*)
- **Ømhed ved mund eller øjne**
- **Høj temperatur** ((feber), influenzalignende symptomer eller sløvhed)
- **Hævelser i ansigtet** eller **hævede kirtler** på hals, i armhuler eller lyske
- **Uventede blødninger eller blå mærker** eller blåfarvning af fingre
- **Ømhed i halsen** eller flere tilfælde af infektioner (såsom forkølelse) end normalt

I mange tilfælde vil disse symptomer være tegn på mindre alvorlige bivirkninger. **Men De må være opmærksom på, at de muligvis er alvorlige og kan udvikle sig til mere alvorlige problemer**, såsom organsvigt, hvis de ikke bliver behandlet. Hvis De bemærker nogle af disse symptomer: **Kontakt straks lægen**. Lægen kan beslutte at udføre prøver af Deres lever, nyrer eller blod og kan tilråde, at De stopper med at tage Lamotrigin Pfizer.

### Meget almindelige bivirkninger

Disse forekommer hos **mere end 1 ud af 10** behandlede:

- Hovedpine
- Svimmelhed
- Træthed eller døsighed
- Klodsethed og manglende koordinationsevne (ataksi)
- Dobbeltsyn eller tågesyn
- Utilpashed (kvalme) eller opkastning
- Hududslæt

### Almindelige bivirkninger

Disse forekommer hos **op til 1 ud af 10** behandlede:

- Aggression eller irritabilitet
- Hurtige, ukontrollerede øjenbevægelser (nystagmus)
- Rystelser eller tremor
- Søvnproblemer
- Diarré
- Mundtørhed
- Træthed
- Smerter i ryg, led eller andre steder

### Sjældne bivirkninger

Disse forekommer hos **op til 1 ud af 1.000** behandlede:

- Kløende øjne med flåd og skorper på øjenlågene (konjunktivitis)
- **Potentielt livstruende hududslæt** (*Stevens-Johnsons syndrom*) **er rapporteret (se afsnit 2 og i starten af afsnit 4))**

### Meget sjældne bivirkninger

Disse forekommer hos **op til 1 ud af 10.000** behandlede:

- **Potentielt livstruende hududslæt** (*toksisk epidermal nekrolyse*) **er rapporteret (se afsnit 2 og i starten af afsnit 4)**
- Hallucinationer (De ser eller hører ting, som ikke er der)
- Forvirring og ophidselse
- Usikkerhed på benene ved bevægelse
- Ukontrollerede kropsbevægelser (tics), ukontrollerede muskelspasmer i øjne, hoved og overkrop, eller andre unormale kropsbevægelser som spjæt, rystelser eller stivhed
- Hyppigere krampeanfald *hos patienter, som allerede har epilepsi*
- Ændringer i leverfunktionen, hvilket kan ses i blodprøver, eller leversvigt

- Ændringer, der muligvis kan ses i blodprøver, herunder fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), fald i antallet af hvide blodlegemer (leukopeni, neutropeni, agranulocytose), fald i antallet af blodplader (trombocytopeni), fald i antallet af alle disse typer celler (plancytopeni) samt en knoglemarvslidelse, der kaldes plastisk anæmi
- Alvorlige problemer med blodets evne til at størkne, hvilket kan give uventede blødninger eller blå mærker (dissemineret intravaskulær koagulation)
- Høj legemstemperatur (feber)
- Hævelser i ansigtet (ødem) eller hævede kirtler på halsen, i armhuler eller i lysken (lymfadenopati)
- Forværring af symptomerne på Parkinsons sygdom hos patienter med denne lidelse.

### **Mulige ricisi for knoglelidelser**

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med Deres læge eller apotekspersonalet, hvis De er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.

### **Andre bivirkninger**

Andre bivirkninger er forekommet hos en lille gruppe af behandlede, men den nøjagtige hyppighed er ikke kendt:

- En samling af symptomer, der optræder samtidig, heriblandt:
  - feber, kvalme, opkastning, hovedpine, nakkestivhed og kraftig følsomhed over for skarpt lys. Dette kan være forårsaget af en betændelse af hinderne, som omgiver hjernen og rygmærven (*meningitis*)

### **Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen**

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk), eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

De

## **5. OPBEVARING**

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Lamotrigin Pfizer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## **6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger**

### **Lamotrigin Pfizer indeholder:**

- Aktivt stof: lamotrigin
- Hver tablet indeholder 25 mg lamotrigin  
Hver tablet indeholder 50 mg lamotrigin

Hver tablet indeholder 100 mg lamotrigin

Hver tablet indeholder 200 mg lamotrigin

- Øvrige indholdsstoffer: mikrokrySTALLinsk cellulose, lactosemonohydrat, natriumstivelsesglykolat (Type A), magnesiumstearat, povidon.

**100 mg tabletterne indeholder også sunset yellow FCF og orange yellow S (E110) og 200 mg tabletterne indeholder indigo indigotin I indigocarmin (E132).**

### **Udseende og pakningsstørrelser**

Tabletter

Lamotrigin Pfizer 25 mg tabletter er hvide til offwhite, skjoldformede ikke overtrukne tabletter mærket med "D" og "93" på den ene side og delekærv på den anden side. Tabletterne kan deles i to ens halvdele.

Lamotrigin Pfizer 50 mg tabletter er hvide til offwhite, afrundede firkantede ikke overtrukne tabletter mærket med "D" på den multifacetterede side og "97" på den flade side.

Lamotrigin Pfizer 100 mg tabletter er ferskenfarvede, marmorerede, skjoldformede ikke overtrukne tabletter mærket med "D" og "94" på den ene side og delekærv på den anden side. Tabletter kan deles i to ens halvdele.

Lamotrigin Pfizer 200 mg tabletter er blå, marmorerede, skjoldformede ikke overtrukne tabletter mærket med "D" og "96" på den ene side og delekærv på den anden side. Delekærven er kun til for at gøre tabletten lettere at dele og dermed lettere at synke. Den er ikke til for at dele tabletten i to lige store doser.

Lamotrigin Pfizer findes i:

- Klar PVC/Aluminiumfolie blister

Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 42, 46, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 200, 250, 500 tabletter.

- HDPE beholder med polypropylenlåg og bomuldsrulle

Pakningsstørrelser: 60, 90, 100, 250, 500, 1000 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### **Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Danmark.

### **Fremstiller**

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgien.

**Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Danmark        | Lamotrigin Pfizer  |
| Storbritannien | Lamotrigine        |
| Sverige        | Lamotrigin Pfizer  |
| Ungarn         | Lamotrigine Pfizer |

**Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2012**

**Se den nyeste indlægsseddel på: [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)**