

Felodipin EuroPharma 2,5 mg, depottabletter

Felodipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Felodipin EuroPharma til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Felodipin EuroPharma
3. Sådan skal du tage Felodipin EuroPharma
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Felodipin EuroPharma anvendes til behandlingen af forhøjet blodtryk.

Felodipin EuroPharma hører til lægemiddelgruppen calciumblokkere. Disse lægemidler udvider de små blodkar (arterier), hvorved blodtrykket nedsættes og hjertets pumpefunktion lettes.

Lægen kan have givet dig Felodipin EuroPharma for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FELODIPIN EUROPHARMA

Tag ikke Felodipin EuroPharma

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for felodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Felodipin EuroPharma eller lignende calciumblokkere (såkaldte dihydropyridiner).
- hvis du har haft et hjerteanfald indenfor de sidste 2 måneder.
- hvis du har hjerterelaterede smerter i brystet, også ved ingen eller minimal fysisk aktivitet (ustabil angina pectoris)
- hvis du har nedsat hjertefunktion, der ikke kan stabiliseres med medicinsk behandling (dekompenseret hjertesvigt).
- hvis du lider af utilstrækkelig blodforsyning til vævene. Symptomerne herpå kan være lavt blodtryk, lav puls, hurtig hjerterytme (schock, herunder akut hjertesvigt). Akut hjertesvigt er shock forårsaget af alvorlige hjerteproblemer.
- Hvis du har nedsat hjertefunktion, der ikke kan stabiliseres med medicinsk behandling (dekompenseret hjertesvigt)
- Hvis du har andre alvorlige hjertelidelser (F.eks. svært nedsat hjertefunktion, hjertemuselsygdom, eller alvorlige hjerteklaplidelser)
- hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion.
- hvis du er gravid.

Vær ekstra forsigtig med at tage Felodipin EuroPharma

Tal med lægen, inden du tager Felodipin EuroPharma hvis du har:

- nedsat hjertefunktion, der er stabiliseret.
- overledningsforstyrrelser i hjertet.
- hurtig hjerterytme.
- forsørvrede hjerteklapper i venstre hjertekammer.
- svært nedsat funktion af venstre hjertekammer.
- mild til moderat nedsat leverfunktion.
- alvorlig nedsat nyrefunktion.

Hvis behandlingen med felodipin afbrydes brat, kan det i sjældne tilfælde forårsage en stigning i blodtrykket.

Som andre lægemidler, der udvider blodkarrene (vasodilatorer), kan felodipin i sjældne tilfælde forårsage et betydeligt blodtryksfald ledsaget af hurtig hjerterytme (takykardi), der hos modtagelige personer kan medføre utilstrækkelig blodforsyning til hjertet (myokardieiskæmi). Dette kan forårsage et hjertetilfælde. Spørg lægen hvis du er i tvivl.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Tal med din læge, hvis du er i behandling med:

- Digoxin (hjertemedicin).
- Tacrolimus (anvendes efter organtransplantationer).
- Andre blodtryksnedsættende lægemidler, f.eks. betablokkere, ACE-hæmmere og vanddrivende medicin.
- Medicin mod depression.
- Cimetidin (mod mavesår).
- Erythromycin, clarithromycin, telithromycin (mod bakterieinfektioner).
- Rifampicin (antibiotikum mod tuberkulose).
- Visse lægemidler til behandling af HIV-infektioner (proteasehæmmere).
- Itraconazol, ketoconazol (svampemidler).
- Carbamazepin eller fenytoin (epilepsimedicin).
- Barbiturater, fenobarbital (beroligende medicin og epilepsimedicin).
- Perikum (naturpræparat mod depression).
- Hydrochlorthiazid (vanddrivende medicin).
- Ciclosporin (lægemiddel til nedsættelse af immunforsvaret).

Brug af Felodipin EuroPharma sammen med mad og drikke

Grapefrugt og grapefrugtjuice kan påvirke Felodipin EuroPharma virkning. Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice bør derfor undgås.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Tag ikke Felodipin EuroPharma, hvis du er gravid. Inden behandlingen påbegyndes skal graviditet udelukkes.

Amning

Små mængder felodipin kan overføres til barnet via modermælken. Tal med din læge inden du bruger dette lægemiddel, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Felodipin EuroPharma kan hos nogle personer nedsætte reaktionsevnen i form af bl.a. svimmelhed og træthed i en sådan grad, at det kan påvirke evnen til at betjene maskiner og føre motorkøretøjer. Dette gælder særligt ved behandlingens start, ændring samt forøgelse af doseringen og ved alkoholindtagelse.

Vigtige informationer om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Felodipin EuroPharma

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager Felodipin EuroPharma, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE FELODIPIN EUROPHARMA

Tag altid Felodipin EuroPharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Depottabletterne skal tages om morgenen med tilstrækkelig væske (f.eks. et glas vand). Depottabletterne skal synkes hele, de må ikke tygges eller knuses. Depottabletterne kan tages på tom mave eller sammen med et let måltid. Depottabletterne bør ikke indtages med et meget fedtholdigt måltid.

Den sædvanlige dosis er Voksne

Hvis du tager Felodipin EuroPharma mod forhøjet blodtryk, er den anbefalede startdosis 2 Felodipin EuroPharma depottabletter (5 mg felodipin) en gang daglig. Hvis det er nødvendigt, kan lægen senere øge dosis til 4 Felodipin EuroPharma depottabletter (10 mg felodipin) en gang daglig. I nogle tilfælde kan lægen overveje at påbegynde behandlingen med 1 Felodipin EuroPharma depottablet (2,5 mg). Den maksimale daglige dosis er 4 Felodipin EuroPharma depottabletter (10 mg felodipin).

Aldre

Individuel dosering. Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Børn

Børn og unge (under 18 år) bør ikke tage Felodipin EuroPharma.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Dosis skal justeres. Lægens anvisninger skal følges.

Hvis du har taget for mange Felodipin

EuroPharma depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Felodipin EuroPharma depottabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomerne på overdosering er svimmelhed evt. besvimelse pga. meget lavt blodtryk, langsom puls.

Hvis du har glemt at tage Felodipin EuroPharma

Hvis du har glemt at tage en dosis Felodipin EuroPharma depottabletter, skal du blot fortsætte med din sædvanlige dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Felodipin

EuroPharma

Lægen har fortalt dig, hvor længe du skal tage Felodipin EuroPharma. Hvis du pludselig afbryder behandlingen, kan dine symptomer komme igen. Du bør ikke afbryde behandlingen tidligere end planlagt uden først at tale med lægen om det.

Felodipin EuroPharma anvendes sædvanligvis som langtidsbehandling.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Felodipin EuroPharma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklern. Kontakt læge eller skadestue.

Forekommer særligt ved behandlingsstart. Patienter som allerede lider af smerter i brystet, kan opleve at disse blive hyppigere, længerevarende og mere intense.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Åndenød, angst, bryst smerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
- Alvorlig hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

Forekommer særligt ved behandlingsstart. Patienter som allerede lider af smerter i brystet, kan opleve at disse blive hyppigere, længerevarende og mere intense.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

- Ringen eller summen for ørerne (tinnitus).
- Hævede fødder, ankler og hænder (perifer ødem).

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Rødmen, hovedpine, særlig ved behandlingens start, dosisøgning eller brug af høje doser. Disse symptomer forsvinder som regel ved fortsat behandling.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Træthed.
- Lavt blodtryk
- Øget eller uregelmæssig hjerterytme, hjertebanken.
- Øget hjertefrekvens og vejrtrækningsbesvær
- Rastløshed.
- Prikkende, snurrende fornemmelser i huden.
- Rysten
- Gener fra mave-tarmsystemet (f.eks. kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse)

- Vægtøgning
- Øget svedtendens
- Unormale følelser fra huden f.eks. myrekryb, brænden og kløen

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Nælefeber
- besvimelse
- Opkastning.
- Muskel og ledsmerter
- Rejsningsforstyrrelser

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Forstyrrelser i leverfunktionen (øgede transaminase-værdier)
- Feber.
- Udvikling af bryster hos mænd.
- Hjerteranfald
- Lysfølsomhed
- Usædvanlig kraftig menstruationsblødning.
- Betændelse i blodkarene forårsaget af hvide blodlegemer
- Betændelse eller hævelse i tandkødet, som kan undgåes eller mindskes ved god mundhygiejne.
- Øget vandladningstrang

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Felodipin EuroPharma utilgængeligt for børn.

Tag ikke Felodipin EuroPharma efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Felodipin EuroPharma, depottabletter

indeholder:

Aktivt stof: Felodipin. En depottablet indeholder 2,5 mg felodipin.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Lactosemonohydrat, natriumlaurylsulfat, hypromellose, mikrokrySTALLISK cellulose, magnesiumstearat.

Tabletfilm: Lactosemonohydrat, hypromellose, titandioxid (E 171), Macrogol 4000, gul jernoxid (E 172).

Pakningsstørrelser

Felodipin EuroPharma fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk