

Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 16 mg/12,5 mg, tabletter

Candesartancilexetil / hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4
3. Sådan skal du tage Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 anvendes til behandling af højt blodtryk (hypertension) hos voksne patienter. Det indeholder to aktive stoffer: Candesartancilexetil og hydrochlorthiazid. Disse arbejder sammen for at sænke blodtrykket. Candesartancilexetil tilhører en gruppe medicin, der kaldes angiotensin II-receptor-antagonister. Det får blodkarrene til at slappe af og udvide sig. Det hjælper med at sænke blodtrykket. Hydrochlorthiazid tilhører en gruppe medicin, der kaldes vanddrivende medicin (diuretika). Det øger kroppens udskillelse af vand og salte, som natrium, via urinen. Det hjælper med at sænke blodtrykket. Din læge kan ordinere Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4, hvis dit blodtryk ikke er passende reguleret af candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid alene.

Lægen kan have givet dig Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CANDESARTANCILEXETIL/HYDROCHLORTHIAZID 2CARE4

Tag ikke Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for Candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 (se pkt. 6).
- hvis du er allergisk over for medicin, der indeholder sulfonamid. Hvis du ikke ved, om det gælder for dig, skal du spørge lægen.
- hvis du har alvorligt leversygdom eller tilstoppede galdeveje (problem med afløb af galde fra galdeblæren).
- hvis du har alvorlige nyreproblemer.
- hvis du på noget tidspunkt har haft (podagra) urinsyreigt.
- hvis du vedvarende har lavt indhold af kalium i blodet.
- hvis du vedvarende har højt indhold af calcium i blodet.
- hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet (det er også bedst at undgå Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 tidligt i graviditeten – se afsnittet "Graviditet og amning").

Tal med din læge eller apoteket, før du tager Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4, hvis du er usikker på, om ovenstående gælder for dig.

Vær ekstra forsigtig med at tage

Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4

- Tal med lægen, inden du tager Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4
- hvis du har sukkersyge (diabetes).
 - hvis du har problemer med hjerte, lever eller nyrer.
 - hvis du for nylig har fået transplanteret en nyre.
 - hvis du kaster op, hvis du for nyligt har haft mange opkastninger eller har diarré.
 - hvis du har en sygdom i binyrerne, der kaldes Conn's syndrom (kaldes også primær hyperaldosteronisme).
 - hvis du nogensinde har haft en sygdom, der kaldes systemisk lupus erythematosus (SLE).
 - hvis du har lavt blodtryk.
 - hvis du har haft et slagtilfælde.
 - hvis du har / har haft allergi eller astma.

Vær opmærksom på følgende

Din læge vil måske se dig oftere og foretage nogle prøver, hvis du har nogle af disse tilstande. Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet "Graviditet og amning").

Hvis du skal have foretaget en operation, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du tager Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4. Det er fordi Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 kan medføre blodtryksfald i forbindelse med nogle former for bedøvelse. Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 kan medføre øget følsomhed for sollys på huden. Der er ingen erfaring med anvendelse af Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 til børn (under 18 år). Derfor frarådes det at give Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 til børn.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- anden medicin der hjælper med at sænke blodtrykket, herunder betablokkere, diazoxid og angiotensin konverterende enzym (ACE)-hæmmere, såsom enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril.
- ikke-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID'ere), såsom ibuprofen, naproxen, diclofenac, celecoxib eller etoricoxib (medicin, der virker smertestillende og betændelseshæmmende).
- acetylsalicylsyre (hvis du tager mere end 3 g hver dag) (medicin, der virker smertestillende og betændelseshæmmende).
- kaliumtilskud eller salterstatninger, der indeholder kalium (medicin, der øger mængden af kalium i blodet).
- tilskud af calcium eller D-vitamin.
- medicin, der nedsætter indholdet af kolesterol i blodet, såsom colestipol eller cholestyramin.
- medicin til behandling af sukkersyge (tabletter eller insulin).

- medicin, der kontrollerer hjerterytmen (antiarytmisk medicin), såsom digoxin og betablokkere.
- medicin, der kan påvirkes af kaliumniveauet i blodet, som f.eks. visse antipsykotiske lægemidler.
- heparin (blodfortyndende medicin).
- vanddrivende medicin (diuretika).
- afføringsmidler.
- penicillin (et antibiotikum).
- amphotericin (til behandling af svampeinfektioner).
- lithium (medicin til behandling af psykiske problemer).
- steroider såsom prednisolon.
- hypofysehormoner (ACTH).
- medicin til behandling af cancer (kræft).
- amantadin (til behandling af Parkinsons sygdom eller alvorlige virusinfektioner).
- barbiturater (en type beroligende medicin til behandling af epilepsi).
- carbenoxolon (til behandling af sygdom i spiserøret eller sår i munden).
- antikolinerg medicin, såsom atropin og biperiden.
- ciclosporin, medicin, der anvendes ved organtransplantation for at forhindre organafstødning.
- anden medicin, der kan medføre en øgning af den blodtryks-sænkende virkning, såsom baclofen (medicin, der modvirker spasticitet), amifostin (til behandling af cancer) og visse typer medicin mod psykiske sygdomme.

Brug af Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 sammen med mad og drikke (især alkohol)

Du kan tage Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 sammen med eller uden mad. Undgå at drikke alkohol indtil du har snakket med lægen. Alkohol kan få dit blodtryk til at falde yderligere og/eller øge risikoen for, at du bliver utilpas eller svimmel.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid. Du bør ikke tage Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4, hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle personer kan føle træthed eller svimmelhed ved anvendelse af Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4. Hvis det sker for dig, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4

Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 indeholder lactose, som er en slags sukker. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGER CANDESARTANCILEXETIL/HYDROCHLORTHIAZID 2CARE4

Tag altid Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 hver dag.

Den sædvanlige dosis Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 er 1 tablet 1 gang dagligt. Tabletten skal synkes hel sammen med et glas vand til. Forsøg at tage tabletten på samme tid hver dag. Dette vil hjælpe dig med at huske at tage den.

Hvis du har taget for mange Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering er lavt blodtryk, svimmelhed, akut væske- og elektrolyttab, tørst, hurtig puls, uregelmæssig hjerterytme, nedsat bevidsthedstilstand og muskelkramper.

Hvis du har glemt at tage Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte tablet. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage

Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4

Dit blodtryk kan stige igen, hvis du holder op med at tage Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4. Derfor må du ikke holde op med at tage Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 uden først at have talt med din læge.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke bivirkninger, der kan forekomme. Nogle af Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4s bivirkninger skyldes candesartancilexetil og nogle skyldes hydrochlorthiazid.

Hold op med at tage Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 og søg straks læge, hvis du oplever nogle af følgende overfølsomhedsreaktioner:

- Vanskelighed ved at trække vejret med eller uden hævelse af ansigt, læber, tunge, svælg og/eller hals.
- Hævelse af ansigt, læber, tunge, svælg og/eller hals, hvilket kan give synkebesvær.
- Alvorlig hudkløe (med hævelser af huden).

Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 kan medføre nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer. Din modstandsdygtighed over for infektioner kan blive nedsat, og du bemærker måske træthed, en infektion eller feber. Tal med lægen, hvis du oplever dette. Din læge vil eventuelt tage nogle blodprøver indimellem for at undersøge, om Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 har påvirket dit blod (agranulocytose).

Andre bivirkninger inkluderer:

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- Ændringer i blodprøveværdier:
 - Nedsat natriumindhold i blodet. Hvis det er stærkt nedsat, kan du eventuelt mærke en svaghedsfølelse, mangel på energi eller muskelkramper.
 - Forhøjet eller nedsat kaliumindhold i blodet, specielt hvis du i forvejen har nyreproblemer eller hjertesvigt. Hvis det er stærkt nedsat, kan du eventuelt mærke træthed, svaghedsfølelse, uregelmæssig hjerterytme (puls) eller en prikkende/sovende fornemmelse på kroppen.
 - Forhøjet indhold af kolesterol, sukker eller urinsyre i blodet.
- Sukker i urinen.
- Svimmelhedsfølelse/snurrende fornemmelse eller følelse af svaghed.
- Hovedpine.
- Luftvejsinfektion.

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- Lavt blodtryk. Det kan bevirke, at du føler dig utilpas eller svimmel.
- Appetitløshed, diarré, forstoppelse, mavebesvær.
- Hududslæt, nældefeber, udslæt på grund af øget følsomhed for sollys.

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Gulset (din hud eller det hvide i dine øjne får en gullig farve). Kontakt straks lægen, hvis du oplever dette.
- Påvirkning af nyrefunktionen, specielt hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvigt.
- Søvnbesvær, depression, rastløshed.
- Snurrende eller prikkende fornemmelse i dine arme eller ben.
- Forbigående uklart syn.
- Unormal hjerterytme (puls).
- Vejtrækningsproblemer (inklusive en betændelsesreaktion og væske i lungerne).
- Forhøjet temperatur (feber).
- Betændelse i bugspytkirtlen. Dette medfører moderate til voldsomme mavesmerter.
- Muskelkramper.
- Skader på blodkar, der viser sig som røde eller lilla prikker på huden.
- Et fald i de røde eller hvide blodlegemer eller blodpladerne. Du kan bemærke træthed, en infektion, feber eller tendens til blå mærker.
- Et alvorligt hududslæt, som udvikler sig hurtigt med dannelse af vabler eller afskalning af huden. Eventuelt også vabler i munden.
- Forværring af allerede forekommende lupus erythematosus-lignende symptomer eller nye usædvanlige hudreaktioner.

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Hævelse i ansigtet, læber, tunge, svælg og/eller hals.
- Kløe.
- Rygsmerter, led- og muskelsmerter.
- Forandringer i leverfunktionen inklusive leverbetændelse (hepatitis). Du bemærker evt. træthed, at din hud eller det hvide i dine øjne får en gullig farve og influenzalignende symptomer.
- Hoste.
- Kvalme.

Indberetning til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetnings-skema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 16 mg/12,5 mg ved almindelig temperatur. Tag ikke Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 16 mg/12,5 mg tabletter indeholder:

Aktive stoffer: 16 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, hydroxypropylcellulose, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat og triethylcitrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 16 mg/12,5 mg er hvide, runde, bikonvekse tabletter med delekærv på den ene side og mærket CH16 på samme side.

Pakningsstørrelser

Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4 16 mg/12,5 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 2care4

16 mg/12,5 mg svarer til Candesartan/

Hydrochlorthiazid Actavis.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2012