

Candesartancilexetil 2care4 4 mg, 8 mg, 16 mg og 32 mg, tabletter

Candesartancilexetil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Candesartancilexetil 2care4 til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Candesartancilexetil 2care4
3. Sådan skal du tage Candesartancilexetil 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Candesartancilexetil 2care4 tilhører en gruppe af medicin, der kaldes angiotensin II receptor-antagonister. Det virker ved at afslappe og udvide dine blodkar. Det får dit blodtryk til at falde, hvilket gør det lettere for dit hjerte at pumpe blodet rundt i hele kroppen.

Medicinen anvendes til:

- behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) hos voksne patienter.
- behandling af voksne patienter med hjertesvigt med nedsat funktion af hjertemusklen, som tillægsbehandling til angiotensin-konverterende enzym (ACE)-hæmmere eller når ACE-hæmmere ikke kan anvendes (ACE-hæmmere er en gruppe medicin, der anvendes til behandling af hjertesvigt).

Lægen kan have givet dig Candesartancilexetil 2care4 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CANDESARTANCILEXETIL 2CARE4

Tag ikke Candesartancilexetil 2care4

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for candesartancilexetil eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten.
- hvis du har en alvorlig leversygdom eller hindret afløb af galde (et problem med afløb af galde fra galdeblæren).

Vær ekstra forsigtig med at tage Candesartancilexetil 2care4

- Tal med lægen, inden du tager Candesartancilexetil 2care4, hvis du
- har hjerte-, lever- eller nyreproblemer, eller hvis du er i dialysebehandling.
 - fornylig har fået foretaget en nyretransplantation.
 - kaster op, for nylig har haft kraftige opkastninger eller har diarré.
 - har en sygdom i binyren, som kaldes Conns syndrom (kaldes også primær hyperaldosteronisme).
 - får lavt blodtryk.
 - nogensinde har haft et slagtilfælde.

Vær opmærksom på følgende.

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kan blive) gravid. Candesartancilexetil 2care4 frarådes i de første 3 måneder af graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan medføre alvorlig skade på dit barn, hvis det anvendes i dette stadie (se afsnittet om graviditet). Hvis du skal have foretaget en operation, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du tager Candesartancilexetil 2care4. Det er fordi, at Candesartancilexetil 2care4 kan medføre et fald i blodtrykket, hvis det kombineres med nogle narkosemidler.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- anden medicin, der får blodtrykket til at falde, herunder beta-blokkere, diazoxid og ACE-hæmmere, såsom enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril.
- ikke-steroid betændelseshæmmende medicin (NSAID'ere), såsom ibuprofen, naproxen, diclofenac, celecoxib eller etirocoxib (medicin, der virker smertestillende og betændelseshæmmende).
- acetylsalicylsyre (hvis du tager mere end 3 g hver dag) (medicin, der virker smertestillende og betændelseshæmmende).
- kaliumtilskud eller salterstatninger, der indeholder kalium (medicin, der øger mængden af kalium i dit blod).
- heparin (blodfortyndende medicin).
- vanddrivende medicin (diuretika).
- lithium (medicin til behandling af psykiske helbredsproblemer).

Brug af Candesartancilexetil 2care4 sammen med mad og drikke

Du kan tage Candesartancilexetil 2care4 i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du måske have behandlingen ændret. Tal med lægen. Candesartancilexetil 2care4 frarådes i de første 3 måneder af graviditeten og må ikke tages hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan medføre alvorlig skade på dit barn, hvis det anvendes efter graviditetens 3. måned.

Amning

Du må ikke tage Candesartancilexetil 2care4, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Candesartancilexetil 2care4 kan give bivirkninger som svimmelhed og træthed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Candesartancilexetil 2care4

Candesartancilexetil 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE CANDESARTANCILEXETIL 2CARE4

Tag altid Candesartancilexetil 2care4 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Synk tabletten med et glas vand.

Forsøg at tage tabletten på samme tid hver dag.

Det gør det lettere at huske at tage den.

Den sædvanlige dosis er Forhøjet blodtryk

Den sædvanlige startdosis er 8 mg én gang dagligt. Afhængigt af hvordan dit blodtryk reagerer, kan din læge øge denne dosis til 16 mg én gang dagligt og yderligere op til 32 mg én gang dagligt. Hos nogle patienter kan lægen ordinere en lavere startdosis. Det kan være hos patienter med leverproblemer, nyreproblemer eller patienter, som for nylig har mistet meget væske fra kroppen f.eks. ved opkastning eller diarré eller ved anvendelse af vanddrivende medicin.

Nogle sorte patienter kan have nedsat virkning af denne type medicin, hvis den gives som eneste behandling, og disse patienter har behov for en højere dosis.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Børn under 18 år må normalt ikke få Candesartancilexetil 2care4 tabletter.

Hjertesvigt

Den sædvanlige startdosis er 4 mg én gang dagligt. Ved at fordoble dosis med intervaller på mindst 2 uger, kan din læge øge dosis op til 32 mg én gang dagligt. Candesartancilexetil 2care4 kan tages sammen med anden medicin mod hjertesvigt, og din læge vil afgøre, hvilken behandling, der er egnet til dig.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis.
Følg lægens anvisninger.

Børn

Børn under 18 år må normalt ikke få
Candesartancilexetil 2care4 tabletter.

Candesartancilexetil 2care4 tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Candesartancilexetil 2care4 tabletter til alle de anførte doseringer.

Hvis du har taget for mange Candesartancilexetil 2care4 tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Candesartancilexetil 2care4 tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er for lavt blodtryk og svimmelhed.

Hvis du har glemt at tage Candesartancilexetil 2care4

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Candesartancilexetil 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Candesartancilexetil 2care4 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Kvalme, opkastninger, almen sløvhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Luftvejsinfektion.
- Svimmelhed, hovedpine.
- Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Nedsat nyrefunktion.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkrampe og koma. Tal med lægen.
- Tørst pga. for højt natrium i blodet. Forhøjet natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med krampe, bevidstløshed og koma. Tal med lægen.
- Kvalme.
- Unormal leverfunktion.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Kløe.
- Rygsmerter, smerter i leddene, muskelsmerter.

Candesartancilexetil 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Candesartancilexetil 2care4 ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar Candesartancilexetil 2care4 i original emballage, da det er følsomt for fugt.

Tag ikke Candesartancilexetil 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Candesartancilexetil 2care4, 4 mg, 8 mg, 16 mg og 32 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Candesartancilexetil.

Øvrige indholdsstoffer: Carmellosecalcium, hyprolose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, mannitol.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Candesartancilexetil 2care4 4 mg tabletter er hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter, der på den ene side er præget med "C1" og på den anden side er præget med "M" over delekærven.

Candesartancilexetil 2care4 8 mg tabletter er hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter præget med "M" over "C5" på den ene side og glat med delekærv på den anden side.

Candesartancilexetil 2care4 16 mg tabletter er hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter præget med "M" over "C6" på den ene side og glat med delekærv på den anden side.

Candesartancilexetil 2care4 32 mg tabletter er hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter præget med "M" over "C7" på den ene side og glat med delekærv på den anden side.

Pakningsstørrelser

Candesartancilexetil 2care4 4 mg fås i pakningsstørrelser á 100 tabletter, Candesartancilexetil 2care4 8 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 tabletter, Candesartancilexetil 2care4 16 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 tabletter, Candesartancilexetil 2care4 32 mg fås i pakningsstørrelser á 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Candesartancilexetil 2care4 svarer til Kandrozid.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2012