

Indlægsseddel: Information til brugeren

Desogestrel Sandoz 75 mikrogram filmovertrukne tabletter

desogestrel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desogestrel Sandoz
3. Sådan skal du tage Desogestrel Sandoz
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Desogestrel Sandoz bruges til at forhindre graviditet.

Der findes 2 hovedtyper af hormonelle præventionspiller:

- Kombinationstypen, "**p-piller**", som indeholder 2 typer kvindelige kønshormoner, et østrogen og et gestagen.
- **Minipiller**, som kun indeholder et gestagen og ikke et østrogen.

Desogestrel Sandoz er en minipille. Desogestrel Sandoz indeholder en lille mængde af det kvindelige kønshormon **desogestrel** (et gestagen).

De fleste minipiller virker hovedsageligt ved at forhindre sædcellerne i at trænge ind i livmoderen. Minipillerne forhindrer ikke altid modning af ægget, hvilket er den primære virkning for p-piller af kombinationstypen. Desogestrel Sandoz adskiller sig fra andre minipiller ved at indeholde en dosis hormon, der er høj nok til at forhindre modning af ægget. Derfor yder Desogestrel Sandoz en høj svangerskabsbyggende virkning.

Desogestrel Sandoz kan i modsætning til p-piller af kombinationstypen bruges af kvinder, der ikke kan tåle østrogener, og af kvinder, der ammer.

En ulempe er, at der kan forekomme uregelmæssige blødninger fra skeden ved brug af Desogestrel Sandoz. Det kan også ske, at din blødning helt udebliver.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desogestrel Sandoz

Generelle bemærkninger

I lighed med andre hormonelle svangerskabsforebyggende midler **beskytter** Desogestrel Sandoz **ikke mod HIV-infektion (AIDS)** eller andre seksuelt overførte sygdomme.

Tag ikke Desogestrel Sandoz:

- hvis du er **allergisk** over for desogestrel eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
- hvis du har en **trombose**. Trombose er dannelsen af en blodprop i et blodkar [f.eks. i benene (dyb venetrombose) eller i lungerne (lungeemboli)].
- hvis du har eller har haft **gulsot** (gulfarvning af huden) eller en alvorlig leversygdom, og din lever stadig ikke virker normalt.
- hvis du har, eller der er mistanke om, at du har en **kræftsygdom**, der vokser som følge af påvirkning fra kønshormoner, f.eks. visse typer af brystkræft.
- hvis du har uforklarlig **blødning fra skeden**.

Fortæl din læge om disse tilstande inden brug af Desogestrel Sandoz, såfremt en eller flere af disse tilstande er gældende for dig. Din læge kan anbefale dig at bruge svangerskabsforebyggende metoder uden hormoner.

Kontakt straks din læge, hvis en eller flere af disse tilstande opstår for første gang, mens du bruger Desogestrel Sandoz.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Desogestrel Sandoz:

- hvis du har eller har haft **brystkræft**.
- hvis du har **leverkræft**, da en mulig virkning af Desogestrel Sandoz på leverkræft ikke kan udelukkes.
- hvis du har eller har haft en **blodprop**.
- hvis du har **sukkersyge**.
- hvis du lider af **epilepsi** (se afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Desogestrel Sandoz").
- hvis du lider af **tuberkulose** (se afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Desogestrel Sandoz").

- hvis du har **forhøjet blodtryk**.
- hvis du har eller har haft **chloasma** (gullig-brune pigmentpletter på huden, især i ansigtet). Hvis det er tilfældet, skal du undgå at opholde dig for meget i solen eller udsætte dig for UV-stråling.

Hvis du har nogen af ovenstående tilstande og tager Desogestrel Sandoz, kan det være nødvendigt, at lægen overvåger dig nøje under behandlingen. Lægen vil forklare, hvad du skal gøre.

Brystkræft

- Det er vigtigt, at du jævnligt undersøger dine bryster. Du skal kontakte lægen hurtigst muligt, hvis du kan mærke en form for knude i brystet.
- Brystkræft ses lidt oftere hos kvinder, som tager p-piller, end hos kvinder i samme aldersgruppe, der ikke tager p-piller. Hvis en kvinde holder op med at tage p-piller, nedsættes risikoen gradvist, således at risikoen 10 år efter ophør er den samme som hos kvinder, der aldrig har taget p-piller.

Brystkræft er sjælden hos kvinder under 40 år, men risikoen stiger med alderen. Derfor er det ekstra antal tilfælde af brystkræft, der diagnosticeres, højere, jo ældre kvinderne er, når de tager p-piller, mens det er mindre afgørende, hvor længe de har taget p-piller.

- Ud af hver 10.000 kvinder, der tager p-piller i op til 5 år, men holder op med at tage dem, når de er 20 år, vil der være mindre end 1 ekstra tilfælde af brystkræft i løbet af 10 år efter ophøret ud over de 4 tilfælde, der normalt diagnosticeres i denne aldersgruppe.
- Ud af 10.000 kvinder, der tager p-piller i op til 5 år, men holder op med at tage dem, når de er 30 år, vil der være 5 ekstra tilfælde ud over de 44 tilfælde, der normalt diagnosticeres.
- Ud af 10.000 kvinder, der tager p-piller i op til 5 år, men holder op med at tage dem, når de er 40 år, vil der være 20 ekstra tilfælde ud over de 160 tilfælde, der normalt diagnosticeres.

Risikoen for brystkræft hos kvinder, der tager minipiller som Desogestrel Sandoz, der kun indeholder gestagen, menes at være nogenlunde den samme som hos de kvinder, der tager p-piller, men det er ikke endeligt klarlagt.

Når kvinder, der tager p-piller, får diagnosticeret brystkræft, lader det til, at der er mindre sandsynlighed for, at kræften har spredt sig, end hos kvinder, der ikke tager p-piller.

Det vides ikke, om det er p-pillerne, der forårsager den øgede risiko for brystkræft. Det kan også skyldes, at disse kvinder bliver undersøgt oftere, så brystkræft bliver opdaget tidligere.

Blodpropper

Tag omgående til lægen, hvis du bemærker mulige tegn på en blodprop (se også "Regelmæssig kontrol").

Trombose er dannelsen af en blodprop, som kan blokere et blodkar. En trombose opstår nogle gange i de dybe vener i benene (dyb venetrombose). Hvis blodproppen river sig løs fra den vene, hvor den er

dannet, kan den vandre til og blokere arterierne i lungerne og forårsage en såkaldt "lungeemboli". En lungeemboli kan medføre brystmerter, åndenød, kollaps og sågar død.

- Dyb venetrombose forekommer sjældent og kan opstå, uanset om du tager svangerskabsforebyggende piller eller ej. Den kan også opstå, hvis du bliver gravid.

Risikoen for at få dyb venetrombose er højere hos kvinder, som bruger p-piller, end hos dem, som ikke bruger p-piller. Risikoen ved minipiller som Desogestrel Sandoz, der kun indeholder gestagen, menes at være lavere end ved brug af p-piller, som også indeholder østrogener (p-piller af kombinationstypen).

Psykiske forstyrrelser

Nogle kvinder, der anvender hormonelle præventionsmidler, herunder Desogestrel Sandoz, har rapporteret om depression eller nedtrykthed. Depression kan være alvorligt og kan nogle gange føre til selvmordstanker. Hvis du oplever humørsvingninger og depressive symptomer, skal du kontakte din læge for yderligere rådgivning så hurtigt som muligt.

Børn og unge

Der foreligger ingen kliniske data vedrørende sikkerhed og virkning hos unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Desogestrel Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Fortæl det også til andre læger eller tandlæger, der udskrifter anden medicin til dig, at du tager Desogestrel Sandoz. De kan fortælle dig, om du bruge yderligere svangerskabsforebyggelse (f.eks. kondom) og i givet fald, i hvor lang tid, eller om det er nødvendigt at ændre anvendelsen af anden medicin, du har brug for.

Visse lægemidler:

- Kan påvirke indholdet af Desogestrel Sandoz i blodet.
- Kan **nedsætte den svangerskabsforebyggende effekt**.
- Kan forårsage uventet blødning.

Disse lægemidler omfatter lægemidler til behandling af:

- Epilepsi (f.eks. primidon, phenytoin, carbamazepin, oxcarbazepin, felbamat, topiramat og phenobarbital).
- Tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin).
- HIV-infektioner (f.eks. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz).
- Hepatitis C-virusinfektion (f.eks. boceprevir, telaprevir).
- Andre infektionssygdomme (f.eks. griseofulvin).
- Forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne (bosentan).
- Visse typer bakterielle infektioner (f.eks. clarithromycin, erythromycin).
- Nedtrykthed (naturlægemidler, som indeholder perikon (Hypericum Perforatum)).
- Svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, itraconazol, fluconazol).

Sandoz and  **SANDOZ** are registered trademarks of Novartis

- Højt blodtryk (hypertension), angina eller visse typer hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. diltiazem).

Hvis du tager lægemidler eller naturlægemidler, som kan nedsætte Desogestrel Sandoz' virkning, skal du også anvende barriereprævention. Eftersom indvirkningen af anden medicin på Desogestrel Sandoz kan vare op til 28 dage, efter at du er stoppet med medicinen, er det nødvendigt at anvende en supplerende barrieremetode i denne periode. Din læge kan fortælle, hvis du skal bruge yderligere svangerskabsforebyggende metoder, og hvor længe disse metoder skal bruges.

Desogestrel Sandoz kan også påvirke virkningen af andre lægemidler enten ved at forøge virkningen (f.eks. lægemidler indeholdende ciclosporin) eller nedsætte virkningen (f.eks. lamotrigin).

Graviditet og amning

Graviditet

Du må ikke tage Desogestrel Sandoz, hvis du er gravid eller tror, at du er gravid.

Amning

Du kan tage Desogestrel Sandoz, selvom du ammer.

Desogestrel Sandoz har ingen indflydelse på produktionen eller kvaliteten af brystmælk. Små mængder af det aktive stof i Desogestrel Sandoz går dog over i brystmælken.

Der er ikke set nogen påvirkning af børns vækst og udvikling i forsøg, hvor børnene blev ammet i 7 måneder af mødre, der tog Desogestrel Sandoz. Børnene blev i forsøget fulgt op til de var 2,5 år gamle.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Desogestrel Sandoz påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Desogestrel Sandoz indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Regelmæssig kontrol

Når du tager Desogestrel Sandoz, vil lægen bede dig om at komme til regelmæssig kontrol.

Almindeligvis vil hyppigheden og arten af disse kontroller afhænge af din personlige situation.

Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis:

- du bemærker mulige tegn på en **blodprop**, f.eks. stærke smerter i eller hævelse af et af dine ben, uforklarlige smerter i brystkassen, åndeløshed, usædvanlig hoste, særligt hvis du hoster blod op (kan være tegn på en **blodprop**).

- du får pludselige, kraftige mavesmerter eller **gulsot** (du kan få gulfarvning af huden og det hvide i øjnene eller mørkfarvet urin, hvilket kan være tegn på **leverproblemer**).
- du mærker en knude i brystet (kan være tegn på **brystkræft**).
- du får pludselige eller stærke smerter i den nederste del af maven eller maveregionen (kan være tegn på **ekstrauterin graviditet**, dvs. graviditet uden for livmoderen).
- du skal holde dig i ro (f.eks. være sengeliggende) i nogen tid eller opereres (kontakt lægen mindst 4 uger i forvejen).
- du får usædvanlig og kraftig **blødning fra skeden**.
- du har mistanke om, at du er **gravid**.

3. Sådan skal du tage Desogestrel Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hvornår og hvordan skal tabletterne tages?

Et blisterkort Desogestrel Sandoz indeholder 28 tabletter - nok til 4 uger.

- **Tag en tablet på cirka samme tidspunkt hver dag. Tabletten skal synkes hel med vand.**
- Forsiden af blisterkortet er påtrykt pile mellem tabletterne. Ugens dage er trykt på bagsiden af blisterstrippen. Hver dag svarer til en tablet.
- Hver gang du begynder på en ny blisterstrip Desogestrel Sandoz, skal du tage en tablet fra den øverste række. Du må ikke bare tage en tilfældig tablet. Hvis du for eksempel starter på en onsdag, skal du tage den tablet fra den øverste række, der er mærket (på bagsiden) med ON.
- Du skal fortsætte med at tage en tablet dagligt, indtil pakken er tom. Følg altid pilens retning. Ved at se på bagsiden kan du let kontrollere, om du har taget din daglige tablet.
- Du kan få blødninger fra skeden under brugen af Desogestrel Sandoz (se afsnit 4 Bivirkninger), men du skal fortsætte med at tage tabletterne som normalt.
- Når blisterstrippen er tom, skal du starte på en ny blisterstrip næste dag – uden pause og uden at vente på blødning.

Sådan begynder du på din første Desogestrel Sandoz-pakke

- **Hvis du ikke har brugt nogen svangerskabsforebyggende midler med hormoner i den sidste måned:**
Afvent din menstruation. På første blødningsdag skal du tage den første Desogestrel Sandoz-tablet. Du behøver ikke at beskytte dig yderligere mod graviditet. Du kan også starte på dag 2-5, men så skal du samtidig bruge en anden slags svangerskabsforebyggelse af barrieretypen (f.eks. kondom eller pessar) de første 7 dage, hvor du tager Desogestrel Sandoz.
- **Ved skift fra p-piller af kombinationstypen, p-ring eller p-plaster:**
Hvis du **ikke har** en tablet-, ring- eller plasterfri pause:

- Du skal begynde at bruge Desogestrel Sandoz dagen efter, du har taget den sidste tablet fra din p-pille-pakke, eller dagen efter fjernelse af p-ring eller p-plaster (dvs. ingen tablet-, ring- eller plasterfri pause).
- Hvis din nuværende p-pille-pakke også indeholder inaktive tabletter (placebo), kan du begynde med Desogestrel Sandoz dagen efter den sidste aktive tablet. Hvis du er usikker på forskellen mellem aktive og inaktive tabletter, kan du spørge din læge eller apotekspersonalet.
- **Hvis du følger disse instruktioner, behøver du ikke at beskytte dig yderligere mod graviditet.**

Hvis du **har** en tablet-, ring- eller plasterfri pause:

- Du kan også begynde dagen efter den tablet-, ring- eller plasterfri pause, eller når du har taget alle de inaktive placebotabletter i din nuværende pakning.
- **Hvis du følger disse instruktioner, skal du samtidig bruge en anden slags svangerskabsforebyggende barrieremetode (f.eks. kondom eller pessar) de første 7 dage, hvor du tager Desogestrel Sandoz.**

- **Hvis du skifter fra en anden pille, som kun indeholder gestagen (minipille):**

Du kan skifte fra en anden minipille på en hvilken som helst dag. Du behøver ikke at beskytte dig yderligere mod graviditet.

- **Hvis du skifter fra injektion, implantat eller hormonspiral:**

Du skal begynde at tage Desogestrel Sandoz den dag, du skulle have den næste injektion, eller den dag, implantatet eller spiralen bliver fjernet. Du behøver ikke at beskytte dig yderligere mod graviditet.

- **Efter fødsel:**

Du kan begynde at tage Desogestrel Sandoz mellem 21 og 28 dage efter, at du har født. Hvis du begynder senere, skal du samtidig bruge en anden slags svangerskabsforebyggende barrieremetode (f.eks. kondom eller pessar) de første 7 dage, hvor du tager Desogestrel Sandoz. Hvis du allerede har haft samleje, skal graviditet udelukkes, inden du kan begynde at tage Desogestrel Sandoz. Oplysninger til ammende kvinder findes under afsnit 2 'Det skal du vide, før du begynder at tage Desogestrel Sandoz' under overskriften 'Graviditet og amning'. Lægen kan også rådgive dig.

- **Efter abort:**

Din læge vil rådgive dig.

Hvis du har glemt at tage Desogestrel Sandoz

- **Hvis du er mindre end 12 timer forsinket:**

- Tag den glemte tablet, så snart du husker det, og tag så næste tablet på det sædvanlige tidspunkt. Desogestrel Sandoz vil stadig beskytte dig mod graviditet.

- **Hvis du er mere end 12 timer forsinket:**

- Hvis der er gået mere end 12 timer siden, at du skulle have taget din sidste tablet, **er du måske ikke fuldstændigt beskyttet mod graviditet**. Jo flere tabletter du har glemt i træk, jo større er risikoen for, at du bliver gravid.
- Tag den siste glemte tablet, så snart du husker det, og tag resten af tabletterne som normalt. Brug anden svangerskabsforebyggelse (fx kondom) **i de næste 7 dage**. Hvis du glemmer en eller flere tabletter i den første uge, hvor du startede med at tage tabletterne og har haft samleje i ugen, før du glemte tabletterne, er der mulighed for, at du er blevet gravid. Kontakt din læge.

Hvis du har maveproblemer (fx opkastning, kraftig diarré)

Hvis du kaster op inden for 3-4 timer efter, at du har taget din Desogestrel Sandoz-tablet, eller hvis du har kraftig diarré, er det ikke sikkert, at kroppen har nået at optage det aktive indholdsstof fuldstændigt. Følg anvisningerne vedrørende glemte tabletter ovenfor.

Hvis du har taget for meget Desogestrel Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Desogestrel Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Der er ikke set tilfælde af alvorlige, skadelige virkninger efter indtagelse af for mange Desogestrel Sandoz-tabletter på én gang. Der kan forekomme symptomer som kvalme, opkastning, og hos unge piger kan der forekomme en let blødning fra skeden. Ønsker du yderligere oplysninger, spørg da din læge til råds.

Hvis du holder op med at tage Desogestrel Sandoz

Du kan stoppe med at tage Desogestrel Sandoz på en hvilken som helst dag. Fra den dag, du stopper, er du ikke længere beskyttet mod graviditet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Fortæl det til lægen, hvis du får bivirkninger, især hvis de optræder i svær grad eller er vedvarende.

Alvorlige bivirkninger i forbindelse med brug af Desogestrel Sandoz er beskrevet i afsnit 2, 'Det skal du vide, før du begynder at tage Desogestrel Sandoz'. Læs venligst dette afsnit for yderligere oplysninger om 'Brystkræft' og 'Blodpropper', og kontakt straks din læge, hvis det er relevant.

Blødninger fra skeden kan optræde med uregelmæssige intervaller under brugen af Desogestrel Sandoz. Det kan dreje sig om pletblødning, som måske ikke engang kræver brug af et bind, eller kraftigere blødninger, som kan minde om en menstruation, og som kan kræve brug af bind eller tampon. Det kan også være, at du slet ikke bløder. De uregelmæssige blødninger er ikke tegn på, at

Desogestrel Sandoz ikke virker. Generelt behøver du ikke gøre noget ved det; fortsæt blot med at tage Desogestrel Sandoz. **Hvis blødningen imidlertid er meget kraftig eller varer meget længe, skal du kontakte din læge.**

Hvor ofte ses der andre bivirkninger?

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 kvinder:

- humørsvingninger
- nedtrykthed
- nedsat seksuel lyst (libido)
- hovedpine
- kvalme
- akne
- brystsmerte
- uregelmæssig eller ingen menstruation
- vægtøgning.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 kvinder:

- infektion i skeden
- vanskeligheder ved brug af kontaktlinser
- opkastning
- hårtab
- menstruationssmerter
- cyster på æggestokkene
- træthed.

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 kvinder:

Hudreaktioner såsom:

- udslæt
- nældefeber
- smertefulde blå-røde knuder (erythema nodosum)

Ud over disse bivirkninger kan der forekomme udflåd fra brysterne.

Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever symptomer på angioødem, såsom (i) hævet ansigt, tunge eller svælg, (ii) synkebesvær eller (iii) nældefeber og vejrtrækningsproblemer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkortet efter Udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Det aktive stof etonogestrel udviser en miljømæssig risiko for fisk.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desogestrel Sandoz indeholder:

- Aktivt stof: desogestrel.
- Øvrige indholdsstoffer:
lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon K30, stearinsyre, alfa-tocopherol, kolloid vandfri silica, hypromellose, macrogol, titandioxid (E 171) og polysorbat 80.

Udseende og pakningsstørrelser

Desogestrel Sandoz er en hvid, rund filmovertrukket tablet.

Tabletterne fås i pakninger med 1, 3, 6 og 13 blisterkort, som hver især er lagt i en aluminiumslamineret pose, og som hver indeholder 28 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

BE: Desobloxus 75 microgram filmomhulde tabletten

CZ: Daisenette 75 mcg

DK: Desogestrel Sandoz

FI: Desogestrel Sandoz 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen

SE: Desogestrel Sandoz 75 mikrogram filmdragerade tabletter

Denne indlægsseddel blev senest ændret 31. januar 2019