

# Salbutamol 2care4 1 mg/ml, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

## Salbutamol

### Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Salbutamol 2care4 til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

### Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Salbutamol 2care4
3. Sådan skal du bruge Salbutamol 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

### 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Salbutamol 2care4 indeholder det aktive stof salbutamolsulfat. Det hører til en gruppe af lægemidler, der kaldes beta-agonister. Salbutamolsulfat er en bronkodilator, som udvider luftvejene i dine lunger for at hjælpe dig til lettere at trække vejret. Bronkodilatorer anvendes til behandling af svær astma og langvarig bronkospasme, som ikke reagerer på konventionel behandling.

Lægen kan have givet dig Salbutamol 2care4 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

### 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE SALBUTAMOL 2CARE4

#### Brug ikke Salbutamol 2care4

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for salbutamolsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- til styring af for tidlig fødsel og heller ikke ved risiko for abort.

#### Vær ekstra forsigtig med at bruge Salbutamol 2care4

Tal med lægen, inden du bruger Salbutamol 2care4, hvis du

- har en hjerte-karsygdom eller for nylig har haft et hjerteanfald, alvorlig hjertesygdom, hjerterytme-forstyrrelser eller sygdom i hjertemuskulaturen.
- har diabetes, der er vanskelig at kontrollere.
- lider af problemer med skjoldbruskkirtlen.
- har alvorligt eller ubehandlet højt blodtryk.
- har grøn stær (øget tryk i dine øjne).
- har en aneurisme (en udvidelse i væggen i et blodkar).
- har fået at vide, at du lider af fæokromocytom. Dette er en sjælden form for tumor, der producerer kemiske stoffer, som kan medføre hvileløshed, forhøjet blodtryk og for hurtig hjerterytme.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Salbutamol 2care4. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

#### Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- steroider, herunder prednisolon.
- medicin, der kaldes for xanther (theophyllin).
- medicin, der kaldes for betablokkere, da de kan nedsætte virkningen af din medicin.
- vanddrivende medicin (furosemid, indapamid).
- medicin mod hjertesvigt (digoxin).
- medicin mod depression (tricykliske antidepressiva).
- medicin mod astma (nebuliserede antikolinerge midler (såsom ipratropiumbromid)).

#### Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

#### Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Salbutamol 2care4 efter aftale med lægen.

#### Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Salbutamol 2care4 efter aftale med lægen.

#### Trafik- og arbejdssikkerhed

Salbutamol 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

### 3. SÅDAN SKAL DU BRUGE SALBUTAMOL 2CARE4

Brug altid Salbutamol 2care4 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Din læge vil muligvis fortælle dig, at du skal bruge din nebulisator på faste tidspunkter hver dag, eller når du har hvæsende eller besværet vejrtrækning. Der skal gå 3-6 timer mellem doserne. Du skal altid følge lægens anvisninger.

#### Den sædvanlige dosis er Voksne

2,5 mg op til fire gange dagligt. Din læge kan forøge dette til 5 mg op til fire gange dagligt.

#### Børn

Dosis afhænger af barnets vægt. Den sædvanlige dosis er 0,1 - 0,15 mg for hver kg legemsvægt op til en maksimumdosis på 2,5 mg.

Denne dosis gives op til fire gange dagligt. Lægen kan forøge denne dosis til 5 mg op til fire gange dagligt.

#### Generelle instruktioner:


Din medicin skal bruges sammen en el-drevet nebulisator. Den "tåge", der produceres, inhaleres gennem en ansigtsmaske eller et mundstykke. Sørg for, at opløsningen eller den tåge, der produceres af nebulisatoren, ikke kommer i øjnene.

#### Brugsanvisning:

1. Klargør nebulisatoren i overensstemmelse med producentens instruktioner og/eller de doseringsanvisninger, du har fået af lægen.

2. Tag en stribe med ampuller fra foliebrevet. Tag en eller to ampuller ud (afhængigt af din dosis) [Figur 1]. Læg resten tilbage i foliebrevet og læg brevet tilbage i pakningen. Brug aldrig en ampulle, som allerede er åbnet, eller hvis opløsningen er misfarvet.

Bræk af her



(Figur 1)

3. Hold ampullen lodret og åbn den ved at dreje toppen af [Figur 2].

Vrid



(Figur 2)

4. Medmindre lægen har givet andre anvisninger, skal du presse al væsken fra plastampullen ind i nebulisatorkammeret.
5. Smid den tomme plastampulle ud.
6. Hvis lægen har sagt, at du skal fortynde opløsningen, må du KUN gøre dette med anvendelse af en steril 0,9 % natriumchloridopløsning. Brug den mængde, som lægen har angivet.
7. Tænd for nebulisatoren og ånd "tågen" roligt og dybt ind ved hjælp af en ansigtsmaske eller et mundstykke. Hvis du bruger ansigtsmaske, skal du sikre dig, at den passer korrekt. Beskyt dine øjne mod den producerede tåge, da den kan give smerter eller ubehag, hvis den kommer i øjnene. Dette er især vigtigt, hvis du lider af glaukoma.
8. Den tid, det tager for nebulisatoren at omdanne din medicin til en tåge, afhænger af den type udstyr, som du anvender. Du vil kunne se, hvornår behandlingen er færdig. Det er, når den fine tåge ikke længere kommer ud af masken eller mundstykket.
9. Efter brug hver gang skal du vaske din nebulisator, ansigtsmasken og/eller mundstykket i varmt sæbevand og skylle det grundigt.

For de fleste personer begynder Salbutamol 2care4 at give lindring fra en hvæsende vejrtrækning og brystspænding inden for cirka 5 minutter, og virkningerne varer normalt 4-6 timer. Når du har brugt nebulisatoren nogle få gange, vil du vide, hvor længe virkningerne normalt varer for dig.

#### Kontakt straks lægen, hvis

- du ikke opnår lindring med din aktuelle dosis, eller du er nødt til at tage flere inhalationer.
- dit åndedræt ikke bliver bedre, eller det forværres.
- du føler en tranghed i brystet.

Dette er tegn på, at din tilstand ikke kontrolleres tilstrækkeligt, og du kan have brug for en anden behandling eller mere behandling.

Din læge vil muligvis også ordinere en anden slags inhalationsvæske til din nebulisator, som skal bruges samtidig med denne medicin. Følg din læges vejledning til korrekt anvendelse af nebulisatoren. Spørg lægen, hvis du er i tvivl.

#### Hvis du har brugt for meget Salbutamol 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Salbutamol 2care4 inhalationsvæske, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er hurtig puls, hjertebanken, uregelmæssig hjerterytme, rastløshed, søvnforstyrrelser, brystsmerte og voldsom rysten, især på hænderne men også i hele kroppen, kvalme, svimmelhed, øget systolisk og nedsat diastolisk blodtryk, psykotiske reaktioner, for lavt kalium i blodet, højt blodsukker, øget fedt- og lipidindhold samt ketonindhold i blodet, dyb, hurtig vejtrækning, kolde og blåfarvning af fingre og tæer, koncentrationsbesvær og generel utilpashed.

#### Hvis du har glemt at bruge Salbutamol 2care4

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Salbutamol 2care4 Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

## 4. BIVIRKNINGER

Salbutamol 2care4 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

#### Alvorlige bivirkninger

**Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Smerte i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklens. Kontakt læge eller skadestue.
- Kortåndethed / Vejtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

**Meget sjældne bivirkninger:** Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

#### Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

- Lokal iltmangel i hjertemuskulaturen. Kontakt læge eller skadestue.

#### Ikke alvorlige bivirkninger

**Almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Rastløshed.
- Rysten, svimmelhed.
- Kvalme, smagsforstyrrelser.
- Svedeture.
- Hovedpine.
- Lokalirritation (mund og halsirritation, brændende fornemmelse på tungen).

**Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
- Hyperaktivitet.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtigt og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Ekstra hjerteslag, hjertebanken, ændring af blodtrykket (fald eller stigning).
- Udvidelse af blodkar.
- Muskelkramper.

**Meget sjældne bivirkninger:** Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Nervøsitet, søvnforstyrrelser.
- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Overfølsomhedsreaktioner.
- Kløe, udslæt, rødmen af huden i nældefeber.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

#### Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk), eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetnings-skema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## 5. OPBEVARING

#### Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Salbutamol 2care4 ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar Salbutamol 2care4 i original emballage. Ampullerne skal åbnes lige inden brug og uanvendt inhalationsvæske skal kasseres. Ampullerne skal anvendes senest 6 måneder efter anbrud af folien.

Brug ikke Salbutamol 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

#### Salbutamol 2care4 1 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning indeholder:

Aktivt stof: salbutamol som sulfatamolsulfat. Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, vand til injektionsvæsker, svovlsyre til pH-justering.

#### Udseende og pakningsstørrelse

##### Udseende

Klar opløsning i gennemsigtige plastikampuller.

##### Pakningsstørrelse

Salbutamol 2care4 1 mg/ml fås i pakningsstørrelser á 20 og 60 plastampuller á 2,5 ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning i folieindpakkede striber med 10 i hver.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4  
Tømrervej 9  
6710 Esbjerg V.

#### Ompakket og frigivet af

2care4  
Tømrervej 9  
6710 Esbjerg V.

Salbutamol 2care4 svarer til Salbutamol Arrow.

#### Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2013