

Nix® 5% creme

Permethrin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nix
3. Sådan skal du bruge Nix
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du kan bruge Nix til behandling af fnat.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nix®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Brug ikke Nix:

- hvis du er allergisk over for permethrin eller et af de øvrige indholdsstoffer Nix (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Nix.

- Hvis du er i behandling med kortikosterioder bør denne behandling stoppes inden opstart med Nix da det kan forværre fnatangrebet.

Undgå at få creme i øjnene. Hvis det sker alligevel, skal du skylle med rigeligt vand.

Se "Nix indeholder butylhydroxytoluen og formaldehyd".

Brug af anden medicin sammen med Nix

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Nix efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Nix efter aftale med lægen. Du skal normalt stoppe med at amme, hvis behandling med Nix er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nix påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Nix indeholder butylhydroxytoluen og formaldehyd

Nix indeholder butylhydroxytoluen og formaldehyd, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

Butylhydroxytoluen kan også give irritation af øjne og slimhinder.

3. Sådan skal du bruge Nix

Brug altid Nix nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Den anbefalede dosis er

Voksne, ældre samt unge over 12 år

Normalt op til 1 tube (30 g). Enkelte voksne kan have behov for at anvende en ekstra tube for at dække hele kroppen, men bør ikke anvende mere end 2 tuber (60 g i alt) ved hver applikation.

Brug til børn i alderen 6-12 år

Op til en halv tube (15 g).

Brug til børn i alderen 2 måneder til 5 år

Op til en kvart tube (7,5 g).

Administration

Til udvortes brug.

Voksne og børn over 3 år:

Påsmøres over hele kroppen, undtagen hovedet.

Ældre:

Påsmøres over hele kroppen, herunder hals, ansigt, ører og hårbund og særligt områderne mellem fingre og tæer, under negle, håndled, armhuler, ydre kønsdele, bryster (ældre) og balder. Området omkring øjnene undgås.

Børn under 3 år:

Påsmøres over hele kroppen, herunder hals, ansigt, ører og hårbund og særligt områderne mellem fingre og tæer, under negle, håndled, armhuler, ydre kønsdele, bryster (ældre) og balder. Området omkring øjnene undgås.

Afvaskes efter 8-12 timer.

Børn under 2 år må kun få Nix 5 % creme efter lægens anvisning.

Genbehandling kan evt. foretages, dog tidligst 7 dage efter første behandling.

Brugsanvisning

Før behandling skal huden være ren, tør og må ikke være varm (f.eks. som efter et bad). Påsmør cremen omhyggeligt over hele kroppen, undtagen hovedet. Hos børn under 3 år, smør da også ansigt og hårbund ind.

Afvask cremen efter 8-12 timer. Hvis du vasker hænderne inden du vasker cremen af kroppen, skal du smøre hænderne ind igen. Husk at påsmøre huden under neglene, mellem fingre og tæer, under armene og navlen. Husk også at indsmøre den tynde hud ved brystvorterne, på kønsdelene og omkring endetarmen. Få evt. hjælp til fuldstændig indsmøring af ryggen. Børn kan have brug for hjælp fra voksne.

En behandling er ofte tilstrækkelig.

Kløe i huden kan fortsætte i op til 4 uger efter behandlingen og skyldes normalt eftervirkninger af angrebet, fordi der kommer en allergisk reaktion på midlerne. Det behøver derfor ikke være tegn på behandlingssvigt.

Hvis du mener, virkningerne af Nix er for kraftige eller svage, bør du tale med din læge eller apoteket herom.

Den, som smittes med fnat kan være symptomfri i 3-4 uger. Alle medlemmer af husstanden bør derfor behandles samtidigt.

Hvis du brugt for meget Nix

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Nix, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at bruge Nix

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Nix

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Rødme, eksem, udslæt.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Prikken i huden.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Kløe, nældefeber, rødme.

Ikke kendte bivirkninger:

- Brændende fornemmelse på huden.
- Hævelse pga. væskeansamling i huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Nix utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Nix ved temperaturer over 25 °C. Må ikke fryses.

Brug ikke Nix efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nix indeholder:

- Aktivt stof: Permethrin.
- Øvrige indholdsstoffer: Mellemlangkædede triglycerider; glycerolmonostearat; makrogolcetyleter; makrogolcetostearyleter; isopropylmyristat; flydende paraffin; butylhydroxitoluen; glycerol; formaldehydopløsning 35 %; karbomer; natriumhydroxid; destilleret vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvid creme.

Pakningsstørrelse

Nix fås i pakningsstørrelse á 30 g creme.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Nix® er et registreret varemærke, der tilhører Chefaro Ireland Ltd.

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2016.

Nedenstående er til læger og sundhedspersonale:

Sundhedspersonale, der hyppigt behandler andre med Nix creme, bør benytte handsker for at undgå oventuel irritation af hænderne.