

Rhinocort® Turbuhaler® næsepudder 100 mikrogram/dosis

Budesonid

L90235A-01

Rhinocort® og Turbuhaler® er registrerede varemærker, der tilhører AstraZeneca-koncernen.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Rhinocort Turbuhaler til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Rhinocort Turbuhaler
3. Sådan skal du bruge Rhinocort Turbuhaler
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Rhinocort Turbuhaler indeholder et binyrebarkhormon, der forhindrer hævelse og irritation i næsen ved allergi (kløe, tilstoppet og/eller løbende næse).

Du kan bruge Rhinocort Turbuhaler lokalt i næsen til:
Forebyggelse af høfeber og helårssnue.
Behandling af polypper i næsen.
Forebyggelse af nye polypper efter operation.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE OM RHINOCORT TURBUHALER

Brug ikke Rhinocort Turbuhaler hvis:

Du er overfølsom (allergisk) over for det virksomme stof, budesonid.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Rhinocort Turbuhaler

- Hvis du har eller har haft lungetuberkulose. Tal med lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Rhinocort Turbuhaler efter aftale med lægen.

Amning:

Du kan bruge Rhinocort Turbuhaler, selvom du ammer. Rhinocort Turbuhaler går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rhinocort Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE RHINOCORT TURBUHALER

Brug altid Rhinocort Turbuhaler nøjagtig efter lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske efter aftale med lægen.

Den sædvanlige dosering er:

Forebyggelse af høfeber og helårssnue:

Voksne: 2 sug i hvert næsebor om morgenen. Når den ønskede virkning er opnået, kan du prøve at nedsætte dosis til et sug i hvert næsebor om morgenen.

For at forebygge høfeber bør du så vidt muligt starte behandlingen med Rhinocort Turbuhaler, før pollensæsonen starter.

Du skal altid bruge Rhinocort Turbuhaler regelmæssigt, som lægen har ordineret.

Hvis næsen er stoppet, kan medicinen ikke fordele sig godt nok, hvor den skal virke. For at få effekt kan det derfor være en god ide også at bruge næsedråber mod tilstoppet næse de første 2-3 dage.


Børn: Du bør ikke bruge Rhinocort Turbuhaler til børn.

Behandling eller forebyggelse af næsepolypper:

Voksne: 1 sug i hvert næsebor to gange dagligt (morgen og aften).

Børn: Du bør ikke bruge Rhinocort Turbuhaler til børn.

Brugsanvisning:



1. Puds næsen. Skru beskyttelseshætten af.
2. Hold Rhinocort Turbuhaler lodret med det grå bundstykke nedad. Drej bundstykket en gang frem og tilbage. Det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først.
3. Anbring næsestykket helt tæt til det ene næsebor og luk det andet næsebor med en finger. Træk vejret hurtigt og kraftigt ind (i ca. et halvt sekund).



4. Før du puster ud igen, skal du fjerne inhalatoren fra næsen.
5. Gentag punkt 2-4 i det andet næsebor.
6. Hvis der er ordineret yderligere dosis i hvert næsebor, gentages punkt 2 til 5.
7. Skru beskyttelseshætten på igen.

Vigtigt:

Pust aldrig ud gennem næsestykket og skru altid beskyttelseshætten på efter brug. Rhinocort Turbuhaler afgiver altid den rigtige dosis, også hvis der er blevet drejet flere gange på bundstykket. Du kan hverken lugte eller smage medicinen.

Rengøring:

Rengør næsestykkets yderside 2-3 gange om ugen med en tør klud.

Obs! Næsestykket må ikke rengøres med vand.

Hvornår er Rhinocort Turbuhaler tom?

Når du kan se et rødt mærke øverst i dosisindikatoren, er der ca. 20 doser tilbage. Når det røde mærke når bunden af dosisindikatoren, er Rhinocort Turbuhaler tom, og du skal kassere den.



Den lyd du kan høre, når du ryster Rhinocort Turbuhaler, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

Du skal være opmærksom på, at Rhinocort Turbuhaler ikke virker lige med det samme. Der kan godt gå et par dage, før du får det bedre.

Hvis du har brugt for meget Rhinocort Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Rhinocort Turbuhaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Det er vigtigt, at du tager den dosis, der står på etiketten fra apoteket, eller som aftalt med din læge. Du bør kun tage så meget som din doktor har anbefalet; tager du mere eller mindre kan dine symptomer blive værre.

Der er dog ingen akut risiko forbundet ved at bruge for meget Rhinocort Turbuhaler en enkelt gang.

Hvis du har glemt at bruge Rhinocort Turbuhaler

Hvis du har glemt en dosis Rhinocort Turbuhaler, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Rhinocort Turbuhaler kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:**Meget sjældne bivirkninger**

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:**Almindelige bivirkninger**

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Irritation i næsen i form af tørhed og nysen, blodigt udfåd, samt næseblod.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

Kløe, eksem eller udslæt.

Nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Almene påvirkninger af binyrebarkhormoner, samt væksthæmning hos børn.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Sårdannelse i næsen, slimhinden samt huldannelse i næseskillevæggen.

Hypigheden er ikke kendt:

- Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
- Hovedpine, kvalme, synsedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Rhinocort Turbuhaler skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Rhinocort Turbuhaler må ikke opbevares over 30 °C.
- Rhinocort Turbuhaler skal opbevares tørt.
- Brug ikke Rhinocort Turbuhaler efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet, må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**Rhinocort Turbuhaler, næsepudder 100 mikrogram/dosis indeholder:**

- Virksomt indholdsstof: Budesonid.
- Der er ingen hjælpestoffer.

Udseende og pakningsstørrelse**Udseende:**

Rhinocort Turbuhaler er et hvidt pulver i en plastikinhalator.

Pakningsstørrelse:

1 × 200 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af:

Abacus Medicine A/S

Vesterbrogade 149, DK-1620 København V.

Tel: +45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08.2012