

## MEROPUR 75 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Menotropin

L90301A-03

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret MEROPUR til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

**Oversigt over indlægssedlen**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge MEROPUR
3. Sådan skal du bruge MEROPUR
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

**1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

MEROPUR leveres som et pulver, som skal opløses i væske (solvens) før brug. Det gives som en injektion under huden eller i en muskel.

MEROPUR indeholder to hormoner kaldet follikelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH). FSH og LH er naturlige hormoner, der produceres af både mænd og kvinder. De hjælper kønsorganerne til at fungere normalt. FSH og LH i MEROPUR er udvundet fra urin fra kvinder, hvor overgangsalderen (menopausen) er indtruffet. Det er højt oprenset, og kaldes derefter menotropin.

MEROPUR bruges til behandling af barnløshed hos kvinder i de følgende to situationer:

i. Kvinder, der ikke kan blive gravide, fordi deres æggestokke ikke producerer æg (inklusive kvinder, der lider af polycystisk ovariesyndrom, PCOS, en vis type hormonforstyrrelse som kan føre til nedsat fertilitet). MEROPUR bruges til kvinder, som allerede har fået behandling med et lægemiddel indeholdende clomifencitrat mod barnløshed, men hvor dette ikke har hjulpet.

ii. Kvinder, som gennemgår behandlingsprogrammer for assisteret befrugtning (ART) (herunder in vitro befrugtning/embryooverførsel hvor befrugtede æg placeres direkte i livmoderen (IVF/ET), en behandling hvor sædceller og æg er lagt direkte i æggelederen (GIFT), og befrugtning hvor sædcellen injiceres direkte i ægcellen, og det befrugtede æg derefter placeres i livmoderen (ICSI)). MEROPUR hjælper æggestokkene med at udvikle mange ægblærer (follikler), hvor et æg kan udvikles (multipel follikeludvikling).

**2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE MEROPUR**

Før behandlingen med MEROPUR skal du og din partner undersøges af en læge med hensyn til årsagerne til jeres fertilitetsproblemer. Du skal specielt undersøges for følgende lidelser, således at en eventuel anden passende behandling kan gives:

- nedsat aktivitet i skjoldbruskkirtlen (hypothyroidisme) eller i binyrerne (binyrebarkinsufficiens)
- høj koncentration af et hormon kaldet prolaktin (hyper- prolaktinæmi)
- tumorer i hypofysen (en kirtel på undersiden af hjernen)
- tumorer i hypothalamus (et område lokaliseret under den del af hjernen, der kaldes thalamus)

Hvis du ved, at du har nogle af de ovenstående lidelser, **så fortæl dette til din læge før du starter behandling med MEROPUR.**

**Brug ikke MEROPUR**

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for menotropin eller et af de øvrige indholdsstoffer i MEROPUR
- hvis du har tumorer på livmoderen, æggestokke, i brysterne, hypofysen eller hypothalamus
- hvis du har cyster på dine æggestokke eller forstørrede æggestokke (medmindre at dette skyldes polycystisk ovariesyndrom, PCOS, som er en type af hormonforstyrrelse hos kvinder)
- hvis du har nogen form for misdannelser i livmoderen eller andre kønsorganer
- hvis du lider af blødninger fra skeden uden kendt årsag
- hvis du har godartede muskelknuder (fibromer) i livmoderen
- hvis du er gravid eller ammer
- hvis du er kommet tidligt i overgangsalderen

**Advarsler og forsigtighedsregler**

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger MEROPUR

- hvis du får mavesmerter
- hvis din bughule oppustes, (maven føles oppustet)
- hvis du får kvalme
- hvis du kaster op
- hvis du får diarré
- hvis du oplever vægtøgning
- hvis du oplever vejrtrækningsbesvær
- hvis du oplever nedsat vandladning

Informér straks din læge om ovenstående, også selvom at symptomerne viser sig nogle dage efter den sidste injektion er blevet givet. Dette kan være tegn på forøget aktivitet i ægge- stokkene, som kan blive alvorligt.

Hvis disse symptomer bliver alvorlige, skal behandlingen mod barnløshed stoppes, og du skal behandles på hospitalet.

Overholdelse af den anbefalede dosis og nøje kontrol af din behandling vil reducere risikoen for, at du får disse symptomer.

**Hvis du holder op med at bruge MEROPUR,** vil du måske stadigvæk opleve disse symptomer. Kontakt straks din læge, hvis nogle af disse symptomer opstår.

Mens du bliver behandlet med dette præparat, vil din læge normalt arrangere ultralydsscanninger og nogle gange tage blodprøver for at se, hvordan du reagerer på behandlingen.

Behandling med hormoner som MEROPUR kan forøge risikoen for:

- graviditet udenfor livmoderen, hvis du tidligere har haft sygdomme i æggelederne
- abort
- graviditet med flere fostre (tvillinger, trillinger osv.)
- medfødte misdannelser (fysiske defekter hos barnet ved fødslen)

Nogle kvinder, der har modtaget behandling mod barnløshed, har udviklet tumorer i æggestokkene og andre kønsorganer. Det er endnu ukendt om hormoner som MEROPUR forårsager disse problemer.

Blodpropper i blodårerne (arterier eller vener) forekommer oftere hos gravide kvinder. Behandling af barnløshed kan forøge risikoen for at dette sker, især hvis du er overvægtig, eller hvis du eller én i din familie (blodbeslægtet) har haft en blodprop. Informér din læge, hvis du tror dette er tilfældet for dig.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

**Brug af anden medicin**

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlæge- midler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Clomifencitrat er et andet lægemiddel, som bruges til behandlingen af barnløshed. Hvis du bruger MEROPUR samtidig med clomifencitrat, kan virkningen på æggestokkene forøges.

**Graviditet og amning**

Du må ikke bruge MEROPUR, hvis du er gravid eller ammer.

**Trafik- og arbejdssikkerhed**

Det er usandsynligt, at MEROPUR skulle påvirke din evne til at køre eller betjene maskiner.

**3. SÅDAN SKAL DU BRUGE MEROPUR**

Tag altid MEROPUR nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

**i. Behandling af kvinder der ikke har ægløsning, dvs. ikke producerer æg:**

Behandlingen skal startes inden for de første 7 dage af din menstruationscyklus (1. dag er den dag, du får din menstruation). Behandlingen bør gives hver dag i mindst 7 dage.

Den sædvanlige startdosis er 75-150 IE dagligt. Denne dosis justeres muligvis, afhængigt af dit respons, op til maksimalt 225 IE dagligt. Den samme dosis skal gives i mindst 7 dage, før dosis ændres. Det anbefales, at dosis øges med 37,5 IE hver gang (og ikke mere end 75 IE). Behandlingscyklus bør afbrydes, hvis der ikke er set en reaktion efter 4 uger.

Når et godt respons er opnået, indgives én enkelt injektion af et andet hormon, kaldet human choriongonadotropin (hCG) graviditetshormon, med en dosis på mellem 5.000-10.000 IE 1 dag efter den sidste MEROPUR-injektion. Det anbefales at have samleje på dagen hvor hCG injiceres og dagen efter. Alternativt bør kunstig befrugtning udføres (injektion af sæd direkte ind i livmoderen). Din læge vil nøje overvåge din udvikling i mindst 2 uger efter, at du har modtaget hCG-injektionen.

Din læge vil følge effekten af behandlingen med MEROPUR. Afhængigt af din udvikling kan din læge vælge at stoppe din behandling med MEROPUR og ikke give dig en hCG-injektion. I dette tilfælde vil du blive bedt om at bruge en form for barriere-baseret prævention (f.eks. kondom) eller at afstå fra samleje, indtil din næste menstruation er startet.

**ii. Kvinder som gennemgår behandlingsprogrammer for assisteret befrugtning:**

Hvis du også modtager behandling med en GnRH-agonist (et lægemiddel der hjælper et hormon, kaldet gonadotropin-frigørende hormon, med at virke), bør behandlingen med MEROPUR starte ca. 2 uger efter, at behandlingen med GnRH-agonist er startet.

Patienter, der ikke modtager GnRH-agonist, skal starte behandlingen med MEROPUR på 2. eller 3. dagen af menstruationscyklus (1. dag er første blødningsdag).

Behandlingen skal gives hver dag i mindst 5 dage. Startdosis er normalt 150-225 IE. Denne dosis kan øges, afhængigt af din reaktion på behandlingen, op til maksimalt 450 IE pr. dag. Dosis bør ikke forøges med mere end 150 IE pr. justering. Normalt bør behandlingen ikke fortsætte mere end 20 dage.

Hvis der er nok ægblærer tilstede, vil du få en enkelt injektion med et lægemiddel med humant choriogonadotropin (hCG, graviditetshormon) i en dosis på op til 10.000 IE for at fremkalde ægøsning.

Din læge vil nøje overvåge din udvikling i mindst 2 uger efter du har modtaget hCG-injektionen.

Din læge vil overvåge effekten af MEROPUR-behandlingen. Afhængigt af udviklingen kan din læge vælge at afbryde din behandling med MEROPUR og ikke give dig en hCG-injektion. I dette tilfælde vil du blive bedt om at bruge en form for barriere-baseret prævention (f.eks. kondom) eller at afstå fra samleje, indtil din næste menstruation er startet.


## BRUGSANVISNING

**Hvis din klinik har bedt dig om selv at injicere MEROPUR, skal du følge deres eventuelle anvisninger.**

Den første injektion af MEROPUR skal gives under tilsyn af en læge.

### OPLØSNING AF MEROPUR:


MEROPUR leveres som et pulver og skal opløses, før det kan injiceres. Væsken, som MEROPUR skal opløses i, medfølger sammen med pulveret. MEROPUR må kun opløses umiddelbart før brug. Dette gøres således:



– Fastgør den lange, tykke nål (blandingskanylen) på sprøjten.

– Knæk toppen af væske-ampullen med prikken pegende mod dig selv.


– Indfør nålen i væskeampullen.



– Træk al væsken fra ampullen op i sprøjten.

– Indsæt nålen i gummilåget på hætteglasset med MEROPUR-pulveret og sprøjt langsomt al væsken ned i glasset langs glassets side for at undgå bobler.

– Pulveret skal herefter opløses hurtigt (inden for 2 minutter) og give en klar opløsning.




– Sving glasset rundt for lettere at opløse pulveret. **Ryst ikke**, da dette vil danne luftbobler. *Hvis opløsningen er uklar eller indeholder partikler, må den ikke anvendes.*

– Træk opløsningen op i sprøjten igen.

Hvis du har fået ordineret flere end ét hætteglas med MEROPUR-pulver pr. injektion, kan du trække opløsningen (den første MEROPUR-opløsning) op i sprøjten igen og sprøjte den ned i et andet hætteglas med pulver. Du kan gøre dette med op til 3 hætteglas i alt, men følg altid din læges anvisninger.

### INJICERING AF MEROPUR:




– Når du har trukket den foreskrevne dosis op i sprøjten, så skift nål til den korte, tynde nål (injektionskanylen).

– Drej sprøjten således at nålen er øverst, og slå let på siden af sprøjten, så alle luftbobler samles i toppen. Tryk let på stemplet, indtil den første dråbe af væske kommer ud af nålens spids.

– Din læge eller sygeplejerske vil fortælle dig, hvor du skal injicere (f.eks. på forsiden af låret, maven osv.)

– Desinficér injektionsstedet.



– For at injicere: Tag fat i huden således at der dannes en fold og indsæt nålen i en hurtig bevægelse i en 90° graders vinkel på kroppen. Tryk stemplet i bund for at injicere opløsningen. Træk herefter kanylen ud igen.

– Efter fjernelse af nålen, bør du trykke på injektionsstedet for at stoppe en eventuel blødning. Massér injektionsstedet blidt. Dette vil hjælpe opløsningen med at fordele sig under huden.

– Smid ikke brugte nåle og sprøjter i det almindelige husholdningsaffald. Disse skal bortkastes på en passende måde.

Hvis du har glemt at tage MEROPUR, eller har taget mere MEROPUR end du skulle, så fortæl det til din læge eller sygeplejerske. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af MEROPUR, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

## 4. BIVIRKNINGER

MEROPUR kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

### Alvorlige bivirkninger

**Almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Ovarielt hyperstimuleringsyndrom (OHSS) især for kvinder med polycystisk ovariesyndrom, karakteriseret ved smerter og udspiling af maven, alvorlig ovarieforstørrelse, vægtøgning, åndenød, nedsat vandladning (mindre urin), kvalme, opkast og diarré. Som følge af høj aktivitet i æggestokkene kan blodpropper og drejning af en æggestok forekomme. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge omgående
- også selv om symptomerne først udvikler sig nogle dage efter sidste injektion er givet.

### Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

- Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme og ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

### Ikke alvorlige bivirkninger

**Følgende almindelige bivirkninger** forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede patienter:

- Mavesmerter
- Udspiling og forstørrelse af maven
- Hovedpine
- Kvalme
- Bækkensmerter
- Overstimulering af æggestokkene (høj aktivitet)
- Smerter og reaktioner omkring injektionsstedet (rødme, blå mærker, hævelse og/eller kløe)

**Ikke almindelige bivirkninger** forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter:

- Opkastninger og maveubehag, diarré
- Træthed
- Svimmelhed
- Cyster på æggestokkene og brystgener
- Hedeture

**Sjældne bivirkninger** forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter:

- Akne, udslæt

### Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

- Synsforstyrrelser
- Feber, utilpashed
- Overfølsomhedsreaktioner
- Vægtøgning
- Ledsmerter, rygsmerter, smerter i nakken og smerter i arme og ben
- Rotation af æggestokken

### Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk), ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på [sst@sst.dk](mailto:sst@sst.dk) eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel

## 5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C. Må ikke fryses. Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

Opløsningen må ikke anvendes, hvis den indeholder partikler eller er uklar.

Brug ikke MEROPUR efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

### MEROPUR indeholder:

- Det aktive indholdsstof er højt oprenset menotropin (humant menopausal gonadotropin, HMG) svarende til follikel - stimulerende hormon (FSH) aktivitet på 75 IE og luteiniserende hormon (LH) aktivitet på 75 IE.
- Øvrige indholdsstoffer i pulveret er: Laktosemonohydrat, polysorbat 20, natriumhydroxid og saltsyre.
- Væsken (solvensen) indeholder: Vand, natriumchlorid og saltsyre.

### MEROPURs udseende og pakningsstørrelse

MEROPUR er et pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Kartonen indeholder 5 eller 10 klare hætteglas, som indeholder et lyst pulver. Kartonen indeholder også et tilsvarende antal klare glasampuller med farveløs væske (solvens).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Abacus Medicine A/S  
Vesterbrogade 149  
1620 København V  
Tel: +45 70 22 02 12  
e-mail: [kundeservice@abacusmedicine.com](mailto:kundeservice@abacusmedicine.com)

### Frigivet af

Abacus Medicine B.V.  
Herculesstraat 25  
1812 PD  
Alkmaar, Holland  
Tel +31 6 50 57 41 87  
e-mail: [kundeservice@abacusmedicine.com](mailto:kundeservice@abacusmedicine.com)

**Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2014**