

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Finasterid 2care4 5 mg, filmovertrukne tabletter

Finasterid

04-2013
P080537-1

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Finasterid 2care4 til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finasterid 2care4
3. Sådan skal du tage Finasterid 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Finasterid 2care4 tilhører en gruppe medicin, der kaldes testosteron-5-alfa-reduktasehæmmere. De virker ved at formindske størrelsen af blærehalskirtlen (prostata) hos mænd.

Finasterid 2care4 bruges til behandling og kontrol af godartet forstørret blærehalskirtel (benign prostata-hyperplasi, BPH). Det medfører formindskelse af en forstørret blærehalskirtel, forbedrer vandladningen (urinflow) og symptomer forårsaget af den forstørrede blærehalskirtel. Desuden nedsættes risikoen for akut tilbageholdelse af urin og behovet for operation.

Lægen kan have givet dig Finasterid 2care4 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FINASTERID 2CARE4

Tag ikke Finasterid 2care4 hvis

- du er overfølsom (allergisk) over for finasterid eller et af de øvrige indholdsstoffer (Se afsnittet "Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Finasterid 2care4").
- du er kvinde (se også under "Graviditet og amning").
- du er barn.

Vær ekstra forsigtig med at tage Finasterid 2care4 hvis

- du har svært ved at tømme blæren fuldstændigt eller har markant nedsat urinstrøm. Din læge skal undersøge dig grundigt, før du begynder at tage Finasterid 2care4, for at udelukke andre afledninger i urinlederen.
- du har nedsat leverfunktion. Finasterid-mængden i blodet kan være forhøjet hos denne gruppe af patienter.
- du bemærker ændringer i dine bryster såsom knuder, smerter, hos mænd forstørrede bryster (gynækomasti) eller flåd fra brystvorterne.
- du har arvelig galactoseintolerans, en særlig form for arvelig lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose-/galactosemalabsorption, da Finasterid 2care4 indeholder lactosemonohydrat.

Kvinder, børn og unge skal undgå at komme i berøring med knuste eller knækkede finasterid-tabletter, fordi det aktive lægemiddelstof finasterid kan absorberes gennem huden. **Vask straks området med vand og sæbe**, hvis tabletten ved et uheld bliver ødelagt, og tabletten kommer i kontakt med huden.

Brug kondom ved samleje. Der kan være små mængder finasterid i mandens sæd. Hvis din partner er eller kan være gravid, bør du undgå, at hun kommer i berøring med din sæd, idet finasterid kan påvirke den normale udvikling af et drengeføster.

Finasterid 2care4 kan påvirke resultatet af en blodprøve for PSA (prostata-specifikt antigen), der eventuelt bliver taget for at undersøge, om en patient har kræft i prostata. Din læge bør dog være opmærksom på dette og kan derfor alligevel godt bruge blodprøven til det formål. Derfor skal du fortælle din læge, at du tager Finasterid 2care4, hvis du skal have taget en blodprøve for PSA.

Fortæl det til lægen, hvis du har været ude for noget af ovenstående tidligere eller nu.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Der er ikke påvist nævneværdige problemer med at tage Finasterid 2care4 sammen med anden medicin.

Brug af Finasterid 2care4 sammen med mad og drikke

Du kan tage Finasterid 2care4 sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Finasterid 2care4 er kun beregnet til mænd.

Knuste eller knækkede finasteridtabletter bør ikke håndteres af kvinder, som er eller potentielt kan være gravide. Hvis finasterid optages gennem huden eller tages gennem munden af gravide kvinder, som venter et drengeføster, kan barnet fødes med misdannede kønsorganer.

Brug kondom ved samleje. Der kan være små mængder finasterid i mandens sæd. Hvis din partner er eller kan være gravid, bør du undgå, at hun kommer i berøring med din sæd. Tabletterne er filmovertrukne, som forhindrer kontakt med finasterid, forudsat at tabletterne ikke er knuste eller knækkede.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Finasterid 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Finasterid 2care4

Finasterid 2care4 indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE FINASTERID 2CARE4

Tag altid Finasterid 2care4 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1 tablet daglig (svarende til 5 mg finasterid).

De filmovertrukne tabletter kan tages enten på tom mave eller sammen med mad. De bør synkes hele og bør ikke deles eller knuses.

Selvom en hurtig forbedring ses og mærkes, kan det være nødvendigt med behandling i mindst 6 måneder, for at vurdere om der er opnået tilfredsstillende effekt af behandlingen.

Lægen vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage Finasterid 2care4 5 mg. Afbryd ikke behandlingen for tidligt, da symptomerne så kan komme tilbage.

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ingen erfaring med brug af Finasterid 2care4 5 mg til patienter med nedsat leverfunktion (se også "Vær ekstra forsigtig med at tage Finasterid 2care4")

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig. Brug af Finasterid 2care4 5 mg til patienter i hæmodialysebehandling er ikke undersøgt.

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Finasterid 2care4 filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Finasterid 2care4 tabletter, end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis et barn har taget medicinen ved et uheld.

Hvis du har glemt at tage Finasterid 2care4

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis Finasterid 2care4. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Finasterid 2care4 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er impotens og nedsat sexlyst. Disse bivirkninger forekommer normalt i begyndelsen af behandlingen, men forsvinder for det meste hurtigt hos de fleste patienter, der fortsætter med behandlingen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Nedsat sexlyst, impotens, nedsat sædvolumen.
- Søvnighed.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Ømme bryster, forstørrede bryster, sædudtømningsforstyrrelser.
- Udslæt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Hjertebanken.
- Kløe, nældefeber.
- Overfølsomhedsreaktioner, herunder hævelse af ansigt og læber. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Forhøjede leverenzymmer.
- Smerter i testiklerne.

Finasterid kan påvirke resultatet af PSA-laboratorie-målinger.

Du skal straks nævne for din læge, hvis du bemærker ændringer i brystvæv såsom knuder, smerter eller flåd fra brystvorter, da dette kan være tegn på en alvorlig tilstand, f.eks. brystkræft.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetnings-skema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Finasterid 2care4 ved almindelig temperatur.

Opbevar Finasterid 2care4 i original emballage, da det er følsomt for fugt.

Brug ikke Finasterid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Finasterid 2care4 5 mg filmovertukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Finasterid.

Øvrige indholdsstoffer: Tabletterne: Lactose-monohydrat; cellulose, mikrokrySTALLINSK; glutenfri majsstivelse, pregelatineret; natriumstivelsesglycolat (type A); magnesiumstearat; docusatnatrium.

Filmovertæk: Hypromellose; titandioxid (E 171); indigotin (E 132); macrogol.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Finasterid 2care4 er blå, runde, hvælvede, filmovertukne tabletter med en diameter på 7 mm, og de er mærket med "F5" på den ene side.

Pakningsstørrelser

Finasterid 2care4 5 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 filmovertukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2013