

Indlægsseddel: Information til brugeren

Panodil Junior

24 mg/ml oral suspension

paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Panodil Junior uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Panodil Junior.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den senest opdaterede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Panodil Juniors virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Junior
3. Sådan skal du tage Panodil Junior
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Panodil Junior
6. Yderligere oplysninger

1. Panodil Juniors virkning og hvad du skal bruge det til

Panodil Junior virker smertestillende og febernedsættende.

Du kan tage Panodil Junior mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Lægen kan have givet dig Panodil Junior til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Junior

Tag ikke Panodil Junior, hvis:

- du er overfølsom over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer
- du har meget dårlig lever.

Vær ekstra forsigtig med at tage Panodil Junior

Advarsel

- Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.

- Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol er der risiko for overdosering.

Tal med lægen inden du tager Panodil Junior, hvis:

- du har dårlig lever.
- du har nedsat nyrefunktion.
- du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed (anoreksi) eller fejlnæring. Du skal evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.
- har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse) eller hvis smerterne varer længere end 3 dage.

Vær opmærksom på følgende

- Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
- Hvis du tager Panodil Junior mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.
- Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Panodil Junior. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
- medicin mod urinsyreigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
- blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Panodil Junior regelmæssigt og gennem længere tid.

Vær opmærksom på

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Panodil Junior mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen.

Brug af Panodil Junior sammen med mad og drikke

Du kan tage Panodil Junior i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan tage Panodil Junior under graviditet.

Amning

Du kan amme, selv om du tager Panodil Junior.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Panodil Junior påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Panodil junior

Panodil Junior indeholder sorbitol (E420) og maltitol (E965). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Panodil Junior indeholder natriumpropylparahydroxybenzoat (E217), natriumethylparahydroxybenzoat (E215) og natriummethylparahydroxybenzoat (E219). Kan give allergiske reaktioner, som kan komme efter behandlingen.

3. Sådan skal du tage Panodil Junior

Hvis din læge har ordineret Panodil Junior til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Behandlingen må normalt ikke vare længere end 3 dage. Tal med lægen hvis symptomerne varer ved.

Den sædvanlige dosis er:

Børn

Dosis afhænger af barnets vægt.

Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Dog ikke mere end 4000 mg dagligt.

Eksempler:

Et barn på 10 kg: 5 ml (120 mg) højst 4 gange dagligt.

Et barn på 20 kg: 10 ml (240 mg) højst 4 gange dagligt.

Et barn på 30 kg: 15 ml (360 mg) højst 4 gange dagligt eller 20 ml (480 mg) højst 3 gange dagligt.

Du må kun bruge Panodil Junior til børn under 2 år efter lægens anvisning.

Hvis du har taget for meget Panodil Junior

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Panodil Junior, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Tag pakningen med.

En større dosis Panodil Junior end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader.

Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven.

Du får umiddelbart ikke nogen symptomer (de kommer normalt først efter et par dage). Selvom du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade.

Det er vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen).

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastninger, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald vil du efter ca. 3 døgn miste bevidstheden og dø af leversvigt.

Hvis du har glemt at tage Panodil Junior

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. Bivirkninger

Panodil kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Vejtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes. Kontakt læge.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Nældefeber.
- Forhøjede levertal.
- Forhøjet serum kreatinin (mål for nyrefunktionen).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser.) Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Sådan opbevarer du Panodil Junior

- Opbevar Panodil Junior utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Panodil Junior over 25 °C.
- Brug ikke Panodil Junior efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Panodil Junior 24 mg/ml oral suspension indeholder

Aktivt stof: paracetamol.

Øvrige indholdsstoffer: Æblesyre, xanthangummi, flydende maltitol, jordbæraroma, sorbitol (E420), natriumpropylparahydroxybenzoat (E217), natriummethylparahydroxybenzoat (E219), natriumethylparahydroxybenzoat (E215), flydende sorbitol (E420), vandfri citronsyre, rensat vand.

Panodil Juniors udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Panodil Junior 24 mg/ml er en farveløs, viskøs suspension med små hvide krystaller.

Pakningsstørrelser

60, 100 eller 200 ml oral suspension.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline

Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Fremstiller

FARMACLAIR, Hérouville Saint Clair, Frankrig.

Denne indlægsseddel blev senest revideret i december 2012.