

**INDLÆGSESSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN****PROPECIA®****1 mg, filmovertrukne tabletter  
Finasterid**

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Propecia® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

**Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Propecia®.
3. Sådan skal du tage Propecia®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

**1. Virkning og anvendelse**

- Propecia® er et middel til behandling af mandligt hårtab (androgen alopeci). Propecia® bruges kun til mænd og bør ikke anvendes af kvinder eller børn.
- Propecia® virker fremmende på hårvækst ved at nedsætte niveauet af DHT i hovedbunden ved at hæmme et enzym (Type II 5-alfa reductase), der omdanner testosteron til DHT.
- Man mener, at årsagen til almindeligt mandligt hårtab er en kombination af arv og et bestemt hormon, dihydrotestosteron (DHT), der forkorter hårets vækstfase og udtynder håret. Spørg din læge hvis du har spørgsmål om mandligt hårtab.
- Mænd med mildt til moderat, men ikke totalt, hårtab kan forvente at have gavn af Propecia®.
- De fleste mænd, der har været i behandling med Propecia® i 5 år, har opnået nedsat hårtab, og mindst halvdelen af disse mænd har opnået forbedret hårvækst.

Lægen kan have givet dig Propecia® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

**2. Det skal du vide, før du  
begynder at tage Propecia®****Tag ikke Propecia®**

- hvis du er overfølsom over for finasterid eller

et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Propecia® (se pkt. 6). Tal med din læge eller apoteket, hvis du er i tvivl.

- hvis du er kvinde (da denne medicin er til mænd, se afsnittet Graviditet og amning). I kliniske undersøgelser er det vist, at Propecia® ikke virker hos kvinder med hårtab.

**Vær ekstra forsigtig med at tage Propecia®**

- Tal med lægen, inden du tager Propecia®, hvis har eller har haft helbredsproblemer, og hvis du lider af allergi.

**Brug af anden medicin**

Propecia® kan normalt tages sammen med anden medicin. Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

**Brug af Propecia® sammen med mad og drikke**


Du kan tage Propecia® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

**Graviditet og amning**

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Propecia® er kun til behandling af almindeligt mandligt hårtab.

**Graviditet**

- Kvinder må ikke tage Propecia® af hensyn til sikkerheden i forbindelse med graviditet.
- Kvinder, som er eller kan være gravide, må heller ikke røre ved knuste eller knækkede tabletter.
- Hvis en gravid kvinde optager det aktive stof i Propecia® gennem munden eller huden, kan det medføre misdannelse af kønsorganerne hos drengebørn.
- Hvis en gravid kvinde kommer i berøring med det aktive indholdsstof i Propecia®, bør lægen straks kontaktes.



- Propecia® tabletter er filmovertrukne, hvilket forhindrer kontakt med det aktive indholdsstof ved berøring, forudsat, at tabletterne ikke er knuste eller knækkede.

#### Amning:

Det vides ikke om finasterid udskilles i modermælk.

#### Trafik- og arbejdssikkerhed

Propecia® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

#### Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Propecia®

Propecia® indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager Propecia®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

### 3. Sådan skal du tage Propecia®

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl)

#### Den sædvanlige dosis er

##### Voksne:

1 tablet (1 mg) en gang dagligt. Tabletten kan tages sammen med eller uden mad. Propecia® vil ikke virke hurtigere eller bedre, hvis der tages mere end 1 tablet dagligt.

##### Børn:

Børn bør ikke tage Propecia®.

#### Nedsat nyrefunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Det er vigtigt, at du tager Propecia®, så længe din læge ordinerer det. Vedvarende behandling anbefales, hvis virkningen skal opretholdes.

Tag altid Propecia® nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

#### Hvis du har taget for mange Propecia®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Propecia® filmovertrukne tabletter, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering.

#### Hvis du har glemt at tage Propecia®

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du springe den glemte tablet over, og den næste tages til sædvanlig tid næste gang. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

#### Hvis du holder op med at tage Propecia®

Det vil som regel tage 3-6 måneder før en fuld effekt opnås. Det er vigtigt, du fortsætter med at tage Propecia® så længe, din læge foreskriver det. Hvis du stopper med at tage Propecia®, vil du sandsynligvis begynde at miste det nye hår, du har opnået, indenfor 9-12 måneder.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

### 4. Bivirkninger

Propecia® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne har som regel været midlertidige og er forsvundet, når behandlingen er stoppet.

#### Alvorlige bivirkninger

##### Hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

Kontakt straks lægen og stop med at tage Propecia®, hvis du oplever nogle af følgende symptomer:

- Hævelse af ansigt, tunge eller hals.

- Synkebesvær.
- Nældefeber.
- Besvær med at trække vejret.
- Ændringer i brystvæv eller sekretion fra brystvorte.

#### Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Nedsat lyst til sex.
- Rejsningsproblemer.
- Ændringer i sædvæske inklusive nedsat sædmængde.
- Deprimeret. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen

#### Hyppigheden ikke er kendt:

- Allergiske reaktioner såsom udslæt, kløe, nældefeber samt hævelse af læber og ansigt.
- Brystømhed og -forstørrelse.
- Testikelsmerter.
- Hjertebanken.
- Vedvarende rejsningsproblemer efter behandlingen er stoppet.
- Ufrugtbarhed er blevet set hos mænd, der har taget finasterid over en længere periode og har andre risiko faktorer, der påvirker frugtbarhed.
- Forhøjede levertal.

#### Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk) eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

### 5. Opbevaring

- Opbevar Propecia® utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Propecia® ved almindelig temperatur.
- Tag ikke Propecia® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

### 6. Yderligere oplysninger

Propecia® 1 mg, filmovertrukne tabletter indeholder: Finasterid 1 mg.

#### Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat, mikrokrySTALLINSK cellulose (E460), pregelatineret majsstivelse, natriumstivelsesglycollat, natriumdocusat, magnesiumstearat (E572), talkum, hypromellose, hydroxypropylcellulose (E463), titandioxid (E171), jernoxid (E172).

#### Pakningsstørrelser:

Propecia® fås i:  
Propecia® 1 mg i blisterpakninger med 7, 28, 30, 84 eller 98 tabletter.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  
Mail: [info@orifarm.com](mailto:info@orifarm.com)

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.