

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Alfuzosin Pfizer 10 mg depottabletter

alfuzosinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Alfuzosin Pfizer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alfuzosin Pfizer
3. Sådan skal du tage Alfuzosin Pfizer
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Alfuzosin Pfizer hører til en gruppe lægemidler, som kaldes alfablokkere.

Alfuzosin Pfizer anvendes til at behandle moderate til stærke symptomer på forstørret blærehalskirtel (prostata) også kaldet godartet prostatahypertrofi. Dette er en tilstand, hvor blærehalskirtlen forstørres (hyperplasi), men væksten i sig selv er ikke kræftagtig (men godartet). Det forekommer oftest hos ældre mænd.

Blærehalskirtlen sidder under blæren omkring urinrøret (det rør, som fører din urin ud af kroppen). Med alderen kan blærehalskirtlen vokse og presse urinrøret, som gøres smallere. Dette kan give problemer med vandladning såsom hyppig vandladning og besværet vandladning.

Alfuzosin Pfizer virker ved at afslappe blærehalskirtlens muskler. Dette nedsætter indsnævringen af urinrøret og gør vandladning lettere.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ALFUZOSIN PFIZER

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Alfuzosin Pfizer

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for alfuzosin eller et af de øvrige indholdsstoffer i tabletterne (se afsnit 6). Symptomer på en allergisk reaktion omfatter: udslæt, hævelse af dine læber, hals eller tunge, synkebesvær eller åndenød.
- hvis du er allergisk over for stoffer tilsvarende alfuzosin (såsom terazosin og doxozosin).
- hvis du har eller har haft lavt blodtryk, når du rejser dig fra siddende eller liggende stilling (den medicinske betegnelse for dette er ortostatisk hypotension). Det kan få dig til at blive svimmel, uklar eller besvime, hvis du rejser eller sætter dig op hurtigt.
- hvis du allerede tager en anden alfa-1 blokker (såsom terazosin, doxazosin). Se afsnit neden for "Brug af anden medicin". Spørg din læge eller på apoteket, hvis du er i tvivl.
- hvis du har leverproblemer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Alfuzosin Pfizer

- hvis du tager anden medicin mod forhøjet blodtryk. I så fald vil lægen kontrollere dit blodtryk regelmæssigt, især i begyndelsen af behandlingen.
- hvis du mærker svimmelhed, svaghed eller svedudbrud i løbet af få timer efter du har taget Alfuzosin Pfizer, skal du lægge dig ned med ben og fødder i vejret indtil symptomerne er forsvundet. Disse virkninger vil normalt være kortvarige og forekommer i begyndelsen af behandlingen. Normalt vil det ikke være nødvendigt at standse behandlingen. (se afsnit 4).
- hvis du tidligere har haft et markant blodtryksfald efter indtagelse af anden medicin i gruppen af alfablokkere. I så fald vil din læge påbegynde behandling med en lav dosis alfuzosin og gradvist øge dosis.
- hvis din tilstand er således, at dine nyrer næsten ikke fungerer (alvorlige nyreproblemer).
- hvis du lider af akut hjertesvigt (hjertet har utilstrækkelig pumpekraft).
- hvis du har hjertekrampe (angina pectoris) og får nitrat (medicin, der udvider de kar, hvori blodet cirkulerer i din krop og gør det lettere for blodet at strømme), da det kan øge risikoen for et blodtryksfald. Du bør rådføre dig med din læge, om du skal fortsætte eller holde op med at tage Alfuzosin Pfizer, særlig hvis brystmerterne vender tilbage eller tager til.
- hvis du skal opereres for grå stær (sløret syn), skal du inden operationen informere øjenspecialisten om, at du tager Alfuzosin Pfizer eller tidligere har været behandlet med en alfablokker. Dette skyldes, at Alfuzosin Pfizer kan give komplikationer under din operation, hvilket kan håndteres af øjenspecialisten, hvis denne er informeret før operationen.
- hvis du lider af en fejl i hjerterytmen, eller hvis du tager medicin, som kan give en fejl i hjerterytmen (den medicinske betegnelse for denne fejl er QTc-forlængelse). I dette tilfælde bør din læge undersøge dig før behandlingen påbegyndes, samt løbende under behandlingen med Alfuzosin Pfizer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

- brug ikke Alfuzosin Pfizer samtidig med andre alfablokkere såsom doxazosin, prazosin, terazosin eller tamsulosin (se afsnit "Tag ikke Alfuzosin Pfizer").
- hvis du tager medicin mod for højt blodtryk (antihypertensiva) eller medicin til behandling af brystmerter (nitrater) på samme tid, kan du blive svimmel, svag eller begynde at svede i løbet af få timer efter at have taget medicinen. Hvis det sker, skal du lægge dig ned og blive liggende, indtil symptomerne er helt væk. Sig det til lægen, så denne kan afgøre om dosis af din medicin skal ændres. (Se afsnit "Vær ekstra forsigtig med at tage Alfuzosin Pfizer").
- hvis du skal gennemgå en operation, som kræver generel anæstesi, skal du før operationen sige til lægen, at du tager Alfuzosin Pfizer. Lægen kan beslutte at standse Alfuzin Pfizer 24 timer før operationen. Det skyldes, at det kan blive livstruende da medicinen sænker blodtrykket.

Denne virkning og bivirkninger af alfuzosin kan øges af nogle lægemidler, som anvendes til svampeinfektioner (såsom ketoconazol, itraconazol), visse antibiotika (såsom clarithromycin, erythromycin) og medicin til behandling af HIV (såsom ritonavir).

Brug af Alfuzosin Pfizer sammen med mad og drikke

- Tag Alfuzosin efter et måltid.
- Du kan blive svimmel eller svag, når du tager Alfuzosin Pfizer. Drik ikke nogen form for alkohol, hvis det sker.

Graviditet og amning

Ikke relevant, da alfuzosin kun er beregnet til mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan blive svimmel eller svag, når du tager Alfuzosin Pfizer.

Kør ikke bil og lad være med at betjene med maskiner før du ved, hvordan kroppen reagerer på behandlingen.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ALFUZOSIN PFIZER

Tag altid Alfuzosin Pfizer nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

- Synk tabletterne hele med rigelig væske (f.eks. et glas vand).
- Del, knus eller tyg ikke tabletterne. Dette kan påvirke frigivelsen af din medicin i kroppen.
- Den første dosis af medicinen bør tages lige før sengetid.
- Tag medicinen lige efter spisning (umiddelbart efter det samme måltid hver dag, dvs. på samme tid hver dag). Tag ikke medicinen på tom mave.

Voksne:

Den sædvanlige dosis er en Alfuzosin Pfizer 10 mg depottablet en gang daglig.

Ældre patienter (over 65 år):

Den sædvanlige dosis er en Alfuzosin Pfizer 10 mg depottablet en gang daglig. Det er ikke nødvendigt at justere dosis til ældre (over 65 år).

Patienter med milde til moderate nyreproblemer:

Dosis behøver ikke at blive justeret ved milde til moderate nyreproblemer.

Hvis du har taget for mange Alfuzosin Pfizer depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Alfuzosin Pfizer end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag denne indlægsseddel eller nogle tabletter med, således at lægen kan se, hvad du har taget. Sig til lægen, hvor mange tabletter, du har taget. Lig ned så meget som muligt for at hjælpe med at stoppe bivirkningerne. Forsøg ikke selv at køre til hospitalet.

Hvis du har glemt at tage Alfuzosin Pfizer

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet, da dette kan føre til et pludseligt fald i blodtrykket. Spring den glemte dosis over og tag næste tablet efter anvisningen.

Hvis du holder op med at tage Alfuzosin Pfizer

Du bør ikke afbryde eller stoppe med at tage Alfuzosin Pfizer uden først at tale med din læge. Tag tabletterne som anvist og så længe som anvist. Ophør ikke med at tage dem, selv om du føler dig bedre da symptomerne ellers kan komme igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Alfuzosin Pfizer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Disse bivirkninger forekommer oftest i begyndelsen af behandlingen.

Følgende er anvendt til at fastsætte hyppigheden af bivirkningerne:

- Meget almindelig (forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede)
- Almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede, men hos færre end 1 ud af 10 behandlede)
- Ikke almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 1.000, men hos færre end 1 ud af 100 behandlede)
- Sjælden (forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 behandlede, men hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede)
- Meget sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 behandlede)
- Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Følgende bivirkninger kan forekomme:

Meget alvorlige bivirkninger

Meget sjældent rapporteret (påvirker mindre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Hurtig hævelse af øjenlåg, ansigt, læber, mund og tunge, åndedrætsbesvær, udslæt, nældefeber og kløe. Dette er symptomer på en meget alvorlig allergisk reaktion (Den medicinske betegnelse for disse symptomer er **angioødem**).
- Fornemmelse af tæthed, tyngde, utilpashed eller pressende smerte som mærkes bag brystbenet og kan spredes til arme, nakke og kæbe. (Dette kan være tegn på **angina**). Dette sker normalt kun, hvis du tidligere har haft angina.

Hvis nogen af ovennævnte bivirkninger forekommer, skal du stoppe med at tage Alfuzosin Pfizer og straks kontakte din læge eller skadestuen på nærmeste hospital.

Andre bivirkninger inkluderer:

Almindelige

- Svimmelhedsfølelse, omtågethed eller svaghed, når du rejser dig hurtigt (ortostatisk hypotension)
- Hovedpine
- Kvalme
- Mavesmerter
- Løs afføring (diarré)
- Mundtørhed
- Svaghed eller træthed

Ikke almindelige

- Hurtigt hjerteslag (takykardi) og opmærksomhed på hjertebanken (hjertebanken)
- Brystsmerter
- Sløvhed
- opkastning)
- Udslæt, nældefeber og kløe
- Rødmen
- Ophobning af væske i kroppen (kan give hævede arme eller ben)
- Almindelig følelse af utilpashed
- Synsforstyrrelser
- Kan ikke holde på vandet (urininkontinens)
- Løbende næse

Meget sjældne bivirkninger

- Gulfarvning af hud og det hvide i øjnene med nedsat appetit og mavesmerter (disse kan være tegn på leverproblemer)
- Forlænget eller smertefuld erektion af penis, ikke relateret til seksuel aktivitet (dette kan være en medicinsk tilstand kaldet priapisme)

Bivirkninger uden kendt hyppighed

- Under øjenoperation for slørede linser (grå stær), kan pupillen (den sorte cirkel i midten af dit øje) ikke øges til den behøvede størrelse. Iris (den farvede del af øjet) kan også blive slap under operation.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Alfuzosin Pfizer efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Alfuzosin Pfizer indeholder:

- Aktivt stof: Alfuzosinhydrochlorid. Hver depottablet indeholder 10 mg alfuzosin som alfuzosinhydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose (E464), hydrogeneret vegetabilsk olie, povidon (E1201), calciumhydrogenphosphat (E341), carbomer, kolloid vandfri silica (E551), magnesiumstearat (E473b), propylenglycol (E1520), titandioxid (E171).

Tabletterne har en forlænget virkning, hvilket betyder at det aktive stof efter indtagelse bliver ikke bliver frigjort fra tabletten straks men gradvist og derfor virker længere.

Udseende og pakningsstørrelser

Alfuzosin Pfizer 10 mg depottabletter er hvide til offwhite, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med "X" på den ene side og "47" på den anden side.

Alfuzosin Pfizer 10 mg depottabletter findes i aluminiums blisterpakning og HDPE-beholder med silicagel tørremiddel.

Pakningsstørrelser:

Aluminiums blisterpakning: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 og 100 tabletter

HDPE-beholder: 30 og 1000 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Pfizer ApS
Lautrupvang 8
2750 Ballerup
Danmark

Fremstiller

Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, B -1930, Zaventem, Vlaams Brabant, Belgien.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark:	Alfuzosin Pfizer 10 mg depottabletter
Finland:	Alfuzosin hydrochloride Pfizer 10 mg depottabletti

Frankrig:	Alfuzosine Pfizer L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée
Italien:	Alfuzosina Pfizer 10 mg compresse a rilascio prolungato
Holland:	Alfuzosine HCl Pfizer 10 mg, tabletten met gereguleerde afgifte
Spanien:	ALFUZOSINA PHARMACIA 10 mg comprimidos de liberación prolongada EFG
Storbritannien:	Kelanu 10 mg prolonged release tablets
Sverige:	Alfuzosin Pfizer 10 mg depottabletter

Denne indlægsseddel blev senest revideret i januar 2011.

Yderligere information om Alfuzosin Pfizer på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.