

# INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

## FAMVIR® 500 mg filmovertrukne tabletter

famciclovir

DKP035-3-a

### Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Famvir til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

### Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Famvir.
3. Sådan skal du tage Famvir.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

## 1. Virkningen og anvendelse

Famvir er en antiviral medicin. Den forhindrer den inficerende virus i at formere sig. Da virus formerer sig meget tidligt i infektionen, vil du have størst gavn af behandlingen, hvis du begynder på behandlingen med Famvir så tidligt som muligt efter, at de første symptomer opstår.

Famvir bruges til at behandle to typer af virusinfektion hos voksne:

- Helvedesild (herpes zoster), der er en virusinfektion, som forårsages af en virus som kaldes varicella zoster (den samme virus, som giver skoldkopper). Famvir forhindrer virus i at spredes i kroppen.
- Famvir bruges også til behandling af helvedesild i området omkring øjet eller i selve øjet (oftalmisk zoster).
- Genital herpes der er en virusinfektion, som forårsages af herpes simplex-virus type 1 eller 2. Den spredes normalt ved seksuel kontakt. Den giver blistre og brænden eller kløe omkring kønsdelene, hvilket kan være smertefuldt. Famvir bruges til at behandle genital herpes hos voksne.

Personer, som ofte har genital herpes, kan også tage Famvir som hjælp til at forebygge angrebene.

Lægen kan have givet dig Famvir for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

## 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Famvir

### Tag ikke Famvir

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for famciclovir, et af de øvrige indholdsstoffer (i pkt. 6), eller over for penciclovir (den aktive metabolit af famciclovir og et indholdsstof i visse andre lægemidler).

Spørg din læge til råds, hvis du tror, du er overfølsom.

### Vær ekstra forsigtig med at tage Famvir

- Hvis du har nyreproblemer (eller tidligere har haft det). Din læge kan beslutte at give dig en lavere Famvir-dosis.
- Hvis du har problemer med dit immunforsvar.
- Hvis du har leverproblemer.

Hvis noget af ovenstående passer på dig, skal du fortælle det til din læge, før du begynder at tage Famvir.

### Undgå at smitte andre med herpes

Undgå seksuel kontakt med andre, hvis du har genital herpes - også selvom du er begyndt behandling med Famvir. Du kan overføre herpesinfektionen til din partner.

### Børn og unge (under 18 år)

Det frarådes at bruge Famvir til børn og unge.

### Undgå at smitte andre med genital herpes

Hvis du tager Famvir for at behandle eller undertrykke genital herpes, eller hvis du tidligere har haft genital herpes, bør du fortsat praktisere sikker sex, inklusiv brug af kondom. Dette er vigtigt for at undgå, at du overfører infektionen til andre. Du bør ikke have sex, hvis du har genitale sår eller blistre.

### Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til din læge eller på apoteket, hvis du tager nogen af følgende lægemidler:

- Raloxifen (bruges til at forebygge og behandle osteoporose).
- Probenecid (bruges til at behandle højt indhold af urinsyre i blodet i forbindelse med gigt og til at øge blodets antibiotikaindhold af penicillin-typen), eller enhver anden medicin, som kan påvirke nyrerne.

### Brug af Famvir sammen med mad og drikke

Du kan tage Famvir i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

### Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

#### Graviditet:

- Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Famvir. Tal med lægen.

#### Amning:

- Fortæl din læge hvis du ammer. Du må ikke tage Famvir hvis du ammer, med mindre det er absolut nødvendigt.

### Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist om Famvir påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Der er set: svimmelhed, døsigthed forvirring eller andre forstyrrelser i centralnervesystemet.

## 3. Sådan skal du tage Famvir

Tag altid Famvir nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

### Voksne:

- Den daglige dosis og varigheden af behandlingen vil afhænge af den type virusinfektion, du har - se nedenfor. Din læge vil ordinere den korrekte dosis til dig.
- Det bedste resultat af behandling opnås, hvis behandlingen påbegyndes så hurtigt som muligt efter, at de første symptomer opstår.

- Undgå seksuel kontakt med andre, hvis du har symptomer på genital herpes - også selvom du er påbegyndt behandlingen med Famvir. Du kan overføre herpesinfektionen til din partner.
- Hvis du har eller har haft nyreproblemer, kan din læge beslutte at give dig en lavere dosis af Famvir.

### Dosering ved helvedesild

Hvis dit immunsystem er normalt, er den anbefalede dosis

- 500 mg, tre gange daglig i syv dage. Hvis dit immunsystem er nedsat, er den anbefalede dosis
- 500 mg, tre gange daglig i 10 dage.

### Dosering ved genital herpes

Dosis afhænger af tilstanden i dit immunsystem og stadiet af din infektion.

Hvis du har et normalt immunsystem, er den anbefalede dosis:

- 250 mg, tre gange daglig i 5 dage, ved første anbrud.

For at behandle yderligere udbrud, straks efter symptomer (prikken, kløe, brændende fornemmelse, smerter) forekommer, er den anbefalede dosis:

- 125 mg, to gange daglig i 5 dage.

For at forebygge yderligere udbrud, er den anbefalede dosis:

- 250 mg to gange daglig.

Hvis dit immunsystem er nedsat, er doseringen:

For at behandle det aktuelle udbrud, er den anbefalede dosis:

- 500 mg, to gange daglig i syv dage.

For at forebygge fremtidige udbrud, er dosis

- 500 mg to gange daglig.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage dine tabletter.

Famvir fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Famvir til alle de anførte doseringer.

### Ældre over 65 år:

Ændring af dosis er ikke nødvendig, med mindre nyrefunktionen er nedsat.

### Børn og unge under 18 år:

Børn og unge under 18 år må kun få Famvir efter lægens anvisning.

### Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Der er ingen tilgængelige data for personer med alvorlig nedsat leverfunktion.

### Hvis du har taget for mange Famvir

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end du har fået besked på at tage, eller hvis nogen ved et uheld tager din medicin. Tag pakningen med.

### Hvis du har glemt at tage Famvir

Hvis du har glemt at tage en dosis Famvir-tabletter, bør du tage den så snart du kommer i tanker om det. Tag derefter den næste dosis som planlagt. Tag dog ikke to doser inden for et tidsinterval på mindre end en time. I sådanne tilfælde skal du springe den glemte dosis over. Tag heller aldrig en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

## 4. Bivirkninger

Famvir kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger, som forårsages af Famvir, er normalt milde til moderate i intensitet.

### Alvorlige bivirkninger

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

### Hypigheden er ikke kendt:

- Alvorlige hudreaktioner (f.eks. blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og ben/fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber og evt. voldsom afskalning af yderste hudlag). Kontakt læge eller skadestue.

### Ikke alvorlige bivirkninger

**Meget almindelige bivirkninger** (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Hovedpine

### Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Svimmelhed
- Kvalme, opkastning
- Udslæt, kløe
- Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være eller blive alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.

**Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Konfusion, døsigthed (hovedsagligt hos ældre)
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

### Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk).

## 5. Opbevaring

- Opbevar Famvir utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Famvir ved temperaturer over 25°C.
- Opbevar Famvir i original emballage for at beskytte mod fugt.
- Brug ikke Famvir, hvis du opdager, at pakningen er beskadiget eller viser tegn på at have været åbnet.
- Brug ikke Famvir efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det, at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## 6. Yderligere oplysninger

**Famvir, filmovertrukne tabletter indeholder:**  
Famciclovir

### Øvrige indholdsstoffer:

hydroxypropylcellulose, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, titandioxid (E 171), hypromellose, macrogoler (4000 og 6000).

### Pakningsstørrelser:

Famvir fås i:

Famvir 500 mg i pakning med 21 filmovertrukne tabletter.

### Indehaver af markedsføringstilladelsen

Copharma ApS, Kanalholmen 14-18,  
DK-2650 Hvidovre  
Mail: [Info@copharma.dk](mailto:Info@copharma.dk)

### Fremstiller

Novartis Farmaceutica S.A.,  
Barbera Del Valles, Spanien

Copharma ApS, Kanalholmen 14-18,  
DK-2650 Hvidovre

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Copharma ApS

**Denne indlægsseddel er sidst revideret september 2015**