

Desmopressin A-Pharma, 0,10 mg/ml næsespray, opløsning

Desmopressinacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desmopressin A-Pharma
3. Sådan skal du tage Desmopressin A-Pharma
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Desmopressin A-Pharma næsespray virker ved at regulere nyrenes evne til at koncentrere urin. Derved nedsættes mængden af urin.

Desmopressin A-Pharma næsespray anvendes til:

- behandling af diabetes insipidus (kronisk sygdom præget af forøget tørst og forøget urinproduktion)
- undersøgelser af nyrenes evne til at koncentrere urin.

Lægen kan have givet dig Desmopressin A-Pharma for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desmopressin A-Pharma

Tag ikke Desmopressin A-Pharma:

- hvis du er allergisk over for desmopressinacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Desmopressin A-Pharma (angivet i pkt. 6)
- hvis du lider af en sygdom der får dig til at indtage unormalt meget væske (polydipsi)
- hvis du lider af en sygdom fremkaldt af din graviditet (gestosis)
- hvis du har en hjertesygdom
- hvis du har en moderat eller alvorlig nedsat nyrefunktion
- hvis du tager vanddrivende medicin
- hvis du har et syndrom med utilstrækkelig udskillelse af antidiuretisk hormon (SIADH)
- hvis du har for lav koncentration af natrium i blodet (hyponatriæmi).

Tal med lægen eller apoteket, hvis noget af ovenstående gør sig gældende for dig, eller hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl din læge, hvis du lider af eller nogensinde har lidt af nogen af de nedenstående tilstande eller sygdomme:

- hvis du lider af en hjertesygdom eller sygdomme i hjertets kranspulsårer (især ældre)
- hvis du lider af forhøjet blodtryk
- hvis du har kronisk nyresvigt eller øget tryk inde i hovedet
- hvis du er i behandling med vanddrivende midler

- hvis du lider af forstyrret væske- og/eller elektrolytbalance. Lægen kontrollerer din elektrolytbalance under behandlingen.
- hvis du tidligere er blevet by-pass opereret (kan medføre alvorlig nedsat blodtryk)
- hvis du lider af cystisk fibrose
- hvis du er meget ung eller ældre
- hvis du har arvæv i næsen eller lider af forstoppet næse

Dosis af desmopressin skal måske tilpasses særligt til dig.

Indtagelse af væske under behandling med Desmopressin A-Pharma

- Alle patienter, der behandles med Desmopressin A-Pharma, skal undgå overdrevet indtag af væske, da det kan føre til ophobning af vand i kroppen. Kropsvægten skal kontrolleres under behandlingen og ved vægtøgning skal du kontakte din læge.
- Når Desmopressin A-Pharma næsespray bruges til undersøgelse af nyrenes evne til at koncentrere urin, skal du drikke mindst muligt (maksimalt 0,5 liter) i perioden fra 1 time før til 8 timer efter, at du har taget medicinen.

Brug af anden medicin sammen med Desmopressin A-Pharma

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tal med lægen hvis du tager:

- Hvis du er i behandling med visse former for medicin, kan risikoen for ophobning af væske i din krop øges:
- tricykliske antidepressiva (mod depression)
 - chlorpromazin (mod skizofreni og andre psykoser)
 - carbamazepin (mod f.eks. epilepsi)

Desmopressin A-Pharmas virkning kan øges, hvis du samtidig behandles med:

- oxytocin (mod brystspænding)
- clofibrat (til sænkning af kolesterol i blodet)
- indomethacin (mod gigt)

Desmopressin A-Pharmas virkning kan svækkes, hvis du samtidig behandles med:

- glibenclamid (mod sukkersyge)
- lithium (mod manier)
- ikke-steroid betændelseshæmmende lægemidler (NSAID'ere)

Desmopressin A-Pharma kan øge virkningen af lægemidler mod lavt blodtryk, og nedsætte virkningen af lægemidler mod forhøjet blodtryk.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Desmopressin A-Pharma efter aftale med lægen.

Amning

Du kan tage Desmopressin A-Pharma, hvis du ammer dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Desmopressin A-Pharma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Desmopressin A-Pharma

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Sprayflasken indeholder ca. 50 doser af 10 mikrogram. Et pust giver en dosis på 10 mikrogram.

Hvis der er ordineret højere doser anbefales det, at der administreres med halvdelen af dosis i hvert næsebor.


Den sædvanlige dosis er:

Behandling af diabetes insipidus:

Voksne: 1-2 pust (10-20 mikrogram) 1-2 gange dagligt.
Børn og unge: 1 pust (10 mikrogram) 1-2 gange dagligt.

Undersøgelse af nyrenes evne til at koncentrere urin:

Voksne: 4 pust (40 mikrogram).
Børn over 1 år og unge: 2 pust (20 mikrogram).
Børn under 1 år: 1 pust (10 mikrogram).



1. Puds næsen, og fjern beskyttelseshætten på sprayflasken.
2. For at opnå korrekt dosering, er /det vigtigt, at plastslangen er dækket af væske.
3. Hold sprayflasken som vist på billedet. Inden næsesprayen anvendes første gang fyldes pumpen ved at pumpe 3 gange eller indtil et jævnt pust opnås. Herefter er sprayen klar til anvendelse.
4. Bøj hovedet let tilbage og før spidsen af sprayen op i næseboret. Hold vejret uden at snuse indad og tryk 1 gang på sprayen. Hvis det er nødvendigt at tage mere end ét pust per næsebor, indlægges en pause på ca. 1 minut mellem hver pust i samme næsebor.
5. Sæt beskyttelseshætten på efter brug.

Flasken må ikke opbevares over 25 °C. Hvis næsesprayen ikke har været i brug indenfor de sidste 7 dage, skal pumpen igen fyldes, før du anvender sprayen i næsen. Spray mindst 1 gang ud i luften indtil et jævnt pust opnås. Pumpen er nu atter klar til brug.

Hvis du har taget for meget Desmopressin A-Pharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Desmopressin A-Pharma, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Desmopressin A-Pharma kan ved overdosering øge risikoen for ophobning af væske i kroppen og føre til nedsat indhold af natrium i blodet. Symptomerne på væskeophobning er øget kropsvægt, hovedpine, kvalme, mavekrampe, og i alvorlige tilfælde krampe og bevidstløshed.

Hvis du har glemt at tage Desmopressin A-Pharma

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Vent til næste dosis skal tages og forsat derefter behandlingen som normalt.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

- (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):
- Hovedpine, mavesmerter, tilstoppet næse, snue, næseblod, kvalme, træthed og svimmelhed.

Sjældne bivirkninger

- (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):
- Vrangforestillinger, ophidselse, forbigående ændringer i opførsel, væskeansamling i hjernen, hjertebanken, forhøjet blodtryk, rødmen og allergiske reaktioner som fx kløe, udslæt, feber og krampelignende sammentrækninger i bronkierne, overfølsomhed.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- For lav koncentration af natrium i kroppen (hyponatriæmi).

Hvis du har en hjertesygdom, kan der opstå hjertekramper (angina pectoris), når du behandles med Desmopressin A-Pharma.

Hvis ikke væskeindtaget begrænses som angivet under punktet "Vær ekstra forsigtig med at bruge Desmopressin A-Pharma", kan unormalt meget væske opsamles i kroppen og føre til vægtøgning, hovedpine, kvalme og væskeansamlinger, sænket natriumindhold i blodet og i alvorlige tilfælde krampe og koma.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Opbevar Desmopressin A-Pharma utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Må ikke fryses.

Brug ikke Desmopressin A-Pharma efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desmopressin A-Pharma indeholder:

- Aktivt stof: Desmopressinacetat. 1 ml opløsning indeholder 0,10 mg desmopressinacetat.
- Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, kalium-sorbat (E202), saltsyre

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Opløsningen er en klar, farveløs væske.

Pakningsstørrelser

Pakninger med 1x5 ml, 3x5 ml. (5 ml svarer til 50 doser af 10 mikrogram).

Indehaver af markedsføringstilladelsen

A-Pharma ApS
Usserød Kongevej 32
2970 Hørsholm

Ompakket og frigivet af:

Copharma ApS
Kanalholmen 8-12
2650 Hvidovre

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2012