

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

**B-combin Stærk SAD injektionsvæske, opløsning
5 mg/ml + 25 mg/ml + 2,5 mg/ml + 2 mg/ml + 5 mg/ml**
Dexpanthenol, nicotinamid, pyridoxinhydrochlorid,
riboflavinnatriumphosphat og thiaminhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret B-combin Stærk SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage B-combin Stærk SAD
3. Sådan skal du tage B-combin Stærk SAD
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

B-combin Stærk SAD er et B-vitamin lægemiddel (B₅-vitamin, B₃-vitamin, B₆-vitamin, B₂-vitamin og B₁-vitamin).

B-combin Stærk SAD anvendes til forebyggelse og behandling af B-vitaminmangel.

Du vil få B-combin Stærk SAD som en indsprøjtning i en blodåre eller i en muskel af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan give dig B-combin Stærk SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE B-COMBIN STÆRK SAD

Tag ikke B-combin Stærk SAD

- hvis du er overfølsom overfor et af de aktive indholdsstoffer

Brug af anden medicin sammen med B-combin Stærk SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

- medicin mod Parkinsons sygdom (levodopa)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må få B-combin Stærk SAD, hvis du er gravid. Følg lægens anvisning.

Amning

Du må få B-combin Stærk SAD, hvis du ammer. Følg lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

B-combin Stærk SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE B-COMBIN STÆRK SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

B-combin Stærk SAD findes som injektionsvæske, der indgives i en blodåre eller i en muskel. Du vil normalt få B-combin Stærk SAD af en læge eller sygeplejerske.

Du må få B-combin Stærk SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Voksne

Sædvanlig dosis er 1-2 ml i døgnet i 1-2 uger.

Hvis du har brugt for meget B-combin Stærk SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget B-combin Stærk SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Hvis du har glemt at bruge B-combin Stærk SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage B-combin Stærk SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede) **eller meget sjældne bivirkninger** (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) **inkl. enkeltstående tilfælde:**

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt, Ring 112.

Ikke alvorlige: Overfølsomhedsreaktioner. Svedudbrud.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Ikke alvorlige: Brændende fornemmelse ved stedet for indsprøjtning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Opbevar B-combin Stærk SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke B-combin Stærk SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

B-combin Stærk SAD injektionsvæske, 5 mg/ml + 25 mg/ml + 2,5 mg/ml + 2 mg/ml + 5 mg/ml indeholder:

Aktive stoffer: Dexpanthenol, nicotinamid, pyridoxinhydrochlorid, riboflavinatriumphosphat og thiaminhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: Koncentreret saltsyre, vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

B-combin Stærk SAD er en klar, mørk brungul væske.

B-combin Stærk SAD findes i pakningsstørrelser på:
2 ml ampuller x 10.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller
Region Hovedstadens Apotek
Marielundvej 25
2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på
www.produktresume.dk

Vnr. 701425-01