

Indlægsseddel: Information til brugeren

Natriumbikarbonat SAD, koncentrat til infusionsvæske, opløsning 1 mmol/ml

natriumhydrogencarbonat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Natriumbikarbonat SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Natriumbikarbonat SAD
3. Sådan skal du tage Natriumbikarbonat SAD
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Natriumbikarbonat SAD er et lægemiddel til korrektion af væske- og saltbalancen.

Natriumbikarbonat SAD anvendes ved tilstande med syreophobning i kroppen.

Du vil få Natriumbikarbonat SAD som en infusion i en blodåre (intravenøs anvendelse) af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan give dig Natriumbikarbonat SAD for noget andet. Spørg lægen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Natriumbikarbonat SAD

Tag ikke Natriumbikarbonat SAD

- hvis du er allergisk over for Natriumbikarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Natriumbikarbonat SAD (angivet i afsnit 6)
- hvis du har for meget syre i blodet (respiratorisk acidose)
- hvis du har vejrtrækningsproblemer (respiratorisk insufficiens)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Natriumbikarbonat SAD:

- hvis du har forstyrrelse i kroppens syre-base-balance med baseoverskud i blodet. (respiratorisk alkalose, dvs. nedsat kuldioxidtryk i blodet, og metabolisk alkalose, dvs. forhøjet bicarbonatindhold i blodet)
- hvis du har dårligt fungerende hjerte
- hvis du har dårligt fungerende nyrer
- hvis du har for lavt kalk (calcium) i blodet
- hvis du har for lavt chlor i blodet

Det er vigtigt at lægemidlet bliver indgivet langsomt. Hurtig indgivelse kan forårsage vand i lungerne hos patienter, der har en hjertesygdom.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Natriumbikarbonat SAD. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Natriumbikarbonat SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

- Medicin mod smerter (salicylsyre)
- Medicin mod kramper (fenobarbital)
- Medicin mod hoste (ephedrin)
- Vanddrivende medicin (thiazider eller loopdiuretika)
- Binyrebarkhormoner (kortikosteroider)
- Medicin mod sindslidelser (lithium)
- Medicin mod betændelse (tetracykliner)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må få Natriumbikarbonat SAD, hvis du er gravid. Følg lægens anvisning.

Amning

Du må få Natriumbikarbonat SAD, hvis du ammer. Følg lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Natriumbikarbonat SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Natriumbikarbonat SAD indeholder natrium, hvor advarsel er påkrævet

Denne medicin indeholder 1 mmol natrium/ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage højde hertil.

3. Sådan skal du tage Natriumbikarbonat SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Natriumbikarbonat SAD findes som et koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indgives i en blodåre. Du vil normalt få Natriumbikarbonat SAD af en læge eller sygeplejerske.

Du må få Natriumbikarbonat SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Dosering

Dosis er individuel og afhænger af patientens syre-basebalance.

Dosering

Startdosis er 2-5 mmol/kg over 4-8 timer afhængig af sværhedsgraden af patientens syre-basebalance. Der bør samtidig foretages kontrol af blodets syre-baseniveau og af kalium-indholdet i blodet. Den maksimale daglige dosis for patienter under 60 år er 16 g.

Ældre (over 60 år)

Den maksimale daglige dosis er 8 g.

Børn

En anbefalet startdosis for børn er 1 mmol/ indgivelse i en blodåre. De efterfølgende doser reguleres på baggrund af lægens vurdering af eventuelle analyser eller efter stop i behandlingen (en 10 minutters pause efter første dosis). Lægemidlet skal indgives langsomt. Den maksimale daglige dosis er 8 mmol/kg.

Hvis du har brugt for meget Natriumbikarbonat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Natriumbikarbonat SAD, vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Hvis du har fået for meget Natriumbikarbonat SAD, kan du få følgende symptomer:

- Væskeophobning
- Kredsløbssvigt
- Kramper
- Sløvhed
- Nedsat bevidsthed
- Uregelmæssig puls
- Metabolisk alkalose (forhøjet bicarbonatindhold i blodet)

Hvis du har glemt at bruge Natriumbikarbonat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Natriumbikarbonat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Alvorlige: Træthed, sløvhed, stigende til koma. Tendens til muskelkramper og forstyrrelser i hjerterytmen (puls), kramper i svælget pga. for lidt syre i blodet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlige: Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige: Svimmelhed. Smerte og irritation ved stedet for indsprøjtning.

Sure opstød. Luftafgang fra tarmen. Oppustet mave. Sløvhed. Kalkaflejringer. Mentale forstyrrelser. Nedsat tilførelse af blod til væv.

Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med lægen.

Sænkning af blodets surhedsgrad pga. forhøjet indhold af mælkesyre.

Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalk i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

For lavt chlor i blodet. De fleste mærker ingen symptomer på for lavt indhold af chlor i blodet.

Tørst pga. for højt natrium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Forhøjet natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med kramper, bevidstløshed og koma. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Opbevar Natriumbikarbonat SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Natriumbikarbonat SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Natriumbikarbonat SAD koncentrat til infusionsvæske indeholder:

- Aktivt stof; Natriumhydrogencarbonat.
- Øvrige indholdsstoffer; Dinatriumedetat, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Natriumbikarbonat SAD er en klar, farveløs væske.

Natriumbikarbonat SAD findes i pakningsstørrelser på:

10 ml ampuller x 10.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk

Vnr. 701474-02