

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Natriumjodid SAD injektionsvæske, opløsning

50 mg/ml

Natriumjodid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Natriumjodid SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Natriumjodid SAD
3. Sådan skal du tage Natriumjodid SAD
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Natriumjodid SAD er lægemiddel mod akut forhøjet stofskifte.

Natriumjodid SAD anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af akut forhøjet stofskifte (tyrotoksisk krise).

En læge eller sygeplejerske vil give dig Natriumjodid SAD som en indsprøjtning i en blodåre.

Lægen kan give dig Natriumjodid SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE NATRIUMJODID SAD

Tag ikke Natriumjodid SAD

- hvis du er overfølsom overfor natriumjodid eller overfor jod

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Natriumjodid SAD:

- Hvis du bliver behandlet med jod
- Hvis du er gravid eller ammer
- Hvis du er et barn
- Hvis du er over 45 år
- Hvis du har gigtknuder

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Natriumjodid SAD. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Natriumjodid SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

- Medicin for stofskiftet (thiouracil- og imidazolpræparater)
- Medicin mod sindsslidelser (lithium)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Natriumjodid SAD efter aftale med lægen.

Amning

Du må ikke få Natriumjodid SAD, hvis du ammer, da Natriumjodid SAD udskilles i modermælken. Følg lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Natriumjodid SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Natriumjodid SAD indeholder natrium

Denne medicin indeholder 1000 mg (1 g) natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE NATRIUMJODID SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Natriumjodid SAD findes som injektionsvæske, der indgives i en blodåre. Du vil normalt få Natriumjodid SAD af en læge eller sygeplejerske.

Du må få Natriumjodid SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Dosering

Sædvanlig dosis er 1 g, hvilket kan gentages efter 6-12 timer.

Hvis du har brugt for meget Natriumjodid SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Natriumjodid SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Symptomer på overdosering er hududslæt og hedeslag, næseflåd, bihulebetændelse, betændelse i øjet, betændelse i strubehovedet, bronchitis (irritationstilstand i luftvejene), mundbetændelse, betændelse i ørespytkirtlen med hævelse, spændinger og ømhed foran øret samt betændelsestilstand i blodkarrene. Endvidere kan forekomme shock, hurtig puls, for lavt blodtryk, feber, for meget syre i blodet og nyresvækkelse.

Symptomer på akut forgiftning er en metallisk smag i munden, opkastning, mave smerter og blodig diaré (disse symptomer kan skyldes jods tærende virkning på mave og tarm) samt tørst og hovedpine.

Hvis du har glemt at bruge Natriumjodid SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Natriumjodid SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlige: Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Jod forgiftning (ved langvarig indtagelse eller ved overfølsomhed over for jodid).

Ikke alvorlige: Hævelse af lymfeknuder. Smerter i leddene. Nervøsitet. Søvnløshed. Metalsmag. Hovedpine. Snue. Øget spytafsondring, brændende og smertende fornemmelse i mund og hals, kvalme, opkastning, diaré, ømhed i tænder og gummer, ømhed og hævelse af spytkirtlen. Irriterede og hævede øjne, øget tåreflåd. Rejsningsbesvær (impotens).

For lavt stofskifte (myksødem). Uren hud. Hudsygdom pga. jod (jododerma).

Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Allergiske reaktioner (hævelse af tunge, læber, ansigt, hals, arme og ben) især udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Bronchitis, hævelse og betændelse i halsen.

Natriumjodid SAD kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Opbevar Natriumjodid SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Natriumjodid SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Natriumjodid SAD injektionsvæske, 50 mg/ml indeholder:

Aktivt stof: Natriumjodid

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Natriumjodid SAD er en klar, farveløs til svagt gullig væske.

Natriumjodid SAD findes i pakningsstørrelser på:

20 ml hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AmgroS I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgroS@amgroS.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk

Vnr. 701458-01