

Methylphenidat A-Pharma, 10 mg tabletter

Methylphenidat

DN0072-1-a

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Methylphenidat A-Pharma til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methylphenidat A-Pharma
3. Sådan skal du tage Methylphenidat A-Pharma
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvis lægen har ordineret Methylphenidat A-Pharma til dit barn, så vær opmærksom på, at al information i denne indlægsseddel er henvendt til dit barn (læs ”dit barn” i stedet for ”du” eller ”dig”).

1. Virkning og anvendelse

Anvendelse

Methylphenidat A-Pharma bruges til behandling af ADHD (’Attention Deficit Hyperactivity Disorder’).

- Det bruges kun til børn og unge mellem 6 og 18 år.
- Det bruges først, når der er forsøgt med behandlinger, der ikke omfatter medicin, f.eks. rådgivning og adfærdsterapi.

Om ADHD

Børn og unge med ADHD har svært ved at:

- sidde stille og
- koncentrere sig.

Det er ikke noget, de kan gøre for. ADHD kan ikke helbredes, men sygdommen kan styres ved hjælp af behandlingsprogrammer. Mange børn og unge kæmper for at gøre disse ting. På grund af ADHD kan de have problemer i hverdagen. Det kan være svært for børn og unge med ADHD at lære og at læse lektier. Det er svært for dem at opføre sig pænt hjemme, i skolen og andre steder. ADHD påvirker ikke intelligensen hos barnet eller den unge.

Dette lægemiddel skal ordineres af læger, som har erfaring inden for adfærdsproblemer hos børn og unge.

Virkning

Methylphenidat A-Pharma har en gavnlig virkning på aktiviteten i visse dele af hjernen, som er underaktive. Medicinen kan være med til at forbedre opmærksomhed (varighed) og koncentration og dæmpe impulsiv adfærd.

Medicinen gives som en del af et behandlingsprogram i behandlingen af ADHD, der normalt omfatter:

- psykologisk
- undervisnings- og
- socialterapi.

Andre anvendelser af methylphenidat: Narkolepsi

- lægerne ordinerer undertiden Methylphenidat A-Pharma til behandling af narkolepsi
- narkolepsi er en søvnforstyrrelse. Patienter med narkolepsi har tilbagevendende anfald af overdreven søvnighed om dagen, selvom de sover godt om natten
- Methylphenidat A-Pharma 10 mg bruges til at styre overdreven søvnighed om dagen
- diagnosen narkolepsi skal stilles af en læge på grundlag af registrering af søvn/vågenhedsmønstre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methylphenidat A-Pharma

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Methylphenidat A-Pharma:

- hvis du er allergisk over for methylphenidat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Methylphenidat A-Pharma (angivet i pkt. 6).
- hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen
- hvis du har forhøjet tryk i øjet (glaukom)
- hvis du har en svulst i binyren (et fæokromocytom)
- hvis du har en spiseforstyrrelse, dvs. ikke føler sult eller lyst til at spise – f.eks. ’anorexia nervosa’ (anoreksi)
- hvis du har meget højt blodtryk eller forsnævring af blodkarrene, hvilket kan give smerter i arme og ben
- hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer – f.eks. et hjerteanfald, forhøjet blodtryk i alvorlig grad, blodprop i hjertet, ujævn hjerterytme, smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom, eller hvis du har et medfødt hjerteproblem

- hvis du har haft problemer med blodkarrene i hjernen – f.eks. et slagtilfælde, hævelse og svækkelse af et blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blodkar eller betændelse i blodkarrene (vaskulitis)
- hvis du inden for de sidste 14 dage har taget en MAO-hæmmer, som er en type medicin mod depression – Se ”Brug af anden medicin sammen med Methylphenidat A-Pharma”
- hvis du har psykiske helbredsproblemer, som f. eks.:
 - en ’psykopatisk’ eller ’borderline-’ personlighed
 - unormale tanker eller syner, eller en sygdom, der hedder ’skizofreni’
 - tegn på en alvorlig sindstilstand som f.eks.:
 - alvorlige spiseforstyrrelser (kronisk appetitløshed)
 - lyst til at begå selvmord
 - alvorlig depression, hvor du er meget ked af det og føler, at du er uduelig og håbløs
 - mani, hvor du føler dig ualmindeligt opstemt, hyperaktiv og uden hæmninger.

Du må ikke tage methylphenidat, hvis noget af ovenstående er gældende for dig. Hvis du ikke er sikker, skal du tale med din læge eller apoteket, før du tager methylphenidat. Methylphenidat kan gøre disse problemer værre.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Methylphenidat A-Pharma.

Tal med din læge eller apoteket før behandlingen, hvis:

- du har problemer med lever eller nyrer
- du har haft anfald (krampeanfald, krampetrækninger eller epileptiske anfald) eller unormale hjerneskanninger (EEG’er)
- du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptmedicin eller narkotika
- du er en pige og er begyndt at menstruere (se afsnittet ’Graviditet, amning og fertilitet’ nedenfor)
- du har trækninger i kroppen, som er svære at kontrollere, eller du gentager lyde og ord
- du har højt blodtryk
- du har et hjerteproblem, som ikke står i afsnittet ”Tag ikke Methylphenidat A-Pharma” ovenfor
- du har et psykisk problem, som ikke står i afsnittet ”Tag ikke Methylphenidat A-Pharma” ovenfor. Andre psykiske problemer kan være:
 - du lider af humørsvingninger (fordi du er manisk eller deprimeret – kaldes ’bipolar sygdom’) du begynder at blive aggressiv eller vred, eller du bliver mere aggressiv
 - du ser, hører eller føler noget, der ikke er der (hallucinationer)
 - du tror noget, der ikke er sandt (vrangforestillinger)
 - du føler dig unormalt mistroisk (paranoia)
 - du føler dig urolig, nervøs eller anspændt
 - du føler dig deprimeret, har selvmordstanker eller føler skyld.

Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis noget af ovenstående passer på dig, før behandlingen påbegyndes. Methylphenidat kan gøre disse problemer værre. Din læge vil følge med i, hvordan medicinen påvirker dig.

Forespørgsler, som din læge vil stille, før du begynder at tage methylphenidat

Disse forespørgsler skal bruges til at afgøre, om methylphenidat er den rigtige medicin for dig. Lægen vil spørge om:

- eventuel anden medicin, som du tager
- om der har været pludselige, uforklarlige dødsfald i familien
- eventuelle andre medicinske problemer (f.eks. hjerteproblemer, dårlig blodcirkulation i hjernen), som du selv eller din familie har
- hvordan du har det, f.eks. om du er glad eller ked af det, har mærkelige tanker, eller om du har haft det sådan tidligere
- om der er nogen i familien, der har ’tics’ (ufrivillige, gentagne krampetrækninger i dele af kroppen, eller ufrivillig gentagelse af lyde eller ord)
- alle psykiske problemer eller adfærdsproblemer, som du eller nogen i din familie nogensinde har haft. Lægen vil tale med dig for at finde ud af, om der er risiko for, at du får humørsvingninger (fra at være manisk til at blive deprimeret – det kaldes ’bipolar sygdom’). Lægen vil undersøge, hvordan du har haft det psykisk indtil nu, og om der er nogen i familien, der har begået selvmord, eller som har bipolar sygdom eller en depression.

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger, som du kan. Det gør det lettere for lægen at afgøre, om methylphenidat er den rigtige medicin for dig. Lægen vil måske beslutte, at der er brug for andre medicinske undersøgelser, før du begynder at tage denne medicin.

Brug af anden medicin sammen med Methylphenidat A-Pharma

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tag ikke methylphenidat, hvis du:

- tager medicin af typen MAO-hæmmer, som bruges mod depression, eller har taget MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage. Hvis du tager MAO-hæmmere sammen med methylphenidat, kan det medføre en pludselig stigning i blodtrykket.

Hvis du tager andre former for medicin, kan methylphenidat have indflydelse på, hvor godt medicinen virker, eller det kan give bivirkninger. Hvis du tager nogen af følgende former for medicin, skal du tale med din læge eller apoteket, før du tager methylphenidat:

- anden medicin mod depression
- medicin mod alvorlige psykiske problemer
- medicin mod epilepsi
- medicin, der bruges til at sænke eller øge blodtrykket (f.eks. clonidin)
- medicin, som fortynder blodet for at forhindre blodpropper.

Hvis du er det mindste i tvivl, om noget af den medicin, du tager, er med på listen ovenfor, skal du spørge din læge eller på apoteket, før du tager methylphenidat.

Hvis du skal opereres

Fortæl det til din læge, hvis du skal opereres. Methylphenidat må ikke tages på operationsdagen, hvis der bruges en bestemt type bedøvelsesmiddel. Det skyldes, at der er en risiko for, at blodtrykket stiger pludseligt under operationen.

Narkotikatest

Denne medicin kan give et positivt resultat ved test for brug af narkotika. Det gælder også de dopingtests, der bruges i forbindelse med sport.

Brug af Methylphenidat A-Pharma sammen med mad, drikke og alkohol

Hvis du tager methylphenidat sammen med mad, kan det være med til at forhindre mavesmerter, kvalme, eller at du kaster op.

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne medicin. Det kan gøre bivirkningerne værre. Husk, at nogle former for mad og medicin indeholder alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Du må normalt ikke tage Methylphenidat A-Pharma, hvis du er gravid.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Methylphenidat A-Pharma.

Man ved ikke, om methylphenidat vil påvirke et ufødt barn. Fortæl det til din læge eller på apoteket, før du tager methylphenidat, hvis du:

- er seksuelt aktiv. Lægen vil tale med dig om prævention.
- er gravid eller tror, at du måske er gravid. Du må ikke tage Methylphenidat A-Pharma, hvis du er gravid.
- ammer eller har planer om at amme. Det er muligt, at methylphenidat går over i modermælken. Lægen vil derfor afgøre, om du må amme, mens du tager methylphenidat.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekanter. Det betyder, at Methylphenidat A-Pharma kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du kan føle dig svimmel og døsig, have svært ved at fokusere eller se skarpt, når du tager methylphenidat. Hvis noget af dette sker, kan det være farligt at foretage sig visse ting som f.eks. at køre bil, betjene maskiner, køre på cykel, ride eller klatre i træer.

Methylphenidat A-Pharma indeholder lactose og hvedestivelse

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Denne medicin indeholder hvedestivelse. Hvis du har hvedeallergi (bortset fra cøliaki), bør du ikke tage Methylphenidat A-Pharma.

3. Sådan skal du tage Methylphenidat A-Pharma

Tag altid Methylphenidat A-Pharma nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Narkolepsi (voksne)

Den sædvanlige daglige dosis er 20-30 mg dagligt fordelt på 2-3 doser. Nogle patienter kan have behov for den maksimale dosis på 60 mg dagligt, mens 10 mg vil være tilstrækkeligt for andre.

Tabletterne skal tages sammen med vand og sidste daglige dosis kan med fordel tages før kl. 18, hvis du har problemer med at falde i søvn.

ADHD (børn 6 år eller ældre)

- din læge vil normalt starte behandlingen med en lav dosis (5 mg) og øge den gradvist efter behov
- den maksimale dosis pr. dag er 60 mg
- tag Methylphenidat A-Pharma en eller to gange dagligt (f.eks. til morgenmaden og/eller frokosten)
- for at undgå problemer med at falde i søvn, skal du tage den sidste dosis senest 4 timer før sengetid
- tabletterne skal tages sammen med vand
- du kan knække tabletterne, så de bliver lettere at synke.

Hvis du ikke har fået det bedre efter 1 måneds behandling

Hvis du ikke får det bedre, skal du sige det til din læge. Lægen vil måske afgøre, at en anden form for behandling er nødvendig.

Hvis Methylphenidat A-Pharma ikke bruges korrekt

Hvis Methylphenidat A-Pharma ikke bruges korrekt, kan det resultere i abnorm adfærd. Det kan også betyde, at du begynder at blive afhængig af medicinen. Fortæl det til din læge, hvis du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika.

Hvis du har taget for mange Methylphenidat A-Pharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Methylphenidat A-Pharma end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan f.eks. være: opkastning, føle sig urolig, rysten, ufrivillige bevægelser bliver værre, muskeltrækninger, anfald (kan efterfølges af koma), føle sig meget lykkelig, forvirring, se, føle eller høre ting, der ikke er virkelige (hallucinationer), sveden, rødmen, hovedpine eller høj feber, anderledes hjerterytme (langsom, hurtigt eller ujævn), højt blodtryk, udvidede pupiller og tørhed i næse og mund.

Hvis du har glemt at tage Methylphenidat A-Pharma

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer en dosis, skal du vente til tidspunktet for den næste dosis.

Hvis du holder op med at tage Methylphenidat A-Pharma

Hvis du pludselig holder op med at tage denne medicin, kan ADHD-symptomerne vende tilbage, eller bivirkninger som f.eks. depression kan opstå.

Lægen kan gradvist nedsætte mængden af den daglige medicin, før du holder op med at tage Methylphenidat A-Pharma. Under nedtrapning er en omhyggelig overvågning ofte nødvendig. Tal med din læge, før du holder op med at tage Methylphenidat A-Pharma.

Din læge vil foretage nogle undersøgelser under behandlingen

- før du starter – for at sikre sig, at Methylphenidat A-Pharma er sikkert og vil hjælpe
- når du er startet vil lægen foretage nogle undersøgelser mindst hver 6. måned, men muligvis oftere. De vil også blive foretaget, når dosis ændres. Disse undersøgelser vil omfatte:
 - om der er ændringer i din appetit
 - måling af højde og vægt
 - måling af blodtryk og hjerterytme
 - om du har ændringer eller problemer med humøret, din psykiske tilstand, eller andre usædvanlige følelser. Eller om disse er blevet værre, mens du har taget Methylphenidat A-Pharma.

Langtidsbehandling

Du behøver ikke at fortsætte med at tage Methylphenidat A-Pharma altid. Hvis du tager Methylphenidat A-Pharma i mere end et år, vil din læge revurdere dit udbytte af behandlingen og måske stoppe den kort tid, det kan f.eks. ske i en skoleferie. Det vil vise sig, om der stadig er brug for medicinen.

Hvis du har flere spørgsmål om brugen af dette produkt, kan du spørge din læge eller på apoteket.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Selvom nogle mennesker får bivirkninger, synes de fleste, at methylphenidat hjælper dem. Din læge vil tale med dig om disse bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført nedenfor, skal du straks søge læge:

Almindelige

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- uregelmæssig hjerterytme (palpitationer)
- humørforandringer eller humørsvingninger eller personlighedsændringer

Ikke almindelige

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- tanker om eller lyst til at begå selvmord
- ser, føler eller hører ting, der ikke er virkelige, (psykose, hallucination)
- ukontrolleret tale eller bevægelser (Tourettes syndrom)
- tegn på allergi, som f. eks. udslæt, kløe eller nældefeber, hævelser i ansigtet, hævede læber, hævet tunge eller hævelser i andre kropsdele, stakåndethed, hvæsende åndedræt eller åndedrætsbesvær.

Sjældne

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- følelse af usædvanlig opstemthed, hyperaktivitet og uden hæmninger (mani)

Meget sjældne

(Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- selvmordsforsøg, herunder fuldbyrdet, unormale tanker, manglende følelser eller sindsbevægelser, gøre tingene om og om igen, være besat af én ting
- hjerteanfald, hertestop
- anfald (krampeanfald, krampetrækninger, epileptiske anfald)
- afskalning af huden eller purpurrøde pletter
- muskelkramper, som du ikke kan kontrollere, som påvirker dine øjne, hoved, hals, krop og nervesystem pga. midlertidig mangel på blodtilførsel til hjernen
- lammelse eller bevægelses- og synsproblemer, talebesvær (kan være tegn på hjerneinfarkt eller betændelse af blodkar i hjernen)
- nedsat antal blodlegemer (røde, hvide og blodplader), hvilket kan gøre dig mere modtagelig for infektioner og gøre, at du lettere bløder og får blå mærker
- pludselig stigning af kropstemperaturen, meget højt blodtryk og alvorlige krampeanfald ("Malignt neuroleptikasyndrom"). Det er ikke sikkert, om denne bivirkning skyldes methylphenidat.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- uønskede tanker, som bliver ved med at vende tilbage
- uforklarlig besvimelse, brystmerter, kortåndethed (kan være tegn på hjerteproblemer)
- et større krampeanfald ('grand mal-krampeanfald')
- almen sløvhed, bleghed, blødning fra hud og slimhinder samt tendens til især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (få røde og hvide blodlegemer og blodplader)

Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført ovenfor, skal du straks søge læge.

Andre bivirkninger kan også forekomme; hvis de bliver alvorlige, skal du fortælle det til din læge eller på apoteket:

Meget almindelige

(Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- hovedpine
- nervøsitet
- søvnløshed.

Almindelige

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- ledsmerter
- tør mund
- høj temperatur (feber)
- usædvanligt hårtab, eller at håret bliver tyndere
- usædvanlig søvnig eller døsig
- appetitløshed eller nedsat appetit
- kløe, udslæt eller hævet, rødt kløende udslæt (nældefeber)
- hoste, ondt i halsen eller irritation i næse og svælg
- højt blodtryk, hurtig hjerterytme (takykardi), uregelmæssig hjerterytme
- svimmelhed, bevægelser, du ikke kan kontrollere, usædvanlig aktiv
- aggressivitet, uro, nervøsitet, deprimeret, irritabel, unormal adfærd.
- mavesmerter, diaré, kvalme, ubehag i maven og opkastninger. Disse bivirkninger forekommer normalt i begyndelsen af behandlingen og kan mindskes ved at tage medicinen sammen med mad.

Ikke almindelige

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- forstoppelse
- ubehag i brystet
- blod i urinen
- rysten eller skælven
- dobbeltsyn eller sløret syn
- muskel smerter, muskeltrækninger
- stakåndethed eller brystmerter, træthed
- forhøjede levertal (ses i blodprøver)
- hjertemislyde
- vrede, rastløshed eller lyst til at græde, overdreven bevidsthed om omgivelserne, søvnproblemer.

Sjældne

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- ændringer i sexlyst
- at føle sig desorienteret
- udvidede pupiller, synsbesvær
- forstørrede bryster hos mænd
- hjertekramper
- ekstrem megen sveden, rødme af huden, rødt, hævet hududslæt

Meget sjældne

(Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- pludselig død
- muskelkramper
- små, røde pletter på huden
- betændelse i eller blokerede arterier i hjernen
- unormal leverfunktion – herunder leversvigt og koma
- ændringer i prøveresultater – herunder lever- og blodprøver
- fingre og tæer er følelseløse, snurrer og skifter farve (fra hvide til blå og derefter røde), når det er koldt ('Raynauds syndrom')
- bleghed og træthed pga. blodmangel

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- meget høj feber
- langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag
- migræne
- brystgener
- at tro ting, der ikke er sande, forvirring
- misbrug og afhængighed

Virkninger på vækst og vægt

Når methylphenidat tages i mere end et år, kan det medføre

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 børn):

- nedsat vækst.
- manglende vægtøgning

Din læge vil omhyggeligt holde øje med din højde og vægt, og hvor godt du spiser. Hvis du ikke vokser som forventet, kan behandlingen med methylphenidat blive stoppet i en kort periode.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Sørg for at opbevare din medicin et sikkert sted, så der ikke er andre, der kan tage den, især yngre søskende.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Methylphenidat A-Pharma indeholder:

- Aktivt stof: methylphenidathydrochlorid. En tablet indeholder 10 mg methylphenidathydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: tricalciumdiphosphat, hvedestivelse, lactosemonohydrat, gelatine, magnesiumstearat og talcum.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Runde, hvide tabletter med delekærv og præget med ”AB ” på den ene side og ”CG” på den anden side.

Pakningsstørrelser

15, 30 og 105 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

A-Pharma ApS
Usserød Kongevej 32
2970 Hørsholm

Repræsentant, ompakket og frigivet af:

Copharma ApS
Kanalholmen 8-12
2650 Hvidovre

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2013