

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Medobiotin® tabletter 2,5 mg biotin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Medobiotin er et stærkt vitamin, som kan købes uden recept. For at få den bedste virkning skal du være omhyggelig med at følge vejledningerne for Medobiotin.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Hvis du får det værre skal du kontakte din læge.

Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Medobiotins virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medobiotin
3. Sådan skal du bruge Medobiotin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Medobiotins virkning og hvad du skal bruge det til

Medobiotin er et stærkt vitamin, der forebygger og behandler biotinmangel. Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Medobiotin til noget andet, skal du følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medobiotin

Brug ikke Medobiotin

Hvis du er overfølsom over for biotin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Kontakt lægen, før du tager Medobiotin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Medobiotin indeholder laktose.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid på apoteket eller til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, andre stærke vitaminer og mineraler, samt kosttilskud.

Samtidig indtagelse af krampestillende midler (carbamazepin) kan mindske effekten af Medobiotin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Hvis du er gravid, må du kun bruge Medobiotin efter aftale med din læge.

Hvis du ammer, må du kun bruge Medobiotin efter aftale med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Medobiotin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Medobiotin

Medobiotin indeholder lactosemonohydrat.

Kontakt lægen, før du tager dette produkt, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du bruge Medobiotin

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 tablet dagligt.

Børn

Børn under 12 år må kun få Medobiotin efter lægens anvisning.

Hvis du har brugt for mange Medobiotin tabletter

Kontakt læge, skadestue eller apotek, hvis du har taget flere tabletter, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Medobiotin

Hvis du har glemt en tablet, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste tablet, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at bruge Medobiotin

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Medobiotin kan i sjældne tilfælde give allergiske hudreaktioner. Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter).

Medobiotin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk) eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Du kan opbevare Medobiotin ved almindelig temperatur.

Brug ikke Medobiotin efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Medobiotin tabletter indeholder

- Aktiv bestanddel:

Biotin 2,5 mg.

- Øvrige indholdsstoffer:

Langkædede glycerider, mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrate, povidon, crospovidon, natriumstivelsesglycollat (type A), magnesiumstearate.

Medobiotin udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvide runde konveks tabletter.

Pakningsstørrelser

30 stk. og 90 stk. tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Hübner Naturarzneimittel GmbH

Lil-Dagover-Ring 7

D-82031 Grünwald

Tyskland

Tlf: + 49 89 64 18 60

Fax: + 49 89 64 18 61 30

info@huebner-naturarzneimittel.de

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015.