

# Ventolin® 0,2 mg/dosis inhalationspulver, afdelt (Diskos)

Salbutamol

T152065901

Ventolin® er et registreret varemærke, som tilhører Glaxo Group Limited.

## Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Ventolin til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan ses på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

## Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Ventolin
3. Sådan skal De bruge Ventolin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

## 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Ventolin indeholder salbutamol, som tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes betaagonister. Det virker ved at afslappe musklerne i luftvejene og fjerner den forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med astmaanfald. Luften kan dermed lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Virkningen af Ventolin er kortvarig og De vil derfor normalt skulle kombinere Ventolin med anden forebyggende medicin.

Ventolin bruges til behandling af astmaanfald og andre former for astmarelateret vejrtrækningsbesvær. Ventolin inhalationspulver i Diskos kan anvendes til voksne, unge og børn mellem 4 og 11 år.

Lægen kan have givet Dem Ventolin for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

## 2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE VENTOLIN

### Brug ikke Ventolin

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for salbutamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ventolin.
- til behandling af for tidlige veer eller ved truende abort.

## Vær ekstra forsigtig med at bruge Ventolin

Tal med lægen, inden De bruger Ventolin, hvis De

- har sukkersyge (diabetes).
- har for højt stofskifte.
- har svær astma.
- har eller har haft en alvorlig hjertesygdom, såsom uregelmæssig puls (arytmi), nedsat ilttilførsel til hjertemusklen (iskæmisk hjertesygdom), alvorligt hjertesvigt. Hvis De oplever brystmerter, vejrtrækningsbesvær eller andre symptomer på forværring af Deres hjertesygdom, skal De straks kontakte lægen.
- har veer, da Ventolin kan hæmme veer.

Ved langvarig behandling med Ventolin, vil lægen regelmæssigt vurdere Deres symptomer og behandling.

Hvis De ikke føler, at behandlingen giver den ønskede effekt, eller hvis en dosis, der tidligere har givet den ønskede effekt, ikke virker indenfor 3 timer, skal De kontakte lægen. De må ikke selv øge dosis eller hyppigheden af inhalationer uden at have talt med lægen først.

Hvis Deres astmasymptomer øges, f.eks. hoste eller åndenød, umiddelbart efter du har taget Ventolin, skal du omgående stoppe med at bruge Ventolin og straks søge lægehjælp.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Ventolin. Det kan påvirke prøveresultaterne.

## Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med Deres læge, hvis De tager

- medicin mod for højt blodtryk, hjertesvigt eller uregelmæssig puls (ikke-selektive betablokkere, f.eks. propranolol), da det kan nedsætte virkningen af Ventolin.
- binyrebarkhormoner (f.eks. mod leddegigt og bindevævssygdomme), da det kan nedsætte indholdet af kalium i blodet.

## Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

## Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun bruge Ventolin efter aftale med lægen. Ventolin kan hæmme veerne under fødslen. Ventolin må ikke anvendes til behandling af for tidlige veer eller ved truende abort.

## Amning

Ventolin går over i modermælken. Hvis De ammer, må De kun bruge Ventolin efter aftale med lægen.

## Trafik- og arbejdssikkerhed

Ventolin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

## Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ventolin

Ventolin indeholder lactose. Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

## 3. SÅDAN SKAL DE BRUGE VENTOLIN

Brug altid Ventolin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

## Den sædvanlige dosis er

### Voksne

*Pludselig åndenød eller astmaanfald:* 1 sug ved behov. Ventolin bør normalt ikke bruges mere end 4 gange daglig. Hvis De får behov for en øget dosis, kan astmaen være blevet forværret. Kontakt lægen.

*Forebyggelse af allergisk- eller anstrengelses-udløst astma:* 1 sug 15 til 30 minutter før udsættelse for anstrengelse eller allergi-udløsende faktor.

*Kronisk behandling:* 1 sug 4 gange daglig.

## Børn fra 4 til 11 år:

*Pludselig åndenød eller astmaanfald:* 1 sug ved behov. Ventolin bør normalt ikke bruges mere end 4 gange daglig. Hvis De får behov for en øget dosis, kan astmaen være blevet forværret. Kontakt lægen.

*Forebyggelse af allergisk- eller anstrengelses-udløst astma:* 1 sug 15 til 30 minutter før udsættelsen for anstrengelse eller allergi-udløsende faktor.

*Kronisk behandling:* 1 sug 4 gange daglig.

## Børn over 12 år:

Samme dosering som for voksne.


Ventolin må ikke bruges til børn under 4 år. De må ikke selv øge dosis eller hyppigheden af inhalationer uden at have talt med lægen først.

## Ældre og patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion:


Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

## Brugsanvisning

- Åbn Diskos ved hjælp af fingergrebet, som De trykker helt i bund til det siger klik.




- Tryk dosisknappen helt i bund før klargøring til det siger klik.



- Pust helt ud. Pust ikke ind i Diskos. Sæt derefter mundstykket mellem tænderne, og luk læberne tæt om det. De kan nu inhalere dosis.



- Sug ind så hurtigt og dybt som muligt og hold vejret nogle få sekunder. Ved korrekt brug kan De smage pulveret (lactosen).
- Luk Diskos efter brug ved at skubbe fingergrebet tilbage til det siger klik.



- En dosistæller angiver det resterende antal doser. Når der er 5 doser tilbage bliver tallene røde.

Få lægen eller apoteket til at vise Dem, hvordan De skal bruge Diskos. De bør jævnligt få tjekket Deres inhalationsteknik for at sikre, at De bruger Diskos korrekt og dermed får den dosis, som lægen har anvist.

#### Hvis De har brugt for meget Ventolin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Ventolin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tak pakningen med. Symptomer på overdosering er: Rysten, hovedpine, hurtig puls, nedsat indhold af kalium i blodet.

#### Hvis De har glemt at bruge Ventolin

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis De har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

#### Hvis De holder op med at bruge Ventolin

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

### 4. BIVIRKNINGER

Ventolin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

#### Alvorlige bivirkninger

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner som udslæt (nældefeber), vejrtrækningsbesvær, svimmelhed og besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Astmalignende anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

#### Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

#### Ikke alvorlige bivirkninger

**Almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Rysten.
- Hovedpine.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

**Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Rastløs uro.
- Svimmelhed.
- Hjertebanken.
- Irritation i mund og svælg.
- Muskelkramper.

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Svimmelhed pga. lavt blodtryk.

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
- Uro og rastløshed (hyperaktivitet).

- Hurtig puls eller ekstra hjerteslag. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

#### Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk), eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

### 5. OPBEVARING

Opbevar Ventolin utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Ventolin ved temperaturer over 30°C.

Brug ikke Ventolin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

### 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ventolin 0,2 mg/dosis, inhalationspulver

(Diskos) indeholder:

Aktivt stof: Salbutamol som salbutamolsulfat.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat (indeholder mælkeproteiner).

#### Udseende og pakningsstørrelse

Ventolin inhalationspulver er afdelt i Diskos, som er en pulverinhalator.

Ventolin findes i en pakningsstørrelse med 60 doser.

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark:

Paranova Danmark A/S  
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

#### Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S  
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

**Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2013.**