

Escitalopram Copharma 10 mg
filmovertrukne tabletter

Escitalopram

DKP088-1-A

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Escitalopram Copharma til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

- Virkning og anvendelse
- Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Copharma
- Sådan skal du tage Escitalopram Copharma
- Bivirkninger
- Opbevaring
- Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Escitalopram Copharma anvendes til behandling af depression (moderate til svære depressive episoder) og angst (såsom panikangst med eller uden agorafobi (angst for at befinde sig på steder eller i situationer, hvor det er vanskeligt at komme bort eller skaffe hurtig hjælp), socialfobi, generaliseret angst og obsessiv-kompulsiv tilstand (tilbagevendende tvangstanker eller tvangshandlinger).

Escitalopram tilhører en gruppe lægemidler mod depression, der kaldes SSRI-præparater (SSRI = selektive serotoninoptagshæmmere). Disse lægemidler påvirker serotoninssystemet i hjernen ved at øge mængden af serotonin. Forstyrrelser af serotoninssystemet anses for at være et vigtigt element i udviklingen af depression og lignende sygdomme.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ESCITALOPRAM A-PHARMA

Tag ikke Escitalopram Copharma, hvis du:

- er overfølsom (allergisk) over for escitalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Escitalopram Copharma (se afsnit 6 "Yderligere oplysninger").
- tager anden medicin, der tilhører en gruppe lægemidler som kaldes MAO-hæmmere. Disse omfatter selegilin (mod Parkinsons sygdom), moclobemid (mod depression) og linezolid (antibiotikum).

Vær ekstra forsigtig med at tage Escitalopram Copharma

- Fortæl det til lægen, inden du tager Escitalopram Copharma, hvis du:
- har epilepsi. Behandling med Escitalopram Copharma bør stoppes, hvis du får anfald, eller hvis anfaldshyppigheden stiger (se også afsnit 4 "Bivirkninger").
 - lider af nedsat lever- eller nyrefunktion. Lægen vil muligvis ændre dosis.
 - har diabetes. Behandling med Escitalopram Copharma kan påvirke blodsukkeret. Derfor kan det blive nødvendigt at ændre doseringen af insulin og/eller tabletter til behandling af diabetes.
 - har nedsat indhold af natrium i blodet.
 - let kommer til at bløde eller let får blå mærker.
 - får elektrochok (elektrokonvulsiv behandling).
 - har en hjertesygdom, der berører en af kranspulsårerne.

Ligesom med anden medicin til behandling af depression eller lignende sygdomme opnås der ikke bedring med det samme. Efter start på behandlingen med Escitalopram Copharma kan der gå flere uger, før du mærker bedring. Ved behandling af panikangst går der sædvanligvis 2-4 uger, før der opnås bedring. I begyndelsen af behandlingen kan nogle patienter opleve tiltagende angst, som dog forsvinder under den fortsatte behandling. Det er derfor vigtigt, at du nøje følger lægens anvisninger og ikke holder op med behandlingen eller ændrer dosis uden at rådføre dig med lægen.

Selv mordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.

- Du kan have øget risiko for sådanne tanker, hvis du:
- tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 - er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem fortælle dig, hvis de synes at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. Nogle patienter med mani-depressive lidelser kan gå ind i en manisk fase. Denne fase kendetegnes ved usædvanlige og hurtigt skiftende ideer, en uforholdsmæssig lykketilstand og overdrevet fysisk aktivitet. Kontakt lægen, hvis du oplever dette. Symptomer i form af rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille kan også forekomme under de første ugers behandling. Fortæl det straks til lægen, hvis du får disse symptomer. Somme tider vil du måske ikke være opmærksom på disse symptomer, og det kan derfor være en hjælp at bede en ven eller pårørende om også at være opmærksom på tegn på forandringer i din adfærd. Du bør omgående fortælle det til din læge eller kontakte det nærmeste hospital, hvis du har foruroligende tanker eller oplevelser, eller hvis du får nogle af de nævnte symptomer under behandlingen.

Børn og unge under 18 år:

Escitalopram Copharma bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør være opmærksom på, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger så som selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (især aggressivitet, trodsighed og vrede), når de tager denne type medicin. Din læge kan alligevel vælge at ordinere Escitalopram Copharma til patienter under 18 år ud fra en vurdering af, at det vil det bedste for dig. Kontakt lægen, hvis en patient under 18 år har fået ordineret Escitalopram Copharma, og du ønsker at tale om dette. Du bør informere lægen, hvis de nævnte problemer opstår eller tager til hos en patient under 18 år, der får Escitalopram Copharma. Der foreligger endnu ikke langtidsdata om sikkerhed, hvad angår vækst, modning og udvikling af åndsevner og adfærd, når Escitalopram Copharma gives til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl det til lægen, hvis du:

- tager MAO-hæmmere (non-selektive monoaminooxidasehæmmere), der indeholder phenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid eller tranlylcypromin som det aktive stof. Hvis du har taget et af disse lægemidler, skal der gå 14 dage, før du begynder at tage Escitalopram Copharma. Efter behandlingen med Escitalopram Copharma skal der gå 7 dage, før du begynder at tage et af disse lægemidler.
- tager RIMA-præparater (reversible selektive MAO-A-hæmmere), der indeholder moclobemid (til behandling af depression).
- tager irreversible MAO-B-hæmmere, der indeholder selegilin (til behandling af Parkinsons sygdom). Medicin af denne type øger risikoen for bivirkninger.
- tager linezolid, som er et antibiotikum.
- tager lithium (til behandling af mani-depressive lidelser) og tryptophan.
- tager imipramin og desipramin (til behandling af depression).
- tager sumatriptan og lignende medicin (til behandling af migræne) og tramadol (mod kraftige smerter). Medicin af denne type øger risikoen for bivirkninger.
- tager cimetidin, omeprazol, esomeprazol og lanzoprazol (til behandling af mavesår), fluvoxamin (mod depression) og ticlopidin (nedsætter risikoen for slagtilfælde). Disse midler kan øge mængden af Escitalopram Copharma i blodet.
- tager prikbladet perikon (Hypericum perforatum) – et naturlægemiddel mod modløshed.
- tager acetylsalicylsyre og NSAID (nonsteroidale antiinflammatoriske midler) (medicin til at lindre smerter eller fortynde blodet, såkaldte antikoagulanter).
- tager warfarin, dipyridamol og phenprocoumon (medicin til at fortynde blodet, såkaldte anti-koagulanter). Lægen vil sikkert undersøge, hvor længe blodet er om at størkne (koagulationstiden), ved indledning og afslutning af behandling med Escitalopram Copharma for at sikre, at du stadig får den rette dosis af det blodfortyndende middel.

- tager mefloquin (til behandling af malaria), bupropion (til behandling af depression) og tramadol (til behandling af svære smerter) på grund af en øget risiko for, at du får kramper.
- tager medicin til behandling af skizofreni og andre psykoser (antipsykotika) på grund af en øget risiko for, at du får kramper, samt midler mod depression.
- tager flecainid, propafenon og metoprolol (mod hjerte- og karsygdomme), desipramin, clomipramin og nortriptylin (mod depression) og risperidon, thioridazin og haloperidol (antipsykotika). Det kan være nødvendigt at ændre dosis af Escitalopram Copharma.

Brug af Escitalopram Copharma sammen med mad og drikke

Du kan tage Escitalopram Copharma i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt (se afsnit 3 "Sådan skal du tage Escitalopram").

I lighed med en række lægemidler bør Escitalopram Copharma ikke kombineres med alkohol, selv om medicinen ikke forventes at reagere med alkohol.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller prøver at blive gravid. Hvis du er gravid, må du kun tage Escitalopram Copharma efter aftale med lægen.

Hvis du tager Escitalopram Copharma under de sidste 3 måneder af graviditeten, skal du være opmærksom på, at det kan indebære følgende virkninger for den nyfødte: vejtrækningsbesvær, blålig hud, anfald, forandringer i kropstemperatur, spiseproblemer, opkastning, lavt blodsukker, stive eller slappe muskler, voldsomme reflekser, skælven, nervøsitet, irritabilitet, sløvhed, konstant gråd, søvnighed og søvnbesvær. Kontakt omgående lægen, hvis dit nyfødte barn har nogle af disse symptomer.

Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Escitalopram Copharma. Når medicin som Escitalopram Copharma tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (PPHN). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.

Hvis du tager Escitalopram Copharma, mens du er gravid, må du ikke stoppe behandlingen brat. Kontakt lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Escitalopram Copharma, da Escitalopram Copharma går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist om Escitalopram Copharma påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Escitalopram Copharma kan nedsætte dømmekraft og færdigheder. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ESCITALOPRAM A-PHARMA

Tag altid Escitalopram Copharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er Voksne:

Depression

Den sædvanlige dosis Escitalopram Copharma er 10 mg én gang dagligt. Lægen kan øge denne dosis op til højst 20 mg dagligt. Der går som regel 2-4 uger, før virkningen af behandlingen indtræffer. For at fastholde virkningen skal behandlingen fortsættes i mindst 6 måneder efter symptomerne har fortaget sig.

Panikangst

Startdosis af Escitalopram Copharma er 5 mg en gang dagligt i den første uge, hvorefter doseringen øges til 10 mg dagligt. Lægen kan øge denne dosis yderligere op til højst 20 mg dagligt. Der går som regel 3 måneder, før du opnår den maksimale virkning af behandlingen. Behandlingen skal fortsættes i adskillige måneder. Tal med lægen.

Socialfobi

Den sædvanlige dosis Escitalopram Copharma er 10 mg en gang dagligt. Lægen kan enten nedsætte dosis til 5 mg dagligt eller øge dosis op til højst 20 mg dagligt afhængigt af, hvordan du reagerer på medicinen. Der går som regel 2-4 uger, før virkningen af behandlingen indtræffer. Behandlingen varer normalt 12 uger. Din læge kan vælge at forlænge behandlingen.

Generaliseret angst

Den sædvanlige dosis Escitalopram Copharma er 10 mg en gang dagligt. Lægen kan øge denne dosis op til højst 20 mg dagligt. Virkningen af behandlingen indtræffer fra første behandlingsuge. Lægen vil fortælle dig, hvor lang tid du skal fortsætte med at tage Escitalipram Copharma.

Obsessiv-kompulsiv tilstand

Den sædvanlige dosis Escitalopram Copharma er 10 mg en gang dagligt. Lægen kan øge denne dosis op til højst 20 mg dagligt. Der går som regel 2-4 uger, før virkningen af behandlingen indtræffer. Lægen vil fortælle dig, hvor lang tid du skal fortsætte med at tage Escitalopram Copharma.

Ældre:

Den sædvanlige startdosis hos ældre patienter over 65 år er normalt halvdelen af den sædvanlige startdosis hos voksne (2,5 mg til 5 mg en gang dagligt). Den maksimale daglige dosis er sædvanligvis også nedsat hos ældre patienter i forhold til den maksimale daglige dosis hos voksne. Dette skyldes, at medicinen udskilles langsommere hos ældre patienter end hos yngre patienter.

Børn og unge under 18 år:

Børn under 18 år må normalt ikke få Escitalopram Copharma. Yderligere oplysninger: se afsnit 2 ”Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Copharma”.

Du kan tage Escitalopram Copharma i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Tag tabletten med lidt vand. Lad være med at tygge den, da smagen er bitter.

Om nødvendigt kan tabletterne deles ved, at De først anbringer tabletten på en plan overflade med delekærven opad. Dernæst brydes tabletten ved at trykke nedad med en pegefinger i hver ende.

Behandlingens varighed

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Bliv ved med at tage Escitalopram Copharma, selv om der går nogen tid, før du mærker bedring.

Du må ikke ændre doseringen af Escitalopram Copharma uden først at have talt med lægen.

Bliv ved med at tage Escitalopram Copharma i den periode, lægen har anbefalet. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan symptomerne vende tilbage. Det anbefales at fortsætte behandlingen i mindst 6 måneder, efter at du har igen fået det godt.

Hvis du har taget for mange Escitalopram Copharma tabletter
Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet - også selv om du ikke føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosis kan for eksempel være svimmelhed, skælven, ophidselse, krampe, koma, kvalme, opkastning, forandringer i hjerterytmen, blodtryksfald eller forandringer i kroppens salt- og væskebalance.

Hvis du har glemt at tage Escitalopram Copharma
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage en dosis, og du kommer i tanke om det lige før sengetid, skal du tage den med det samme. Fortsæt med den sædvanlige dosis næste dag. Hvis du først kommer i tanke om det om natten eller næste dag, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte, som du plejer.

Hvis du holder op med at tage Escitalopram Copharma
Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Når du har gennemført den planlagte behandling, anbefales det normalt at stoppe med Escitalopram Copharma ved at nedtrappe dosis i løbet af nogle uger.

Når du holder op med at tage Escitalopram Copharma – og især hvis det sker brat – kan du få ophørssymptomer. Det er ganske almindeligt ved stop på behandlingen med Escitalopram Copharma. Risikoen er større efter brug af Escitalopram Copharma i længere tid eller i store doser, eller når doseringen nedtrappes for hurtigt. De fleste oplever, at symptomerne er milde og aftager af sig selv i løbet af to uger. Hos nogle patienter kan de dog være svære eller langvarige (2-3 måneder eller længere). Kontakt lægen, hvis du får svære symptomer, når du holder op med at tage Escitalopram Copharma. Lægen kan foreslå, at du begynder på tabletterne igen og dernæst bruger længere tid på at nedtrappe dem.

Ophørssymptomer omfatter svimmelhed (usikker på benene eller mister balancen), prikken/stikken, svien og (mindre almindeligt) fornemmelse som ved elektrisk stød også i hovedet, søvnforstyrrelser

(voldsomme drømme, mareridt, søvnløshed), angst, hovedpine, kvalme, opkastning, svedudbrud (også om natten), rastløshed eller ophidselse, skælven/rysten, forvirring eller desorientering, letpåkkelig eller irriterabel, diarré (tynd afføring), synsforstyrrelser, hjertebanken (palpitationer).

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Escitalopram Copharma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne går normalt over efter nogle få ugers behandling. Vær opmærksom på, at mange af disse bivirkninger også kan være symptomer på sygdommen, og de vil derfor aftage, når du begynder at få det bedre.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger *(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):*

- Blødninger i mave-tarm-kanalen (herunder endetarmen).

Sjældne bivirkninger *(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):*

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Selvmondsrelaterede hændelser. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. Se også under afsnittet ”Vær ekstra forsigtig med at tage Escitalopram Copharma.
- Hvis du får høj feber, hjertebanken, bliver forvirret, ryster, sveder og får pludselige muskel-sammentrækninger, kan det være tegn på en sjælden tilstand, der kaldes et serotonergt syndrom. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke kendt *(hyppigheden kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data):*

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.
 - Selv mordstanker, selvmordsadfærd. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Se også under afsnittet ”Vær ekstra forsigtig med at tage Escitalopram Copharma.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger *(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):*

- Kvalme.

Almindelige bivirkninger *(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):*

- Tilstoppet næse eller snue (sinuitis).
- Nedsat eller øget appetit.
- Angst, rastløshed, unormale drømme, problemer med at falde i søvn, søvnighed, svimmelhed, gaben, rysten, prikken eller snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
- Diarré, forstoppelse, opkastning, mundtørhed.
- Øget svedtendens.
- Muskel- og ledsmerter.
- Seksuelle forstyrrelser hos mænd (forsinket sædudtømning og rejsningsbesvær).
- Nedsat sexlyst hos mænd og kvinder.
- Problemer med at få orgasme hos kvinder.
- Træthed, feber.
- Vægtstigning.

Ikke almindelige bivirkninger *(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):*

- Nældefeber (urticaria), udslæt, kløe.
- Tænderskæren, ophidselse, nervøsitet, panikangst, forvirring.
- Søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser.
- Besvimelse. Ved normal puls, vejrtrækning og hurtigt opvågning, kontakt læge. I alle andre tilfælde ring 112.
- Store pupiller (mydriase), synsforstyrrelser.
- Ringen for ørerne (tinnitus).
- Hårtab.
- Usædvanlig kraftig menstruationsblødning (menoragi), uregelmæssig kraftig blødning (menoragi).
- Vægttab.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig eller uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hævelser i arme eller ben (ødem).
- Næseblod.

Sjældne bivirkninger *(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):*

- Aggressivitet, depersonalisering, hallucinationer.
- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke kendt *(hyppigheden kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data):*

- Påvirkning af leverens funktion. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene), skal du kontakte læge.
- Ufrivillige bevægelser, bevægelsesforstyrrelser.
- Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop.

- Blødninger i huden.
 - Øget urinemængde ved vandladning (for lav produktion af antidiuretisk hormon).
 - Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i sjældne tilfælde blive alvorlig med forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 - Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 - Mælkesekretion hos kvinder.
 - Opstemthed (manisk).
- Se også under afsnittet ”Vær ekstra forsigtig med at tage Escitalopram Copharma”.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted http://www.Sundhedsstyrelsen.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Brug ikke Escitalopram Copharma efter den udløbsdato, der står pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløb, toilet eller skraldespand.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Escitalopram Copharma filmovertrukne tabletter indeholder:
Aktivt stof: escitalopram. 1 Escitalopram Copharma filmovertrukket tablet indeholder 10 mg escitalopram (som escitalopramoxalat).

Øvrige indholdsstoffer:
Tabletkernen: mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), croscarmellosenatrium (E 468), kolloid vandfri silica, magnesiumstearat (E 470b).
Filmovertræk: hypromellose (E 464), titandioxid (E 171) og macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser
Escitalopram Copharma fås som 10 mg filmovertrukne tabletter.

Escitalopram Copharma 10 mg er ovale (ca. 8,1 x 5,6 mm), hvide filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side. Tabletterne kan deles i to lige store dele.

Escitalopram Copharma fås i følgende pakningsstørrelser:
28, 56 og 98 tabletter (blisterpakning).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Copharma ApS
Kanalholmen 14-18
2650 Hvidovre

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2013