

Colour Mock-Ups Intra Hoof-fit DK

This label will be used to cover the surface of the inner packaging of the product (a round plastic 430 g container). The same label will also be used to cover the outside surface of the outer packaging of the product (carton box container 6 containers). No package leaflet is available; all information is presented on the product label.

Aktive stoffer: Kobber 40 mg/g, zink 40 mg/g.
Hjælpestoffer: Tartrazin (E102), glycerol, carmellosematrium, natriumstivelsesglycolat type C, isopropylalkohol, rensset vand.
Bivirkninger: Ingen. Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsen netsted, www.laegemiddelstyrelsen.dk
Dato for ændring af teksten: 9. november 2017.
Anvendelsesmåde: Hvis det angrebne område

er snavset, skal det rengøres med en tør klud for at sikre direkte kontakt med gelen. Påfør midlet med en ren pensel. Det angrebne område skal dækkes fuldstændigt med gelen under behandlingen, der omfatter følgende trin:

- Dag 0: Påfør gelen på det angrebne område og læg en bandage.
- Dag 3: Fjern bandagen og påfør gelen igen uden at lægge en bandage.
- Dag 7: I tilfælde af utilstrækkelig heling påføres gelen igen uden brug af bandage.

Kontakt dyrlægen, hvis det angrebne område ikke er helet på dag 10. Med hver beholder følger en pensel. Bandage medfølger ikke. Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.



Væsentlige uforlideligheder: Må ikke blandes med andre lægemidler. **Drægtighed og diegivning:** Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Da optagelsen af de aktive stoffer er ringe, må skadelige effekter på fostret og den drægtige ko anses for usandsynlige ved den anbefalede dosis. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risikobenefit-forholdet. **Brugeradvarslere:** Midlet kan forårsage øjenirritation. I tilfælde af kontakt med øjnene skal der straks skylles med rigelige mængder vand. Midlet kan være farligt ved indtagelse. Undgå hånd-til-mund-kontakt. Undlad at spise, drikke eller ryge under anvendelsen af lægemidlet. Vask hænder efter brug.

Særlige opbevaringsbetingelser: Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. Må ikke opbevares over 25° C. Opbevares utilgængeligt for børn. Efter første åbning af beholderen: 1 måned. Brug ikke efter udløbsdatoen på etiketten. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned. **Bortskaffelse:** Ikke anvendte veterinære lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier. **Tilbageholdelsestid:** 0 dage. **Dyrearter:** Malkekvæg. **Indehaver af markedsføringstilladelsen / Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:** Intracare BV, Voltaweg 4, 5466 AZ Veghel, Holland.

MT nr: 51814 (HP).