

# Naratriptan 2care4 2,5 mg, filmovertrukne tabletter

## Naratriptan

### Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Naratriptan 2care4 til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

### Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Naratriptan 2care4
3. Sådan skal du tage Naratriptan 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

### 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Naratriptan 2care4 anvendes til behandling af hovedpine ved migræne. Naratriptan 2care4 hjælper med at fjerne hovedpinen og lindrer andre symptomer på et migræneanfald, såsom utilpashed (kvalme eller opkastning) og følsomhed overfor lys eller lyd.

Lægen kan have givet dig Naratriptan 2care4 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

### 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE NARATRIPTAN 2CARE4

#### Tag ikke Naratriptan 2care4

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for naratriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har problemer med hjertet, såsom forsnævring af arterierne (iskæmisk hjertesygdom) eller bryst smerter (angina) eller tidligere har haft et hjerteanfald.
- hvis du har moderat forhøjet eller højt blodtryk eller lettere forhøjet ukontrolleret blodtryk.
- hvis du har haft et slagtilfælde eller et mini-slagtilfælde (transitorisk iskæmisk attack eller TIA).
- hvis du har en alvorlig nyrtesygdom eller alvorlig leversygdom.
- sammen med anden medicin mod migræne, herunder medicin, som indeholder ergotamin, eller sammen med lignende medicin, såsom methysergid, eller sammen med triptaner eller 5-HT<sub>1</sub>-receptoragonister.

#### Vær ekstra forsigtig med at tage Naratriptan 2care4

Lægen har brug for at få nogle særlige oplysninger, før du tager Naratriptan 2care4.

Tal med lægen, inden du tager Naratriptan 2care4, hvis du har en eller flere andre risikofaktorer:

- hvis du er storryger eller bruger nikotinsubstitutionsbehandling.
- hvis du er mand og over 40 år.
- hvis du er kvinde, og menstruationen er ophørt.

#### Vær opmærksom på følgende

Nogle mennesker har i meget sjældne tilfælde udviklet alvorlige hjertelidelser, efter de har taget Naratriptan 2care4, også selvom de ikke tidligere har haft tegn på hjertesygdom.

Hvis et eller flere af ovenstående punkter gælder dig, kan det betyde, at du har en større risiko for at udvikle hjertesygdom. Derfor skal du fortælle det til lægen, så din hjertefunktion kan blive undersøgt, før Naratriptan 2care4 ordineres til dig.

Hvis du er overfølsom over for antibiotika, som kaldes sulfonamider kan du også være overfølsom over for Naratriptan 2care4. Hvis du er overfølsom over for et antibiotikum, men ikke er sikker på, om det er et sulfonamid, fortæl det da til lægen eller på apoteket, før du tager Naratriptan 2care4.

Fortæl det til lægen, før du tager Naratriptan 2care4, hvis du tager antidepressiv medicin, som kaldes SSRI'er (selektive serotoninoptagshæmmere), SNRI'er (serotonin noradrenalingenoptagshæmmere) eller naturlægemidlet Perikon (*hypericum perforatum*).

Hvis du tager Naratriptan 2care4 for ofte, kan det forværre dine hovedpiner. Fortæl det til lægen, hvis dette gælder dig. Din læge kan anbefale, at du stopper med at tage Naratriptan 2care4.

Du kan opleve at få smerter eller trykken for brystet, efter du har taget Naratriptan 2care4. Disse bivirkninger kan være intense, men de forsvinder normalt hurtigt. Hvis de ikke forsvinder hurtigt, eller hvis de bliver alvorlige, søg da omgående lægehjælp.

#### Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- Triptan eller 5-HT<sub>1</sub>-receptoragonister, som anvendes til behandling af migræne. Tag ikke Naratriptan 2care4 samtidig med disse former for medicin. Tag ikke disse former for medicin igen før mindst 24 timer efter, du har taget Naratriptan 2care4.
- Ergotamin, som også anvendes til behandling af migræne eller lignende medicin, såsom methysergid. Tag ikke Naratriptan 2care4 samtidig med disse former for medicin. Stop med at tage disse former for medicin mindst 24 timer før, du tager Naratriptan 2care4. Tag ikke disse former for medicin igen før mindst 24 timer efter, du har taget Naratriptan 2care4.

- SSRI (selektive serotoninoptagshæmmere, f.eks. citalopram, fluoxetin og sertralin) eller SNRI (serotonin noradrenalingenoptagshæmmere, f.eks. venlafaxin og duloxetin), som anvendes til behandling af depression. Anvendelse af Naratriptan 2care4 sammen med disse former for medicin kan medføre forvirring, svaghed og/eller manglende koordination. Fortæl det omgående til din læge, hvis du bliver påvirket på denne måde.
- Perikon (*hypericum perforatum*). Brug af naturmedicin, som indeholder perikon, mens du tager Naratriptan 2care4, kan øge risikoen for bivirkninger.

#### Brug af Naratriptan 2care4 sammen med mad og drikke

Du skal tage Naratriptan 2care4 med et glas vand.

#### Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

#### Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Naratriptan 2care4 efter aftale med lægen.

#### Amning

Du må ikke amme dit barn i 24 timer efter, du har taget Naratriptan 2care4. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket

#### Trafik- og arbejdssikkerhed

Der kan opstå døsighed og andre symptomer under et migræneanfald. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejder med maskiner.

#### Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Naratriptan 2care4

Naratriptan 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

### 3. SÅDAN SKAL DU TAGE NARATRIPTAN 2CARE4

Tag altid Naratriptan 2care4 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag først Naratriptan 2care4, efter din hovedpine er startet.

Tag ikke Naratriptan 2care4 for at forebygge et anfald.

Det er bedst at tage Naratriptan 2care4 ved de første tegn på migrænehovedpinen. Naratriptan 2care4 kan dog tages på et hvilket som helst tidspunkt under anfaldet. Du kan tage endnu en tablet efter 4 timer, medmindre du har nyre- eller leverskade. Tal med lægen.

Du må ikke tage flere end 2 tabletter indenfor 24 timer.

Hvis den første tablet ikke giver nogen virkning, må du ikke tage endnu en tablet for det samme anfald. Tal med lægen. Naratriptan 2care4 bør synkes hele med vand.

#### Den sædvanlige dosis er

##### Voksne (18 – 65 år)

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (2,5 mg), som synkes hel med vand.

##### Ældre (over 65 år)

Naratriptan 2care4 anbefales ikke til ældre over 65 år. Tal med lægen.

##### Børn og unge under 18 år

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Naratriptan 2care4.

##### Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

#### Hvis du har taget for mange Naratriptan 2care4 filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Naratriptan 2care4, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er uklarhed, spænding i nakken, træthed og koordinationsstab.

#### Hvis du har glemt at tage Naratriptan 2care4

Hvis du har glemt en dosis filmovertrukne tabletter, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke tage flere end 2 Naratriptan 2care4 filmovertrukne tabletter indenfor 24 timer.

#### Hvis du holder op med at tage Naratriptan 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

## 4. BIVIRKNINGER

Naratriptan 2care4 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

#### Alvortlige bivirkninger

**Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Smertes nederst i venstre side af maven eller blodig diarré (iskæmisk kolitis). Kontakt læge eller skadestue.

**Meget sjældne bivirkninger:** Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Smertes i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.
- Åndenød, angst, brystsmertes med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
- Krampe af hjertets kranspulsårer. Ring 112.

#### Ikke alvorlige bivirkninger

**Almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Snurrende fornemmelse, svimmelhed, døsighed.
- Kvalme, opkastning.
- Varmefornemmelse, ubehag/træthed.

**Ikke almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Synsforstyrrelser.
- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hjertebanken.
- Tyngdefornemmelse, trykken, knugen eller smerter i brystet, halsen eller andre dele af kroppen. Bivirkningerne kan være voldsomme, men de fortager sig normalt hurtigt.
- Let øget blodtryk, som kan vare i op til 12 timer, efter Naratriptan 2care4 er indtaget.

**Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Udslæt, nældefeber, kløe.
- Hævelse af ansigt. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

**Meget sjældne bivirkninger:** Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Dårlig blodcirkulation i arme og ben, som medfører smerter og ubehag. Kontakt lægen eller apoteket.

#### Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

E-mail: [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## 5. OPBEVARING

#### Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Naratriptan 2care4 ved almindelig temperatur.

Tag ikke Naratriptan 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

#### Naratriptan 2care4 2,5 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Naratriptan som naratriptanhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Lactose, vandfri; mikrokrySTALLINSK cellulose; silica, kolloid vandfri; croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.

Overtræk: Hypromellose (E464); titandioxid (E171); lactosemonohydrat; macrogol 3350; triacetin; quinolingult (E104); indigocarmin (E132) og gul jernoxid (E172).

#### Udseende og pakningsstørrelser

##### Udseende

Naratriptan 2care4 er lysegrønne tabletter, som er præget N T 2.5 på den ene side.

#### Pakningsstørrelser

Naratriptan 2care4 fås i pakningsstørrelser á 6 og 18 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømmervej 9

6710 Esbjerg V.

#### Ompakket og frigivet af

2care4

Tømmervej 9

6710 Esbjerg V.

Naratriptan 2care4 svarer til Naratriptan Teva.

**Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2013**