

Erycin[®] enterotabletter 250 mg og 500 mg

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Erycin[®] til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Erycin[®]
3. Sådan skal du tage Erycin[®]
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Erycin[®] er et antibiotikum af typen makrolid. Erycin[®] bruges til behandling af infektion.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Erycin[®]

Tag ikke Erycin[®] hvis du:

- er overfølsom over for erythromycin, anden medicin af samme type (makrolider) eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- tager allergimedicin (terfenadin)
- tager medicin mod migræne (ergotamin, dihydroergotamin)
- tager medicin mod skizofreni og psykoser (pimozid)
- tager medicin mod mave-tarmgener med halsbrand til følge (cisaprid)

Særlige forholdsregler

Erycin[®] skal anvendes med forsigtighed hvis du:

- har nedsat leverfunktion
- har sygdommen myasthenia gravis (muskelsvaghed), da den kan forværres ved behandling
- får langvarig eller blodig diare, hvilket kan være alvorligt og måske kræve behandling

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du tager Erycin[®].

Fortæl altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Erycin[®].

Brug af anden medicin

Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder medicin mod:

- allergi (terfenadin)
- psykoser og skizofreni (pimozid)
- mave-tarmgener med halsbrand (cisaprid)
- migræne (ergotamin, dihydroergotamin)

- svamp (fluconazol, itraconazol og ketoconazol)
- uregelmæssig hjerterytme (verapamil)
- forhøjet blodtryk (felodipin)
- Parkinsons syge, brystmerter eller hæmning af mælkekirtelproduktion (bromocriptin)
- astma (theofyllin)
- tuberkulose (rifampicin)
- angst og uro (midazolam, alprazolam, diazepam, buspiron)
- HIV (saquinavir)
- epilepsi (carbamazepin)
- depression (sertralin)

Desuden:

- kolesterolsænkende medicin (atorvastatin, lovastatin, simvastatin)
- sovemedicin (zopiclon, triazolam)
- hjertemedicin (digoxin, diltiazem)
- binyrebarkhormoner (methylprednisolon)
- blodfortyndende medicin (warfarin)
- medicin til at nedsætte immunforsvaret (tacrolimus, everolimus, ciclosporin)
- potensfremmende medicin (sildenafil)
- visse kræftsygdomme (vinblastin)

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Erycin® sammen med mad og drikkevarer?

Du bør tage Erycin® uden for måltiderne.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Erycin®, hvis du er gravid eller planlægger graviditet, men i visse tilfælde kan din læge vurdere, at behandlingen er nødvendig.

Amning

Erythromycin bliver udskilt i modermælken. Du må derfor så vidt muligt ikke tage Erycin®, hvis du ammer. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Erycin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Erycin®

Tabletten synkes hel med rigelig væske; tabletten må ikke deles eller knuses.

Du bør tage Erycin® uden for måltiderne.

Voksne: 250 – 500 mg 2 – 4 gange daglig. Dosis kan øges til 4 tabletter på 500 mg (i alt 2000 mg) 2 gange daglig eller 2 tabletter på 500 mg (i alt 1000 mg) 4 gange daglig ved alvorlige infektioner.

Børn (over 25 kg): 20 – 50 mg pr. kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 2 – 4 doser. Dosis afhænger af barnets vægt og fastlægges af lægen.

Du kan ikke bruge Erycin[®] tabletter til børn under 25 kg, da dosis er for høj. Du kan i stedet bruge Erycin[®] pulver til oral suspension. Følg lægens anvisning.

Ældre (over 65 år): Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Selvom bedring opnås allerede efter få dage, er det vigtigt at fortsætte med at tage medicinen i hele den periode, lægen har angivet. Ellers er der risiko for, at infektionen blusser op igen.

Har du taget for mange Erycin[®]?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Erycin[®], end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tegn på at du har taget for mange tabletter kan være mavegener med opkastning og smerter, gulsot og ømhed under højre ribbensbue (galdeophobning), forbigående tab af hørelsen, forstyrrelser i hjerterytmen.

Har du glemt at tage Erycin[®]?

Hvis du har glemt at tage en dosis Erycin[®], tag den da så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på tidspunktet for næste dosis, springes den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Erycin[®] kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):
Mavesmerter, kvalme, opkastninger, diare, appetitløshed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 100 behandlede):
Forhøjede leverenzymtal (ved blodprøve), forhøjede bilirubintal (ved blodprøve), udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 1.000 behandlede):
Nældefeber.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig overfølsomhedsreaktion med pludseligt udslæt, vejrtrækningsbesvær og eventuel besvimelse. Alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen, akut betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber (alvorlig), leverbetændelse (alvorlig).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Epileptiske anfald (alvorlig), kramper (alvorlig), alvorlige hudlidelser (betændelse i huden på hænder, fødder og omkring munden, kraftig afskalning af huden), alvorlig betændelse i tarmen (langvarig og blodig diare med mavesmerter eller feber), hallucinationer og vrangforestillinger, alvorlig forværring af sygdommen myasthenia gravis (muskelsvaghed), alvorlig forsnævring af maveporten hos spædbørn (ses ved voldsomme opkastninger).

Nyrebetændelse er en alvorlig bivirkning, hvor hyppigheden ikke er kendt. Den kan give smerter over lænden, feber og blod i urinen.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved alvorlige bivirkninger.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre, ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, kan du spørge lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "bivirkninger" på lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Erycin[®] skal opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere Information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Erycin[®] enterotabletter 250 mg og 500 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof er erythromycin. De øvrige indholdsstoffer er diethylphthalat, hypromellose (E 464), hypromellosephthalat, gelatine, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), natriumstivelsesglycollat, propylenglycol (E 1520) og vandfri kolloid silica (E 551).

Erycin[®] 500 mg indeholder desuden majsstivelse.

Udseende og pakningsstørrelser

Erycin[®] 250 mg er en hvid, rund, filmovertrukken tablet.

Erycin[®] 500 mg er en hvid, aflang, filmovertrukken tablet.

Erycin[®] findes i pakningsstørrelser à 12, 20, 24 og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde

Hvis du får brug for Erycin[®] i andre lande, så spørg efter medicin der indeholder erythromycin.

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret januar 2007