

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dipyridamol Alternova 200 mg depotkapsler, hårde

dipyridamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dipyridamol Alternova
3. Sådan skal du tage Dipyridamol Alternova
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af nogle dage.

Dipyridamol Alternova nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen og forhindrer derved dannelsen af blodpropper.

Dipyridamol Alternova bruges til at forebygge blodpropper i hjernen eller hvis du har haft en blodprop i hjernen eller har haft forbigående lammelser, eller føleforstyrrelser (slagtilfælde eller transitorisk iskæmisk attack - TIA).

Du kan tage kapslerne sammen med anden forebyggende medicin (acetylsalicylsyre) eller alene, hvis du ikke kan tåle acetylsalicylsyre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dipyridamol Alternova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Dipyridamol Alternova:

- hvis du er allergisk over for dipyridamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dipyridamol Alternova (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Dipyridamol Alternova, hvis du har:

- En alvorlig hjerte-karsygdom
- En sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis)

Hvis du skal have foretaget en test af din hjertefunktion, så skal du fortælle lægen, at du tager Dipyridamol Alternova . **Behandling med Dipyridamol Alternova kan påvirke resultatet af testen.** For at få et korrekt resultat kan det være nødvendigt at holde pause med Dipyridamol Alternova, inden testen foretages.

Børn

Dipyridamol Alternova bør ikke anvendes til børn, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med dipyridamol til børn.

Brug af anden medicin sammen med Dipyridamol Alternova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- Muskelsygdommen myasthenia gravis.
- Forhøjet blodtryk.
- Uregelmæssig hjerterytme (medicin indeholdende adenosin). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
- Astma eller KOL (f.eks. theophyllin eller andre xantiner).
- Anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin, acetylsalicylsyre).

Brug af Dipyridamol Alternova sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Dipyridamol Alternova i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Dipyridamol Alternova, hvis du er gravid, medmindre lægen vurderer, at det er strengt nødvendigt. Tal med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Dipyridamol Alternova, da dipyridamol bliver udskilt i modermælken. Tal med lægen.

Fertilitet

Der er ikke foretaget undersøgelser af dipyridamols virkning på fertiliteten hos mennesker. I dyreforsøg blev der ikke set nogen skadelige virkninger på fertiliteten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dipyridamol Alternova kan give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

3. Sådan skal du tage Dipyridamol Alternova

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Voksne

Den sædvanlige dosis er 1 kapsel 2 gange daglig, som regel én kapsel om morgenen og én kapsel om aftenen.

Kapslen kan tages i forbindelse med eller uafhængigt af måltider. Kapslerne skal synkes hele og må ikke tygges.

Alternativ dosering ved utålelig hovedpine

Hvis du får utålelig hovedpine i begyndelsen af behandlingen med Dipyridamol Alternova, skal du måske have en anden dosis. Tal med lægen.

Der kan forsøgsvis doseres med 1 kapsel ved sengetid og en lav dosis acetylsalicylsyre om morgenen. Da hovedpinen normalt forsvinder ved regelmæssig dosering, rådes du kraftigt til at vende tilbage til din normale dosering inden for en uge.

Brug til børn

Det frarådes at anvende Dipyridamol Alternova til børn.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Dipyridamol Alternova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dipyridamol Alternova, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Du kan få symptomer på overdosering, såsom varmek fornemmelse, rødmen, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine, hvis du har taget for mange Dipyridamol Alternova. Du kan også få hurtig puls, hurtigt åndedræt, lavt blodtryk, hjertekramper, bevidstløshed, mavebesvær, svækket vejrtrækning med blåfarvning af læber og negle, forlænget blødningstid og gulfarvning af huden.

Hvis du har glemt at tage Dipyridamol Alternova

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er kvalme og hovedpine. I de fleste tilfælde forsvinder disse bivirkninger ved fortsat brug.

Alvorlige bivirkninger:

Følgende bivirkninger er alvorlige og kan kræve øjeblikkelig behandling. Kontakt lægen eller nærmeste skadestue så hurtigt som muligt.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

- Angina pectoris (smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Hurtig puls.
- Et blodproblem, der hedder "trombocytopeni", og som kan forårsage blå mærker og langvarig blødning fra sår.
- Øget blødning under eller efter operation.

- Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med strammen for brystet og åndenød, hududslæt og kløe, hævelse af tunge, læber og ansigt.
- Galdesten med pludselige og hurtigt tiltagende smerter i midten af maven eller under højre brystben.
- Bronkospasme (vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald).

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

- Kvalme, hovedpine, svimmelhed, diarré.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

- Opkastning.
- Muskelsmerter.
- Udslæt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Svimmelhed eller besvimelse på grund af lavt blodtryk.
- Hædture.
- Nældefeber (urtikaria).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.
Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Åbn ikke beholderen, før du skal starte med at tage kapslerne. Hvis der er nogen kapsler tilbage efter 6 uger, skal de ikke bruges.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (efter EXP), der står på pakningen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dipyridamol Alternova indeholder:

- Aktivt stof: dipyridamol

- Øvrige indholdsstoffer: 96 % vinsyre-pellets (2 % saccharose og 2 % povidon K-30s); hypromellose E15; talcum; aakaciegummi, spraytørret; triacetin; povidon (PVP K30); simeticon-emulsion indeholdende: simeticon, macrogolcetostearylether, natriumbenzoat, rensset vand; methacrylsyre-ethylacrylat copolymer; hypromellosephthalat P55

Kapselskal: gelatine; titandioxid (E 171); rød og gul jernoxid (E 172)

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hårde orange gelatinekapsler med rød hætte. Dimension: 7,66 x 23,1 mm.

Kapslerne indeholder små gule pellets med langsom udløsning.

Pakningsstørrelser

Tabletbeholder indeholdende 1 stk. tørremiddel.

Pakningsstørrelser: 30, 50, 60, 100 eller 100 (2 x 50) kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S
Lodshusvej 11
4230 Skælskør
Danmark

Fremstiller

Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Sverige:	Dipyridamol Alternova
Norge:	Aponova

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2019