

Erycin[®] pulver til oral suspension 40 mg/ml

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Erycin[®] til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Erycin[®]
3. Sådan skal du tage Erycin[®]
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Erycin[®] er et antibiotikum af typen makrolid. Erycin[®] bruges til behandling af infektion.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Erycin[®]

Tag ikke Erycin[®] hvis du:

- er overfølsom over for erythromycin, anden medicin af samme type (makrolider) eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- tager allergimedicin (terfenadin)
- tager medicin mod migræne (ergotamin, dihydroergotamin)
- tager medicin mod skizofreni og psykoser (pimozid)
- tager medicin mod mave-tarmgener med halsbrand til følge (cisaprid)

Særlige forholdsregler

Erycin[®] skal anvendes med forsigtighed, hvis du:

- har nedsat leverfunktion
- har sygdommen Myasthenia gravis (muskelsvaghed), da den kan forværres ved behandling
- får langvarig eller blodig diare, hvilket kan være alvorligt og måske kræve behandling

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du tager Erycin[®].

Fortæl altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Erycin[®].

Brug af anden medicin

Fortæl lægen, hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder:

- medicin mod allergi (terfenadin)
- medicin mod psykoser og skizofreni (pimozid, clozapin)
- medicin ved mave-tarmgener med halsbrand (cisaprid)
- medicin mod migræne (ergotamin, dihydroergotamin)

- medicin mod svamp (fluconazol, itraconazol, ketoconazol)
- kolesterolsænkende medicin (atorvastatin, lovastatin, simvastatin)
- medicin mod uregelmæssig hjerterytme (verapamil)
- medicin mod forhøjet blodtryk (felodipin)
- medicin mod Parkinsons syge, bryst smerter eller hæmning af mælkekirtelproduktion (bromocriptin)
- medicin mod astma (theophyllin)
- medicin mod tuberkulose (rifampicin)
- medicin mod angst og uro (midazolam, alprazolam, diazepam, buspiron)
- sovemedicin (zopiclon, triazolam)
- hjertemedicin (digoxin, diltiazem)
- medicin mod HIV (saquinavir)
- medicin mod epilepsi (carbamazepin)
- medicin mod depression (sertralin)
- binyrebarkhormoner (methylprednisolon)
- blodfortyndende medicin (warfarin)
- medicin til at nedsætte immunforsvaret (ciclosporin, tacrolimus, everolimus)
- potensfremmende medicin (sildenafil)
- visse kræftsygdomme (vinblastin)

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Erycin® sammen med mad og drikkevarer?

Du skal tage Erycin® umiddelbart før et måltid.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Erycin®

Erycin® indeholder sorbitol (E 420). Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Erycin® indeholder xylitol, som kan have en afførende virkning. Energi: 10 kJ (2,4 kcal) pr. g xylitol.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Erycin®, hvis du er gravid eller planlægger graviditet, men i visse tilfælde kan din læge vurdere, at behandling er nødvendig.

Amning

Erythromycin bliver udskilt i modermælken. Du må derfor så vidt muligt ikke tage Erycin®, hvis du ammer. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Erycin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Erycin®

Det er bedst at tage medicinen umiddelbart før et måltid. Husk at ryste flasken godt. Afmål mængden med den vedlagte sprøjte eller i et måleglas. Du kan eventuelt blande den afmålte medicin med lidt vand eller saft.

Voksne: 10 ml (400 mg) 2 – 4 gange daglig. Dosis kan øges til i alt 100 ml (4 g) pr. døgn ved alvorlige infektioner. Følg lægens anvisninger.

Børn: Dosis afhænger af barnets vægt. Tal med lægen.

5 kg: 0,5 – 1,5 ml (20 – 60 mg) 4 gange daglig

10 kg: 1,5 – 3 ml (60 – 120 mg) 4 gange daglig

15 kg: 2 – 4,5 ml (80 – 180 mg) 4 gange daglig

20 kg: 2,5 – 6 ml (100 – 240 mg) 4 gange daglig

25 kg: 3 – 8 ml (120 – 320 mg) 4 gange daglig

30 kg: 4 – 9,5 ml (160 – 380 mg) 4 gange daglig

35 kg: 4,5 – 11 ml (180 – 440 mg) 4 gange daglig

40 kg: 5 – 12,5 ml (200 – 500 mg) 4 gange daglig

Ældre: Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Selvom bedring opnås allerede efter få dage, er det vigtigt at fortsætte med at tage medicinen i hele den periode, lægen har angivet. Ellers er der risiko for, at infektionen blusser op igen.

Har du taget for meget Erycin®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget mere Erycin®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for meget Erycin® kan du få mavegener med opkastning og smerter, gulsot og ømhed under højre ribbensbue (galdeophobning), forbigående tab af hørelsen, forstyrrelser i hjerterytmen.

Har du glemt at tage Erycin®?

Hvis du har glemt at tage en dosis Erycin®, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på tidspunktet for næste dosis, springes den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Erycin® kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Mavesmerter, kvalme, opkastninger, diare, appetitløshed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Forhøjede leverenzymtal (ved blodprøve), forhøjede bilirubintal (ved blodprøve), udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Nældefeber.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig overfølsomhedsreaktion ved pludseligt udslæt, vejrtrækningsbesvær og eventuelt besvimelse. Alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen, akut betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber (alvorlig), leverbetændelse (alvorlig).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Epileptiske anfald (alvorlig), kramper (alvorlig), alvorlige hudlidelser (betændelse i huden på hænder, fødder og omkring munden), alvorlig betændelse i tarmen (langvarig og blodig diare), hallucinationer og vrangforestillinger, alvorlig forværring af sygdommen Myasthenia gravis (muskelsvaghed), alvorlig forsnævring af maveporten hos spædbørn (ses ved voldsomme opkastninger).

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, kan du spørge lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "bivirkninger" på lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Opbevar Erycin® utilgængeligt for børn.

Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Efter åbning er Erycin® holdbar i 5 dage ved stuetemperatur eller 10 dage i køleskab.

6. Yderligere Information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Erycin® pulver til oral suspension 40 mg/ml indeholder

Det virksomme indholdsstof er erythromycin. De øvrige indholdsstoffer er natriumcarboxymethylcellulose (E 466), natriumcitrat (E 331) og rensset vand.

Smagsstof: Kirsebæraroma.

Sødestoffer: Saccharinnatrium (E 954), sorbitol (E 420) og xylitol (E 967).

Udseende og pakningsstørrelser

Erycin[®] er et hvidt pulver med lugt af kirsebær. Ved udlevering fra apoteket vil det være en hvid uklar væske med smag og lugt af kirsebær.

Erycin[®] oral suspension findes i pakningsstørrelser à 100 ml.

Markedsføring i Danmark

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret november 2006