

Naratriptan EuroPharma 2,5 mg, filmovertrukne tabletter

Naratriptan

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Naratriptan EuroPharma
3. Sådan skal du tage Naratriptan EuroPharma
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Naratriptan EuroPharma filmovertrukne tabletter indeholder naratriptan (hydrochlorid), som tilhører gruppen af lægemidler kaldet triptaner (også kendt som 5-HT₁ receptoragonister).

Du kan tage Naratriptan EuroPharma til behandling af migræneanfald med eller uden aura. Du kan ikke bruge Naratriptan EuroPharma til forebyggelse af migræne.

Ved migræne udvider blodkarrerne sig i hjernen. Naratriptan EuroPharma trækker de udvidede blodkar sammen og lindrer smerten. Naratriptan EuroPharma virker også mod den ledsagende kvalme og opkastning samt overfølsomhed over for lys og lyde.

Lægen kan have givet dig Naratriptan EuroPharma for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE NARATRIPTAN EUROPHARMA

Tag ikke Naratriptan EuroPharma hvis du

- er allergisk over for naratriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer. Angivet i punkt 6.
- Har eller tidligere har haft hjerteproblemer, såsom forsnævring af arterierne (iskæmisk hjertesygdom) eller brystsmærter (angina).
- har problemer med blodcirkulationen i benene, som kan medføre krampelignende smerter, når du går (perifer vaskulær lidelse).
- har haft en blodprop i hjertet eller hjernen eller har haft en hjerneblødning.
- har forhøjet blodtryk. Du kan muligvis tage Naratriptan EuroPharma, hvis du har let forhøjet blodtryk og er i behandling.
- har en alvorlig nedsat nyre- eller leverfunktion.
- samtidig tager anden medicin til behandling af migræne, herunder medicin indeholdende ergotamin, eller lignende medicin såsom methysergid eller andre triptaner eller HT₁ receptoragonister.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, skal du fortælle det til lægen og undlade at tage Naratriptan EuroPharma.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Naratriptan EuroPharma.

Tal med lægen, inden du tager Naratriptan EuroPharma

- hvis du ryger eller bruger nikotinplastre eller nikotinholdig medicin og især:
 - hvis du er mand og over 40 år, eller
 - hvis du er kvinde i overgangsalderen
- hvis du er overfølsom over for sulfonamider (lægemidler mod infektion).

I sjældne tilfælde har patienter fået alvorlige hjerteproblemer efter at have taget Naratriptan EuroPharma, selvom de ikke tidligere viste nogen tegn på hjerteproblemer.

Hvis nogle af de ovennævnte punkter gælder for dig, kan det betyde, at du har en større risiko for at få hjerteproblemer.

Tal med din lægen, så din hjertefunktion kan blive undersøgt, før Naratriptan EuroPharma ordineres til dig.

Hvis du er overfølsom over for sulfonamider (lægemidler mod infektion)

I så fald kan det være, at du også er overfølsom over for Naratriptan EuroPharma. Hvis du er overfølsom over for antibiotika, men ikke er sikker på, om det er et sulfonamid: Kontakt lægen, før du tager Naratriptan EuroPharma.

Hvis du tager Naratriptan EuroPharma ofte

Hyppig brug af Naratriptan EuroPharma kan forværre migræne.

Tal med lægen, hvis dette gælder for dig. Det kan være, at lægen råder dig til at stoppe med at tage Naratriptan EuroPharma.

Hvis du får smerter eller trykken for brystet, efter du har taget Naratriptan EuroPharma

Smerterne eller den trykkende fornemmelse kan være intens, men forsvinder ofte hurtigt. Hvis smerterne ikke forsvinder hurtigt eller bliver alvorlige: **Søg straks lægehjælp.** Punkt 4 i denne indlægsseddel indeholder mere information om mulige bivirkninger.

Hvis du tager medicin mod depression kalder SSRI'er (selektive serotonin genoptagshæmmere) eller SNRI'er (serotonin noradrenalin genoptageshæmmere)

Hvis du tager medicin der indeholder Escitalopram, Fluoxetin, Sertralin eller Venlafaxin, så tal med din læge eller apoteket, før du tager Naratriptan EuroPharma.

Brug af anden medicin sammen med Naratriptan EuroPharma

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- anden medicin mod migræne (f.eks. ergotamin, triptaner eller 5-HT₁ receptoragonister). Tag ikke Naratriptan EuroPharma på samme tid. Vent med at tage disse typer af medicin til mindst 24 timer efter du har taget Naratriptan EuroPharma.
- ergotamin eller methysergid til behandling af migræne. Tag ikke Naratriptan EuroPharma på samme tid. Der skal gå mindst 24 timer efter du har taget denne medicin, før du må tage Naratriptan EuroPharma. Vent med at tage denne type medicin til mindst 24 timer efter at du har taget Naratriptan EuroPharma.
- SSRI'er f.eks. citalopram, paroxetin, fluoxetin eller sertralin (selektive serotonin genoptagshæmmere) eller SNRI'er f.eks. venlafaxin eller duloxetin (serotonin noradrenalin genoptagshæmmere) til behandling af depression.
- Perikon (*hyperiku perforatum*). Hvis du tager Perikon sammen med Naratriptan EuroPharma, kan det øge risikoen for bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid eller måske er gravid, må du kun tage Naratriptan EuroPharma efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, skal du vente mindst 24 timer efter du har taget Naratriptan EuroPharma, før du ammer. Modernælk malket ud i denne periode skal smides bort og må ikke gives til dit barn. Naratriptan EuroPharma går over i modernælk. Hvis du ammer, må du kun tage Naratriptan EuroPharma efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Naratriptan EuroPharma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal dog være forsigtig ved bilkørsel eller betjening af maskiner, da migræne kan gøre dig døsig eller svimmel.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Naratriptan EuroPharma

Naratriptan EuroPharma indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE NARATRIPTAN EUROPHARMA

Tag altid Naratriptan EuroPharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Voksne (18-65 år)

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (2,5 mg) ved anfald.

Naratriptan EuroPharma kan tages under hele migræneanfaldet, men helst så tidligt som muligt efter migræneanfaldet er begyndt. Naratriptan EuroPharma må ikke bruges forebyggende mod migræneanfald.

Hvis den første tablet ikke virker og migrænen vender tilbage inden for et døgn, kan du tage en tablet til – dog tidligst 4 timer efter den første tablet.

Tag højst 2 tabletter i døgnet.

Tabletterne skal synkes hele med 1 glas vand.

Ældre over 65 år

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Børn under 18 år må normalt ikke få Naratriptan EuroPharma.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har alvorlig nedsat nyre- eller leverfunktion, må du ikke tage Naratriptan EuroPharma.

Hvis du har taget for mange Naratriptan EuroPharma filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er forhøjet blodtryk, uklarhed, trykken i nakken, træthed og manglende koordination evne.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Naratriptan EuroPharma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Åndenød, angst, bryst smerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemuskel eller blodprop i hjertet. Ring 112.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Snurren i alle dele af kroppen, svimmelhed.
- Kvalme, opkastning.
- Varmefølelse.
- Smerter.
- Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Stigning i blodtrykket.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hjerterbanken.
- Synsforstyrrelser.
- Fornemmelse af tyngde i hele kroppen.
- Trykkende eller knugende fornemmelse i hele kroppen

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Hududslæt, nældefeber, kløe.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Døsigthed.

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Sovende fornemmelse eller kuldefornemmelse i arme og ben, krampelignende smerter (*perifer vaskulær iskæmi*).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S., E-mail: sst@sst.dk, Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke Naratriptan EuroPharma efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Naratriptan EuroPharma indeholder:

Aktivt stof: naratriptan 2,5 mg (som naratriptanhydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer:

Kerne: Vandfri lactose, mikrokrySTALLINSK cellulose, vandfri colloid silica, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.

Tabletfilm: Hypromellose (E464), titandioxid (E171), lactose, monohydrat macrogol 3350, triacetin, quinolingult (E104), indigocarmin (E132), gul jernoxid (E172).

Pakningsstørrelser

Naratriptan EuroPharma fås i pakninger med 6 og 18 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringsstilladelsen

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk