

Indlægsseddel: Information til forbrugeren

Noscapin DAK 25 mg filmovertrukne tabletter

Noscapin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Noscapin DAK nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Noscapin DAK
3. Sådan skal du tage Noscapin DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Noscapin DAK (herefter kaldet Noscapin) er et hostestillende middel mod tør hoste uden slim.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Noscapin DAK

Tag ikke Noscapin

- hvis du er allergisk over for noscapinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Noscapin, hvis du

- har hoste med slim
- samtidig drikker alkohol

Brug af anden medicin sammen med Noskapin DAK

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

- nerve- eller sovemedicin
- blodfortyndende medicin (warfarin)

Brug af Noskapin sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Noskapin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du bør ikke tage Noskapin samtidig med alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Noskapin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Noskapin efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Noskapin efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Noskapin kan hos enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Noskapin indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Noskapin DAK

Tag altid Noskapin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tabletterne kan synkes hele, deles eller knuses og tages sammen med rigelig væske. Til mindre børn er det en god idé at knuse og opløse tabletten i vand eller saft.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1 – 2 tabletter 3 gange daglig.

Børn over 2 år: ½ tablet 2 – 3 gange daglig.

Du må kun bruge Noskapin til børn under 2 år efter aftale med lægen.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Noskapin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Noskapin tabletter, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er hududslæt, rødme, hovedpine, sløvhed, kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Noskapin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Ikke alvorlige: Hovedpine, døsighed.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer

Alvorlige: Hævelse af tunge, læber og ansigt, som kan medføre, at luftvejene blokeres (Quinckes ødem).

Ikke alvorlige: Nældefeber, overfølsomhedsreaktioner (allergi).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Ikke alvorlige: Brystsmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk,

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Noskapin utilgængeligt for børn.

Tag ikke Noscapin efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Noscapin DAK 25 mg filmovertrukne tabletter indeholder

- Aktivt stof: Noscapinhydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: Crospovidon (E 1202), gelatine, hypromellose 15 (E 464), kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520), talcum (E 553b) og rensset vand.
Farvestof: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Noscapin DAK 25 mg er hvide, hvælvede, filmovertrukne tabletter med delekærv.

Noscapin DAK 25 mg findes i pakningsstørrelser à 20 og 50 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
DK-2630 Taastrup

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o.
12 Księżstwa Łowickiego ST.
99-420 Łyszkowice
Polen

Denne indlægsseddel blev sidst ændret juli 2019