

INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL

VetZink 1000 mg/g, oralt pulver

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Vepidan ApS
Østerbrogade 23
9670 Løgstør

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

VetZink 1000 mg/g, oralt pulver
Zinkoxid

3. ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Zinkoxid 1000 mg/g

4. INDIKATIONER

Til behandling og kontrol af diarré hos fravænnede grise.

5. KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6. BIVIRKNINGER

Ingen kendte.

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

www.lmst.dk

7. DYREARTER

Fravænnede grise op til 10 uger gamle.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVej(E)

2500 mg zink pr. kg svarende til 3000 mg zinkoxid pr. kg foder i højst 14 dage.

Kun til oral anvendelse.

Når produktet blandes i foderet, skal der tages hensyn til den mængde zink, der allerede er i foderet, enten som naturligt forekommende zink eller tilsat med henblik på ernæringsmæssige formål. Tilsæt en mængde af produktet så den samlede mængde zink i foderet bliver 2500 mg zink pr. kg foder.

For at sikre tilstrækkelig fordeling af produktet i slutfoderet anbefales det at forblende produktet med en passende mængde af foderingredienserne, inden det iblandes slutfoderet. Slutfoderet bør anvendes som det eneste foder i højst 14 dage.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

9 OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Dyr under behandling må ikke slagtes til menneskeføde. Dyr til menneskeføde må tidligst slagtes 28 dage efter behandlingen er afsluttet.

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

- Opbevares tørt
- Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på etiketten efter EXP.

I salgspakning: 2 år

12. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige forsigtighedsregler for dyret
Ingen kendte.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet
Luftveje/indtagelse:

- Som ethvert pulver kan dette produkt medføre irritation af luftvejene
- Undgå inhalation
- Undgå støvdannelse. Undgå støvdannelse ved opblanding i foder. Ved tilstrækkelig udluftning eller ved anvendelse af et lukket system er det ikke nødvendigt at anvende indåndingsapparat. Ved eksponering for store mængder støv anvendes støvmaske P2
- Ved utilsigtet inhalation, sørg for at få frisk luft og kontakt en læge i tilfælde af gener. Ved utilsigtet indtagelse, skyl munden med vand og drik rigeligt med vand. Kontakt læge ved eventuelle gener.

Øjne:

- Som ethvert pulver kan dette produkt medføre irritation af øjne
- Undgå kontakt med øjne
- Brug beskyttelsesbriller
- I tilfælde af utilsigtet kontakt med øjne skal der skylles grundigt med rigelige mængder vand. Fjern herefter eventuelle kontaktlinser og fortsæt skylning. Kontakt læge ved eventuelle gener.

Hud:

- Som ethvert pulver kan dette produkt medføre hudirritation
- Undgå kontakt med hud
- Anvend arbejdstøj og beskyttelseshandsker (af læder, gummi eller bomuld). Vask hænder efter brugen
- I tilfælde af utilsigtet hudkontakt vask med sæbe og vand.

Andre forholdsregler vedrørende indvirkning på miljøet

Zink er meget giftig for organismer, der lever i vand, men kan påvirke væksten, overlevelse og reproduktion i både akvatiske og terrestriske planter og dyr. Zink er persistent i jord og kan ophobes i sedimenter. Toksicitet afhænger af miljøforhold og naturtyper. Risikoen for miljøet kan reduceres ved at overholde følgende foranstaltninger.

Ved spredning af gødning fra behandlede dyr skal den maksimale samlede zinkbelastning, som defineret i de nationale eller lokale regler, overholdes strengt. Ufortyndet gylle fra behandlede grise bør ikke anvendes på land. Fortyndning med gylle fra ubehandlede dyr og søer er påkrævet, så den samlede mængde af behandlet pattegrisgødning er så lav som mulig og aldrig over 40 %, som er forholdet mellem gylle fra fravænnede pattegrise og søer, når gyllen lagres sammen. Produktet bør ikke anvendes på bedrifter, hvor blanding af gødning fra behandlede dyr med gødning af ikke-behandlede dyr ikke er mulig.

Zinks biotilgængelighed, og dermed miljørisikoen, varierer mellem jordtyper. Gylle fra behandlede grise bør ikke spredes på sårbare jordtyper, der er blevet identificeret som frit drænende, sure (pH ≤ 6), sandede jorder.

Gylle, som indeholder zink bør ikke spredes på samme areal i på hinanden følgende år for at undgå ophobning af zink, som kan forårsage skadelige virkninger på miljøet.

Ved spredning af gylle fra behandlede dyr skal den mindste afstand til overfladevand, som defineret i de nationale eller lokale regler, strengt respekteres, og en stødpudezone på minimum 3 m anvendes, da gyllen indeholder zink, som kan forårsage skader i vandmiljøet.

Overdosering

Der er rapporteret levertoksisk effekt ved den anbefalede daglige dosis i 4 uger.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

EKSTREMT FARLIGT FOR FISK OG VANDLEVENDE ORGANISMER. Undgå at forurene overfladevand eller grøfter med produktet eller brugte beholdere.

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald, der stammer fra sådanne veterinærelægemidler, skal destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGGSEDLEN

01/2016

15. ANDRE OPLYSNINGER

Papirsæk (3-lags papirsæk. Det ydre papirlag er overtrukket med PE). 30 ml måleske (polystyren) er vedlagt.

Pakningsstørrelser: 10 kg og 25 kg.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.