

Furosemid DAK tabletter 5 mg og 40 mg

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Furosemid DAK til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Furosemid DAK
3. Sådan skal du tage Furosemid DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Du kan bruge Furosemid DAK som vanddrivende middel eller til at sænke blodtrykket.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Furosemid DAK

Tag ikke Furosemid DAK hvis du:

- er overfølsom over for furosemid eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Furosemid DAK
- er overfølsomhed over for antibiotika (sulfonamider)
- er overfølsom over for medicin mod sukkersyge (sulfonylurinstoffer)
- har for lavt blodtryk eller lider af væskemangel (dehydrering)
- har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt
- har en alvorlig leversygdom
- er gravid eller ammer

Særlige forholdsregler

Kontakt lægen hvis du:

- har forstørret prostata eller problemer med at lade vandet
- har for lavt blodtryk
- har diabetes
- lider af urinsyregigt (arthritis urica)
- har nyrer, der ikke fungerer normalt på grund af alvorlig leversygdom
- lider af en bindevævssygdom (LED, systemisk lupus erythematosus)
- har en arvelig stofskiftesygdom (porfyri)
- er overfølsom over for anden vanddrivende medicin (thiazider)

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Furosemid DAK.

Brug af Furosemid DAK sammen med mad og drikkevarer

Du skal tage Furosemid DAK mindst ½ time før eller 2 timer efter et måltid.

Du må ikke spise store mængder lakrids, hvis du er i behandling med Furosemid DAK, da det giver større risiko for forstyrrelser i kroppens salt- og væskeindhold.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Furosemid DAK

Furosemid DAK indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun tage Furosemid DAK efter lægens anvisning.

Amning

Du må ikke tage Furosemid DAK, da Furosemid DAK bliver udskilt i modermælken og kan nedsætte mælkeproduktionen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Furosemid DAK kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Furosemid DAK kan få blodtrykket til at falde. Det kan påvirke din koncentrationsevne, og du kan besvime.

Brug af anden medicin

Furosemid DAK kan ændre virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen af Furosemid DAK.

Fortæl lægen hvis du er i behandling med medicin mod:

- kramper (chloralhydrat)
- kræft (cisplatin)
- mavesår (sukralfat, karbenoxolon)
- mani (lithium)
- forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere)
- hjertesvigt (digoxin og angiotensin II receptor-antagonister)
- smerter (NSAID, acetylsalicylsyre)
- for højt kolesterol (cholestyramin og colestipol)
- binyrebarkhormon
- urinsyreigt (probenecid)
- visse kræft- og gigtsygdomme eller psoriasis (methotrexat)
- diabetes
- forstoppelse
- astma (teophyllin)
- afstødning af transplanterede organer (cyclosporin)
- epilepsi (phenytoin)
- infektion (af aminoglykosid-typen, cefalosporiner)
- hoste (lakrids)

Hvis du skal have en røntgenundersøgelse med kontrast, skal du oplyse lægen om, at du tager Furosemid DAK.

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også lægemidler, som ikke er på recept, lægemidler købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

3. Sådan skal du tage Furosemid DAK

Voksne:

Væskeophobninger i kroppen

Dosis er individuel fra en ½ tablet til 2 tabletter à 40 mg daglig, dvs. fra 20 mg til 80 mg daglig fordelt på 1 - 2 gange daglig morgen og/eller middag. Følg lægens anvisninger.

Forhøjet blodtryk

Dosis er individuel fra 1 til 2 tabletter à 40 mg daglig, dvs. fra 40 mg til 80 mg daglig.

Spædbørn og børn:

Den daglige dosis følger barnets vægt. Den højeste dosis vil normalt være 8 tabletter à 5 mg eller 1 tablet à 40 mg daglig. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at forhøje dosis. Følg lægens anvisninger.

Du skal tage Furosemid DAK på tom mave, dvs. mindst ½ time før eller 2 timer efter et måltid. Du kan synke tabletten hel, dele, tygge eller knuse den. Det er vigtigt, at du drikker rigeligt med vand, mens du er i behandling med Furosemid DAK.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Furosemid DAK?

Kontakt skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Furosemid DAK tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er meget lavt blodtryk, som kan udvikle sig til en choktilstand, akut nyresvigt, svigtende blodforsyning til hjernen eller hjertet, forvirringstilstande med hallucinationer (sansebedrag), lammelse med slaphed og eventuelt bevidstløshed, sløvhed og forvirring.

Hos børn er også set ændret mental tilstand, hovedpine, muskelsvaghed, krampeanfald.

Har du glemt at tage Furosemid DAK?

Har du glemt at tage en dosis Furosemid DAK, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på næste dosis, spring da den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Furosemid DAK kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Forstyrrelser i saltbalancen, nedsat kalium og magnesium i blodet, kalkaflejringer i nyrerne ved langvarig behandling af børn født med hjertefejl.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Påvirkning af hjernen ved alvorlig leverlidelse.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødninger fra hud og slimhinder og infektion, alvorlig hudsygdom (erythema multiforme), unormal høj legemstemperatur hos børn født med hjertefejl, vedvarende hørenedsættelse, besvimelse, akut vandladningsbesvær hos ældre mænd med forstørret blærehalskirtel.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig blodmangel, infektioner, akut bugspytkirtelbetændelse (feber og voldsomme smerter i maven), nedsat antal hvide blodlegemer og -plader med betændelses- og blødningstendens, alvorlig påvirkning af hjertefunktionen, vævsdød i benene hos ældre på grund af manglende blodtilførsel, betændelse i blodkar (vaskulit), gulsyn.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig leverlidelse og gulsot, forværring af lidelser med mindsket blodtilførsel, hjertefejl hos fosteret, stofskiftesygdom hos spædbørn, alvorlig nyresygdom med nyresvigt, meget hurtig puls, overfølsomhedsreaktioner som pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse, anfald af stofskiftesygdom (porfyri).

Ukendt hyppighed

Hjerterytmeforstyrrelser, choktilstand, kramper.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved alvorlige bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Påvirkning af væske- og saltbalancen i kroppen, øget mængde fedt i blodet, udslæt, kløe, nældefeber, blødninger i hud og slimhinder, øget hudfølsomhed for lys.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

Forhøjet blodsukker, væskemangel, øresusen, forbigående døvhed, lavt blodtryk ved overgang fra liggende til stående stilling, kvalme, opkastninger, diare, eksem med afskalning af huden, betændelse i hudens blodkar, væskefyldte blærer.

Ukendt hyppighed

Feber, tørst, forvirring, impotens, spiseforstyrrelser, irritation i mund og mave, mavekramper, forstoppelse, muskelkramper, kraftesløshed.

Der kan i sjældne og meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.

Ønsker du information om disse bivirkninger, kan du spørge lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under "Bivirkninger" på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Opbevar Furosemid DAK utilgængeligt for børn.

Brug ikke Furosemid DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Furosemid DAK tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er furosemid. De øvrige indholdsstoffer er:

Furosemid DAK 5 mg

Gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumsterat (E 470b) og talcum (E 553b).

Furosemid DAK 40 mg

Croscarmellosenatrium, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), povidon (E 1201), vandfri kolloid silica (E 551) og risstivelse.

Udseende og pakningsstørrelser

Furosemid DAK 5 mg er en rund, hvid tablet uden delekærv.

Furosemid DAK 40 mg er en rund, hvid tablet med delekærv påtrykt "AB22" på den ene side.

Furosemid fås i flere pakninger. Spørg lægen eller på apoteket.

Markedsføring i Danmark

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Hvis du får brug for Furosemid DAK i andre lande, så spørg efter medicin der indeholder furosemid.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret marts 2006