

INDLÆGSSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Granon® 200 mg, brusetabletter
Acetylcystein

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Granon uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Granon.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Granon
3. Sådan skal du tage Granon
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Granon er et slimløsnende middel, som bruges ved hoste med sejt slim.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Granon for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Granon®

Tag ikke Granon :

- hvis du er overfølsom over for acetylcystein eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Granon brusetabletter
- hvis du for nylig har hostet blod op

Du må ikke bruge Granon til børn under 5 år uden lægens anvisning.

Vær ekstra forsigtig med at tage Granon®:

- hvis du har eller har haft astma
- hvis du har eller har haft mavesår

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du bliver behandlet for en infektion med antibiotika (f.eks. cephalixin). Granon bør tages 1 - 2 timer forskudt af visse typer antibiotika. Spørg din læge eller apoteket hvis du er i tvivl.

Brug af Granon sammen med mad og drikke

Du kan tage Granon sammen i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Granon efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Granon efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Granon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Granon[®]

Granon indeholder 195 mg (8,5 mmol) natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. Sådan skal du tage Granon[®]

Hvis din læge har ordineret Granon til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brugsanvisning:

Opløs brusetabletten i et halvt glas vand og drik væsken.

Tag ikke Granon sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende slim, som skal hostes op. Det kan forstyrre nattesøvnen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1 brusetablet 3 gange daglig.

Børn over 5 år: 1 brusetablet 2 gange daglig.

Du må ikke bruge Granon til børn under 5 år uden lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Granon[®] brusetabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Granon, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Granon[®] brusetabletter

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. Bivirkninger

Granon kan, som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Kvalme, diaré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Åndedrætsbesvær.

Ikke alvorlige: Mavesmerter.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Hævelse i ansigtet, specielt i mund og svælg.

Ikke alvorlige: Udslæt, kløe, nældefeber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Granon utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Granon ved temperaturer over 30 °C.

Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Granon brusetabletter 200 mg indeholder:

Aktivt stof: Acetylcystein.

Øvrige indholdsstoffer er: Citronsyre (E 330), macrogol 6000 (E 1521), natriumcarbonat (E 500), natriumhydrogencarbonat (E 500), natriumsulfat (E 514), povidon (E 1201), simethiconemulsion.

Smagsstof: Citronaroma.

Sødestoffer: Natriumcyclamat (E 952) og saccharinnatrium (E 954).

Udseende og pakningsstørrelser

Granon er en hvid, rund brusetablet.

Granon findes i pakningsstørrelser à 15 og 25 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

LOSAN Pharma GmbH

Otto-Hahn-Strasse 13

D-79395 Neuenburg

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2011