

INDLÆGSSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Hexokain® 5 mg/2 mg sugetabletter Chlorhexidindihydrochlorid/benzokain

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

- Du kan få Hexokain® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Hexokain®.
- Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hexokain®
3. Sådan skal du tage Hexokain®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Du kan bruge Hexokain® sugetabletter ved mundbetændelse og tandkødsbetændelse. Hexokain® virker desinficerende og lokalbedøvende.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Hexokain® for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HEXOKAIN®

Tag ikke Hexokain®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for chlorhexidindihydrochlorid, benzocain eller et af de øvrige indholdsstoffer
- hvis du er overfølsom over for para-aminobenzoesyrestoffer
- hvis du ikke tåler visse sukkerarter (har arvelig fructoseintolerans)

Vær ekstra forsigtig med at tage Hexokain®

Tal med lægen, inden du tager Hexokain®, hvis du er allergisk over for sulfonamider, da du også kan være overfølsom over for de aktive stoffer i Hexokain®.

Tandpasta og større mængder pus (betændelse) hæmmer den desinficerende virkning af Hexokain®.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Hexokain® sammen med mad og drikke

Hexokain® er en sugetablet. Du bør derfor ikke tage Hexokain® i forbindelse med et måltid. Du kan tage sugetabletten lige før eller efter et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan tage Hexokain® under graviditet.

Amning

Du kan tage Hexokain®, når du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hexokain® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Hexokain®

Hexokain® indeholder maltitol (E 965). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE HEXOKAIN®

Hvis din læge har ordineret Hexokain® til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Sug sugetabletten til den er helt opløst i munden.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 sugetablet hver 2. - 3. time.

Børn: Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Har du taget for mange Hexokain®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Hexokain®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være følelsesløshed i munden og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Hexokain®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Hexokain[®] kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):
Forbigående misfarvning af tænder og tunge samt forandringer i smagsoplevelsen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 patienter):
Kontakteksem.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 patienter):
Allergiske reaktioner med hævelse i mund og svælg (kan være alvorlige), nældefeber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
Blåfarvning af læberne på grund af nedsat iltning af blodet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Hexokain[®] utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Hexokain[®] ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Hexokain[®] efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hexokain[®] sugetabletter indeholder

Aktive stoffer: 5 mg chlorhexidinhydrochlorid og 2 mg benzocain.

Øvrige indholdsstoffer: Akaciegummi (E 414), magnesiumstearat (E 470b), maltitol (E 965) og tragant (E 413).

Smagsstoffer: Eukalyptusolie og levomenthol.

Udseende og pakningsstørrelser

Hexokain[®] sugetabletter er hvide, runde tabletter.

Hexokain[®] sugetabletter findes i pakningsstørrelser à 20 og 40 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
4000 Roskilde

eller

NYCOMED Pharma Sp.z o.o.
12 Księstwa Łowickiego ST.
99-420 Łyszkowice, Polen

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2010