

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Hjertemagnyl® 150 mg filmovertrukne tabletter acetylsalicylsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Hjertemagnyl uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Hjertemagnyl.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjertemagnyl
3. Sådan skal du tage Hjertemagnyl
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hjertemagnyl er et blodfortyndende lægemiddel, der nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen, og forhindrer derved dannelsen af blodpropper. Hjertemagnyl nedsætter også blodets evne til at størkne.

Hjertemagnyl kan bruges til forebyggelse af nye blodpropper (akut iskæmisk hjertesygdom), hvis du tidligere har haft en blodprop i hjertet.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Hjertemagnyl for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjertemagnyl

Tag ikke Hjertemagnyl hvis du:

- er overfølsom (allergisk) over for acetylsalicylsyre, andre salicylater eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- tidligere har fået allergiske eller astma-lignende symptomer ved brug af smertestillende lægemidler (af typen NSAID eller salicylater)
- har mavesår (blodigt opkast og/eller sort afføring)
- har øget tendens til blødning fra hud og slimhinder f.eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader (trombocytopeni)
- har stærkt nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion
- er gravid i 7. – 9. måned (gælder kun doser over 100 mg/dag)

Børn under 15 år med feber må ikke få Hjertemagnyl.

Vær ekstra forsigtig med at tage Hjertemagnyl

Vær opmærksom på følgende:

- Du bør undgå at tage Hjertemagnyl sammen med smertestillende medicin (NSAID) i længere tid. Det kan øge risikoen for bivirkninger. Rådfør dig med din læge.
- Ældre bør, medmindre andet er aftalt med lægen, ikke tage Hjertemagnyl i længere tid pga. risiko for blødning fra mave og tarm.
- Børn under 15 år, som har virusinfektioner, må kun få Hjertemagnyl efter lægens anvisning
- Hjertemagnyl kan give åndenød, astmaanfald eller andre tegn på overfølsomhed som kløe og nældefeber. Dette skal du være opmærksom på, hvis du i forvejen har astma, høfeber, næsepolypper, anden luftvejssygdom eller allergi.
- Hjertemagnyl kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

Tal med din læge inden du tager Hjertemagnyl, hvis du:

- har eller har haft mave-tarmsygdom
- har fordøjelsesbesvær med halsbrand eller sure opstød (dyspepsi)
- har nedsat lever- eller nyrefunktion
- tager blodfortyndende medicin
- samtidig er i behandling med anden blodfortyndende medicin som vitamin K-antagonister eller heparin

Hvis du skal opereres, bør lægen vurdere ombehandlingen med Hjertemagnyl skal stoppes nogle dage før operationen. Det gælder også hvis du f.eks. skal have trukket en tand ud. Spørg din læge/tandlæge.

Oplys altid ved blodprøvekontrol eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med Hjertemagnyl. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin mod for megen mavesyre (syreneutraliserende medicin)
- medicin til behandling af sukkersyge
- blodfortyndende medicin (phenprocoumon, warfarin, clopidogrel, ticlopidin, heparin, dipyramidol)
- hjertemedicin (ACE hæmmere, abcximab, tirofiban, eptifibatid, , quinidin)
- vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton)
- smertestillende medicin (COX-2 hæmmere, NSAID fx ibuprofen) Du skal tage Hjertemagnyl mindst 2 timer før du tager ibuprofen.
- medicin mod urinsur gigt (probenecid, sulfinpyrazon)
- medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)
- medicin mod grøn stær (acetazolamid)

- medicin mod epilepsi (valproat)
- medicin mod depression og mani (SSRI)
- binyrebarkhormoner
- naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder ginkgo biloba
- vaccine mod skoldkopper

Brug af Hjertemagnyl sammen med mad og drikke

Du kan tage Hjertemagnyl i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Hjertemagnyl, hvis du er gravid i 7. – 9. måned. I de første 6 måneder af graviditeten kan Hjertemagnyl anvendes i så kort tid som mulig og i lavest mulige dosis og kun efter lægens anvisning.

Kvinder der planlægger at blive gravide

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du være opmærksom på, at du under længerevarende behandling med Hjertemagnyl kan have sværere ved at blive gravid. Din behandling bør derfor være så kortvarig som mulig og i lavest mulige dosis.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Hjertemagnyl hvis det er aftalt med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hjertemagnyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Hjertemagnyl

Hvis din læge har ordineret Hjertemagnyl til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletten med rigelig væske. Tabletten kan deles eller knuses.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 tablet daglig.

Ældre: På grund af risiko for blødning i mave-tarmsystemet bør Hjertemagnyl ikke tages vedvarende. Følg altid lægens anvisning, da lægen har vurderet, hvad der er bedst for dig.

Børn: Du må kun bruge Hjertemagnyl til børn under 15 år efter aftale med lægen. Hjertemagnyl må ikke anvendes til børn under 15 år med feber.

Nedsat lever- og nyrefunktion: Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Hjertemagnyl må ikke anvendes hvis du har svært nedsat lever- eller nyrefunktion.

Hvis du har taget for mange Hjertemagnyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Hjertemagnyl, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering (ved høje doser gennem længere tid) kan være:

Feber, hurtig vejrtrækning, svimmelhed, tinnitus, sløvhed, døvhed, væskemangel, mavesmerter, svedudbrud, kvalme, opkastning (evt. blodig), udvidelse af blodkar, hovedpine og forvirring.

Tegn på en pludselig eller svær forgiftning, som følge af overdosering kan være:

Rastløshed, påvirket vejrtrækning, lavt blodtryk, kvalme, opkastning, svaghed og nedsat kraft i musklerne, forvirring, svær hovedpine, uro og påvirket bevidsthed, lavt blodsukker (især hos børn), lever- eller lungepåvirkning, lavt blodtryk, vand i lungerne, brunfarvet af urin, kramper, blødningstendens, væske i hjernen, uregelmæssig hjerterytme, koma og svigtende vejrtrækning.

Hvis du har glemt at tage Hjertemagnyl

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Hjertemagnyl

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Hjertemagnyl. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Hjertemagnyl kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Blodet er længere tid om at størkne, halsbrand, sure opstød, mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Alvorlige: Åndedrætsbesvær hos astmapatienter, blødning i mave-tarmkanalen, der kan medføre sort afføring og/eller blodigt opkast

Ikke alvorlige: Tendens til blødninger, hovedpine, søvnløshed, irritation samt smerter eller ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen, kvalme, opkastning, diare

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Blødende sår i den øvre del af mave-tarmkanalen og blodigt opkast, allergisk reaktion (anafylaksi), væskeophobning under huden især ved læber og hals, skjulte indre blødninger, vejrtrækningsbesvær

Ikke alvorlige: Nældefeber, udslæt, Svimmelhed, døsighed, øresusen, allergiske reaktioner som astma og snue.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Blødninger i hjernen, blodmangel, forstyrrelser i dannelsen af de forskellige blodlegemer, blødning fra den øvre del af mave-tarmkanalen, hul på tarmen, nedsat nyrefunktion.

Ikke alvorlige: Tab af hørelsen (dosisrelateret), rødmen af huden, udslæt, lavt blodsukker, blødende betændte blodkar med feber, træthed og sløjhed.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

Alvorlige: Reyes syndrom udtrykt ved feber og ændring i blodets sammensætning, afskalning af huden, blæreformet udslæt og betændelse på huden.

Ikke alvorlige: Øget tendens til infektioner (for få hvide blodlegemer), betændelse i munden eller spiserøret, sår i nedre del af mave-tarmkanalen, forsnævring af tarmen, tarmbetændelse, forværring af irriteret tyktarm, dosisrelateret mild leverbetændelse.

Hjertemagnyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. på grund af påvirkning af leveren og forandringer i blodet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er beskrevet i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Hjertemagnyl utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Hjertemagnyl ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Hjertemagnyl efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Hjertemagnyl 150 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er acetylsalicylsyre. De øvrige indholdsstoffer er magnesiumhydroxid, hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse, mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520) og talcum (E 553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Hjertemagnyl tabletter er hvide, ovale, filmovertrukne tabletter med delekærv.
Hjertemagnyl findes i pakningsstørrelser à 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Takeda Pharma A/S
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde

Eller

Takeda GmbH Oranienburg
Lehnitzstrasse 70 – 98
DE-16515 Oranienburg, Tyskland

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2013