

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clarityn® 10 mg, tabletter loratadin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clarityn
3. Sådan skal du tage Clarityn
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Lægemidlets fulde navn er Clarityn.

Anvendelse

Clarityn tabletter indeholder det aktive stof loratadin, som tilhører en gruppe produkter kendt som ”antihi-staminer”.

Virkning

Clarityn er medvirkende til at reducere allergiske symptomer ved at forhindre virkningen af ”histamin”, som produceres i kroppen, når der er noget, du er allergisk overfor.

Hvornår Clarityn skal tages

Clarityn lindrer symptomer, som er forbundet med allergisk rhinit, (for eksempel høfeber), såsom nysen, løbende eller kløende næse og brændende og kløende øjne hos voksne og børn over 2 år, som vejer mere end 30 kg.

Clarityn kan også lindre symptomer på nældefeber (kløe, rødmen og udbredelse af udslæt).

Virkningen af Clarityn holder en hel dag og er medvirkende til, at du kan opretholde de daglige aktiviteter samt få din nattesøvn.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CLARITYN

Tag ikke Clarityn

- hvis du er allergisk over for loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clarityn (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Clarityn, hvis:

- du har en leversygdom
- du skal have taget en hudprøvetest for allergi. Tag ikke Clarityn i to dage før, du skal have foretaget denne test. Dette skyldes, at det kan påvirke testresultatet.

Hvis noget af ovenstående passer på dig (eller hvis du er i tvivl) så kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Clarityn.

Børn

Giv ikke Clarityn til børn under 2 år eller til børn i alderen 2 til 12 år, hvis de vejer under 30 kg. Der er andre formuleringer, der er mere egnede til børn i alderen 2 til 12 år, som vejer under 30 kg.

Brug af anden medicin sammen med Clarityn

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug af Clarityn sammen med alkohol

Effekten af alkoholiske drikke forstærkes ikke, når du tager Clarityn.

Graviditet og amning

Tag ikke Clarityn, hvis du er gravid.

Tag ikke Clarityn, hvis du ammer, da loratadin går over i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clarityn kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Clarityn indeholder lactose

Clarityn indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE CLARITYN

Tag altid Clarityn nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år

1 tablet 1 gang dagligt sammen med et glas vand, med eller uden mad.

Børn i alderen 2-12 år - dosis afhænger af barnets vægt

Hvis barnet vejer over 30 kg:

1 tablet 1 gang dagligt sammen med et glas vand. Kan indtages med eller uden mad.

Hvis barnet vejer under 30 kg

Giv ikke Clarityn tabletter. Der er andre formuleringer, der er mere egnede til børn i alderen 2-12 år, som vejer under 30 kg.

Børn under 2 år må ikke få Clarityn.

Voksne og børn med alvorlige leversygdomme

Voksne og børn, der vejer over 30 kg

1 tablet 1 gang hver anden dag sammen med et glas vand. Kan indtages med eller uden mad. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager dette lægemiddel.

Hvis du har taget for mange Clarityn tabletter

Hvis du har taget for mange Clarityn tabletter, skal du straks kontakte lægen eller apotekspersonalet. Der forventes ingen alvorlige konsekvenser, men du kan få hovedpine, hurtig hjerterytme eller føle dig søvnig.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clarityn, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Clarityn

- Hvis du har glemt en dosis tabletter, så tag den så snart du kommer i tanke om det og tag de næste tabletter som du plejer.
- Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger hos voksne og børn over 12 år er:

- døsighed
- hovedpine
- øget appetit
- søvnbesvær

De mest almindelige bivirkninger for børn mellem 2 og 12 år er:

- hovedpine
- nervøsitet
- træthed.

Efter markedsføring af loratadin er der også set følgende meget sjældne bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 10.000 personer):

- svære allergiske reaktioner
- svimmelhed
- uregelmæssig eller hurtig hjerterytme
- kvalme
- mundtørhed
- mavebesvær
- leverproblemer
- hårtab
- udslæt
- træthed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen der står på kartonen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke lægemidlet, hvis du kan se forandringer i tablettens udseende.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clarityn indeholder

- Aktivt stof: loratadin. Hver tablet indeholder 10 mg loratadin.
- Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Tablet.

Hvid til råhvid oval tablet som på den ene side har delekærv og er præget med en figur af en kolbe og skål og tallet ”10”. Clarityn tabletter findes i pakningsstørrelserne 2, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 60 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V.
Box 581
2003 PC Haarlem
Holland

Repræsentant i Danmark

MSD Danmark ApS
Lautrupbjerg 4
2750 Ballerup
Tlf.: +45 4482 4000
dkmail@merck.com

Fremstiller

Schering-Plough Labo N.V.
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
Belgien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig, Danmark, Finland, Island, Irland, Italien, Norge, Sverige: Clarityn

Belgien, Luxembourg, Holland: Claritine

Frankrig, Grækenland, Spanien: Clarityne

Tyskland: Lisino S

Portugal: Claritine, Alertrin

Storbritannien: Clarityn (Allergy)

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2014