

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Daivonex® 50 mikrogram/g creme

Calcipotriol

03-2014
P170585-1

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daivonex®
3. Sådan skal du bruge Daivonex®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Du kan bruge Daivonex® creme til behandling af psoriasis. I psoriasisud deler cellerne sig så hurtigt, at de ikke når at modnes. Dette viser sig ved rødme, skæl og fortykkelse af huden. Daivonex® creme får hudcellerne til at dele sig normalt.

Du kan bruge Daivonex® creme til behandling af psoriasis både alene eller sammen med hormonsalve eller hormon-creme.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DAIVONEX®

Brug ikke Daivonex® creme hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for calcipotriol eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- har forstyrrelser i kalkstofskiftet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Daivonex® creme

- hvis du har meget dårlige nyrer eller dårligt lever.

Vær opmærksom på følgende

- Du bør ikke bruge Daivonex® creme i ansigtet.
- Du skal vaske hænder, efter du har brugt Daivonex® creme for at undgå, at cremen kommer i ansigtet. Er det dine hænder, du skal behandle, skal du passe på med ikke at få Daivonex® creme i ansigtet.
- Hvis du bruger mere Daivonex® creme end anbefalet, kan du risikere, at indholdet af kalk i blodet bliver for højt. Symptomerne på for højt kalk i blodet er nedsat koncentrationsevne, træthed, forstoppelse, tørst og nedsat muskelkraft. Kalkindholdet i dit blod bliver normalt igen, når du stopper med at bruge Daivonex® creme.
- Undgå overdreven solbadning, overdreven brug af solarium og anden form for lysbehandling.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Daivonex®. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Daivonex®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du kan bruge Daivonex® creme sammen med anden medicin.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daivonex® creme påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Daivonex® indeholder cetostearylalkohol

Daivonex® creme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakt-eksem).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DAIVONEX®

Brug altid Daivonex® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Smør Daivonex® creme på den angrebne hud 1-2 gange dagligt. I starten af behandlingen skal du sædvanligvis bruge cremen 2 gange dagligt.

Derefter kan du efter behov nøjes med 1 gang dagligt. Bruger du Daivonex® creme sammen med hormoncreme eller hormonsalve, skal du ikke bruge de to ting samtidig. Brug f.eks. Daivonex® creme om morgenen og hormoncreme eller hormonsalve om aftenen.

Du må højst bruge 100 g Daivonex® creme om ugen.

Brugsanvisning

Smør cremen i et tyndt lag på den angrebne hud. Du bør ikke bruge cremen i ansigtet. Vask hænderne efter du har brugt cremen, så du undgår, at få cremen i ansigtet. Skal du bruge cremen på hænderne kan du evt. bruge et par bomuldshandsker.

Hvis du har brugt for meget Daivonex® creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Daivonex® creme, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har brugt for meget Daivonex® creme, kan indholdet af kalk i blodet blive for højt. Kalkindholdet i dit blod bliver normalt igen, når du stopper med at bruge Daivonex® creme.

Hvis du har glemt at bruge Daivonex® creme

Du må ikke bruge en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Hævelser i ansigtet. Kontakt straks lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Kløe, hudirritation, brændende og stikkende fornemmelse, tør hud, rødmen af huden, udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Kontakteksem, eksem, forværring af psoriasis.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
- Forhøjet kalk i urinen.
- Forbigående farveændringer i huden pga. pigmentforandringer, øget følsomhed af huden for lys, nældefeber, hævelse omkring øjnene.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Daivonex® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Daivonex® utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Daivonex® ved temperaturer over 25 °C.

Daivonex® er holdbar 6 måneder efter åbning.

Brug ikke Daivonex® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Daivonex® indeholder:

Aktivt stof: Calcipotriol 50 mikrogram/g som calcipotriol-monohydrat.

Øvrige indholdsstoffer: Macrogolcetostearylether, cetostearylalkohol, paraffinolie, hvid blød paraffin, dinatriumedetat, dinatriumphosphatdihydrat, glycerol 85%, chloroallylhexaminchlorid, allrac- α -tocopherol, rensed vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvid creme i tube.

Pakningsstørrelser

Daivonex® creme fås i pakningsstørrelser á 30 g og 100 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Daivonex® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2014