



INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

28045215

Marcaïn® Spinal tung 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning

bupivacain og glucose

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 - Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 - Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Marcaïn Spinal tung
3. Sådan bliver du behandlet med Marcaïn Spinal tung
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Marcaïn Spinal tung er et bedøvelsesmiddel (lokalanæstetikum), der anvendes til at bedøve dele af kroppen. Bedøvelse anvendes for at forhindre smerter i at opstå eller for at give smertelindring. Marcaïn Spinal tung anvendes:

- Som bedøvelsesmiddel ved operationer til voksne og børn i alle aldre.

Marcaïn Spinal tung anvendes som indsprøjtning i den nedre del af rygraden, når den nedre del af maven, dine ben eller den nedre del af kroppen, skal bedøves inden en operation (f.eks. en høfteoperation), ved indgreb i forbindelse med en fødsel eller ved indgreb i urinvejene.

Marcaïn Spinal tung virker ved midlertidigt, at forhindre nerverne i det bedøvede område i, at mærke smerte, varme eller kulde. Følelsen af tryk og berøring vil dog stadig kunne mærkes. På den måde bliver nerverne bedøvet i den del af kroppen, der skal opereres. I mange tilfælde betyder det, at nerverne til musklerne i området også vil blive blokeret, hvilket medfører midlertidig kraftløshed eller lammelse.

2. DET SKAL DU VIDE OM MARCAIN

Du må ikke få Marcain Spinal tung:

- hvis du er allergisk over for bupivacain eller andre lokalbedøvende midler af amidtypen, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Marcain Spinal tung (angivet i afsnit 6).
- i nogle tilfælde vil lægen helt undlade at anvende Marcain Spinal tung (f.eks. ved Biers blokade).

Skal du have en rygmarvsbedøvelse, må du ikke få
Marcaïn Spinal tung, hvis:

- du har akut aktiv sygdom i centralnervesystemet som meningitis, tumorer, børnelammelse, forhøjet eller mistanke om forhøjet tryk inden i kraniet.
- du har forsnævring i rygkanalen eller i en nerverodskanal og aktiv sygdom (f.eks. betændelse i hvirvelsøjlen, tuberkulose, tumor) eller nyere traume (f.eks. fraktur) på rygsøjlen.
- du har bodforgiftning.
- du har blodmangel med ikke særlig hurtigt el. voldsomt forløbende kombineret degeneration af rygmærven.
- du har infektion med *Streptococcus pyogenes* bakterie i eller omkring injektionsstedet.
- du har hjertesygdom eller hjertesvigt
- hvis dit blod ikke størkne på korrekt vis eller hvis du er i behandling med medicin som forhindrer blodet i at størkne (undtagelse: lavdosisheparin).
- du har hjertekar sygdomme i hjertemusklen, nedsat ilttilførsel til hjertemusklen eller hjerteklappmæssig oprindelse, hvis det indgreb, som skal udføres, kræver spredning af bedøvelsesmiddel så langt som til ryghvirvel T6.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Marcain Spinal tung

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, før du får
Marcaïn Spinal tung:

- hvis du har hjerterytmeforstyrrelser (AV-blok) eller anden hjertesygdom i øvrigt
- hvis du har en fremskreden leversygdom
- hvis du har nedsat nyrefunktion
- hvis dit blod har problemer med at størkne (koagulere) eller du får blodfortyndende medicin
- hvis du har blodmangel
- hvis du har nervesygdomme, f.eks. multipel sklerose (bindevævsomdannelse i hjernen og rygmærven), hemiplegi (lammelse i den ene kropsdel), paraplegi (dobbeltsidig lammelse), eller muskel-nerve-sygdomme generelt
- hvis du er ældre eller hvis din almentilstand er dårlig
- hvis du er gravid, og er sidst i graviditeten.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse end angivet i denne information. Lægens anvisninger skal følges.

Brug af anden medicin sammen med Marcaïn Spinal tung

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tal med lægen:

- hvis du får andre lokaltvirkende smertestillende medicin
- hvis du får propofol (kortvarigt virkende bedøvelsesmiddel)
- hvis du får medicin mod hjerterytmeforstyrrelser, f.eks. lidokain eller amiodaron
- hvis du får verapamil (medicin til behandling af hjerterytmeforstyrrelser samthjertekramper)
- hvis du får ACE-hæmmere (medicin mod for højt blodtryk)
- hvis du får blodfortyndende medicin
- hvis du tager cimetidin (medicin mod for meget mavesyre).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du får dette lægemiddel.

Marcaïn Spinal tung kan anvendes under graviditet og i ammeperioden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner på operationsdagen, da Marcain Spinal tung midlertidigt kan påvirke din motorik og reaktionsevne.

Marcain Spinal tung indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

3. SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED MARCAIN SPINAL TUNG

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen der kan ændre dosis.

Lægen beregner dosis til hver enkelt patient. Din dosis afhænger af din sygdom, alder, helbredtstilstand eller om du er gravid. Du vil få Marcain Spinal tung af en anæstesilæge.

Brug til børn og unge

Marcain Spinal tung gives som en langsom indsprøjtning i rygmarvskanalen af en anæstesi-læge, der har erfaring med anæstesi til børn. Dosis afhænger af alder og vægt, og vil blive bestemt af anæstesi-lægen.



AstraZeneca 	Perigord Job No.: 256929	Printable Colours:  Black	Non Print:  Profile  Technical Info	Perigordpremedia
	Market: Denmark			
	Version No.: 01			
	Date & Time: 29 June 2015 12:30			
	Ops Component Code: 28045215			
	Drawing Ref: 300x210_leaflet_v2			
	Code 128: 28045215			
	Description: Marcain Spinal Tung Leaflet			



Bar prints 100mm @ 100%

Font information
Font family: **Nimbus Sans**
Body text size: **9.0 pt**

Text area
for artwork

