

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mometasonfuroat Glenmark 1mg/g Creme mometasonfuroat

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Mometasonfuroat "Glenmark" til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mometasonfuroat "Glenmark".
3. Sådan skal du bruge Mometasonfuroat "Glenmark".
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mometasonfuroat "Glenmark" tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes topikale kortikosteroider. Det er klassificeret som et "potent kortikosteroid". Disse lægemidler smøres på hudens overflade for at lindre rødme og kløe på grund af visse hudlidelser.

Til voksne og børn i alderen 2 til 18 år bruges Mometasonfuroat "Glenmark" til at lindre rødme og kløe på grund af visse hudproblemer, der kaldes psoriasis eller dermatitis.

Psoriasis er en hudsygdom, hvor kløende, skælagtige, lyserøde pletter udvikler sig på albuer, knæ, hovedbund og andre dele af kroppen. Dermatitis er en tilstand, der skyldes hudens reaktion på f.eks. vaskepulver som gør, at huden bliver rød og klør.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mometasonfuroat "Glenmark"

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Mometasonfuroat "Glenmark":

- hvis du er allergisk over for mometasonfuroat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mometasonfuroat "Glenmark" (angivet i afsnit 6).
- på andre hudproblemer, da det kan gøre dem værre, særligt rosacea (en hudsygdom i ansigtet), akne (bumser), hudatrofi (tynd hud), eksem omkring munden, kløe ved kønsorganerne, bleeksem, forkølelsessår, helvedesild, skoldkopper, vorter, ulcereret hud, sår eller andre hudinfektioner.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger **Mometasonfuroat "Glenmark"**

- hvis dette lægemiddel anvendes på psoriasis, da det kan forværre sygdommen (f.eks. kan der opstå en form for psoriasis med pustler). Dine fremskridt bør kontrolleres regelmæssigt af din læge, da en sådan behandling kræver nøje tilsyn.
- hvis din hud bliver irriteret eller følsom efter brug af Mometasonfuroat "Glenmark", skal du stoppe med at bruge det og kontakte lægen.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Børn og unge

Mometasonfuroat "Glenmark" må ikke anvendes til børn under 2 år.

Brug af anden medicin sammen med Mometasonfuroat "Glenmark"

Fortæl altid det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Mometasonfuroat "Glenmark" indeholder lecithin (soja). Lecithin kan indeholde sojaprotein og kan derfor udløse allergiske reaktioner, hvis du er overfølsom overfor soja.

3. Sådan skal du bruge Mometasonfuroat "Glenmark"

Brug altid Mometasonfuroat "Glenmark" nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Til voksne og børn over 2 år gnides forsigtigt et tyndt lag af Mometasonfuroat Glenmark på det berørte hudområde én gang dagligt.

- Du skal kun bruge en lille mængde creme.
- En fingerspids creme (en linje fra spidsen af en voksens pegefinger til den første fure) er nok til at dække et område, der er dobbelt så stort som en voksens hånd. Brug aldrig mere end denne mængde, og brug aldrig cremen oftere, end hvad din læge eller apotekspersonalet har anvist.

Vær ekstra forsigtig:

- Brug ikke cremen i ansigtet i mere end 5 dage.
- Brug ikke cremen til børn, på nogen dele af kroppen, i mere end 5 dage.
- Påfør ikke cremen under dit barns ble, da det gør det nemmere for det aktive lægemiddel at trænge gennem huden og eventuelt forårsage nogle uønskede virkninger.
- Spørg din læge til råds, før du dækker det behandlede område med bandage eller plaster. Behandlede områder i ansigtet eller på børn må ikke dækkes af bandage eller plaster.
- Du må ikke bruge cremen på store områder af kroppen i lange perioder (for eksempel dagligt i mange uger eller måneder).

- Brug ikke i eller omkring øjnene, herunder øjenlågene.

Anvendelse til børn

Mometasonfuroat Glenmark anbefales ikke til børn under to år.

Hvis du har brugt for meget Mometasonfuroat "Glenmark"

Hvis du (eller nogen anden) ved et uheld kommer til at synke noget af cremen, vil det sandsynligvis ikke give nogen problemer. Kontakt dog lægen, hvis du er bekymret.

Hvis du bruger cremen oftere, end du skal, eller på store områder af kroppen, kan det påvirke nogle af dine hormoner. Hos børn kan det påvirke deres vækst og udvikling.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du ikke har brugt cremen, som du blev instrueret til, har brugt den for tit og/eller i for lang tid.

Hvis du har glemt at bruge Mometasonfuroat "Glenmark"

Hvis du har glemt at påføre cremen på det rette tidspunkt, så påfør den, så snart du kommer i tanke om det.

Hvis du holder op med at bruge Mometasonfuroat "Glenmark"

Hvis du har brugt cremen i lang tid, og dine hudlidelser lader til at være blevet bedre, må du ikke stoppe med at bruge cremen pludseligt. Hvis du gør det, kan du komme ud for, at din hud bliver rød, og du vil muligvis fornemme en sviende eller brændende fornemmelse. For at undgå det skal du tale med lægen, og denne vil gradvist reducere, hvor ofte du skal bruge cremen, til du standser behandlingen helt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Mometasonfuroat "Glenmark" kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle få personer kan opleve at få nogle af følgende bivirkninger efter brug af Mometasonfuroat Glenmark:

- allergiske hudreaktioner
- bakterieinfektioner og sekundære hudinfektioner
- akne
- betændelse og/eller infektion i hårsække
- tyndere hud
- røde mærker i forbindelse med hedeknopper
- tab af hudfarve
- brændende fornemmelse
- stikken
- kløe
- prikkende fornemmelse
- usædvanlig hårvækst
- opblødning af huden og strækmærker
- sløret syn

Andre bivirkninger, der kan forekomme ved brug af topiske kortikosteroider, er tør hud, hudirritation, hudbetændelse, hudbetændelse omkring munden og udvidelse af de små blodkar i huden.

Hvis bivirkningerne bliver alvorlige, eller du får bivirkninger, der ikke er anført i denne indlægsseddel, skal du sige det til din læge eller apotekspersonalet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevare lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Mometasonfuroat "Glenmark" efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Må ikke opbevares i køleskab (2°C til 8 °C) eller udsættes for frost..

Kassér tuben og overskydende creme 12 uger efter åbning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mometasonfuroat "Glenmark" indeholder:

- Aktivt stof: mometasonfuroat. Hvert gram Mometasonfuroat "Glenmark" indeholder 1 mg mometasonfuroat.
- Øvrige indholdsstoffer: hexylenglycol, vand, hvid bivoks (E901), hydrogeneret sojabønnelecithin, titandioxid (E171), aluminiumstivelseoctenylsuccinat, phosphorsyre og hvid blød paraffin, der indeholder spor af *all-rac-α*-tocopherol.

Udseende og pakningsstørrelser

Mometasonfuroat "Glenmark" er en hvid til råhvid blød creme.

Den fås i tuber med 10 g, 15 g, 20 g, 30 g, 50 g, 60 g eller 100 g creme.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Glenmark Arzneimittel GmbH
Industriestr. 31,
82194 Gröbenzell,
Tyskland

Repræsentant for Danmark:

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB,
Skeppsbron 5, vån 4
211 20 Malmö
Sverige

Fremstiller:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.,
Fibichova 143,
566 17 Vysoké Mýto,
Tsjekkia

Dette lægemiddel er godkendt i EEA's medlemslande under følgende navne:

Finland	Mometasonifuroaatti Glenmark 1mg/g emulsiovoide
Italien	Mometasone Sandoz GmbH
Norge	Mometason Glenmark 1mg/g Krem
Spanien	Mometasona KERN PHARMA 1mg/g Crema
Storbritannien	Mometasone Furoate 0.1% w/w Cream
Sverige	Mometason Glenmark 1mg/g kräm
Tyskland	Mometason Glenmark 1mg/g Creme
Polen	Eztom 1mg/g Krem

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019