

Indlægsseddel: Information til brugeren

Thiamazol Copyfarm 5 mg tabletter

thiamazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Thiamazol Copyfarm
3. Sådan skal du tage Thiamazol Copyfarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Thiamazol Copyfarm hæmmer dannelsen af stofskiftehormon i skjoldbruskkirtlen. Du kan bruge Thiamazol Copyfarm mod forhøjet stofskifte.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Thiamazol Copyfarm

Tag ikke Thiamazol Copyfarm

- hvis du er allergisk over for thiamazol, carbimazol, propylthiouracil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Thiamazol Copyfarm (angivet i punkt 6).
- hvis du oplever almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
- hvis du oplever påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot.
- hvis du oplever træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.
- hvis du er gravid og samtidig er i behandling med thyroideahormoner (hormoner produceret i skjoldbruskkirtlen).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Thiamazol Copyfarm.

Du skal stoppe behandlingen og kontakte din læge, hvis

- du får ømhed i halsen, sår i munden, feber eller andre symptomer på infektion.
- du får gulsot, feber, udslæt, kvalme og opkastninger.

Tal med lægen, hvis

- du tidligere har haft milde overfølsomhedsreaktioner (f.eks. allergiske udslæt, kløe).
- du har en leversygdom.
- du har forstørret skjoldbruskkirtel (struma), og den vokser under behandlingen med Thiamazol Copyfarm.
- du er gravid eller ammer.

Brug af anden medicin sammen med Thiamazol Copyfarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Tal med din læge, hvis du er i behandling med jod eller har været det i de seneste år.

Brug af Thiamazol Copyfarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Thiamazol Copyfarm i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Thiamazol Copyfarm. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Thiamazol Copyfarm, da Thiamazol Copyfarm går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Thiamazol Copyfarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Thiamazol Copyfarm

Tag altid Thiamazol Copyfarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

Svære tilfælde:

Begyndelsesdosis: 6 til 12 tabletter (30-60 mg) dagligt fordelt på flere doser. Følg lægens anvisning.

Lette tilfælde:

Begyndelsesdosis: 4 tabletter (20 mg) dagligt. Følg lægens anvisning.

Vedligeholdelsesdosis: 1 til 2 tabletter (5-10 mg) dagligt.

Hvis du har forstørret skjoldbruskkirtel, eller du har været i behandling med jod, kan lægen i begyndelsen af behandlingen ordinere meget store doser (f.eks. 24 tabletter (120 mg)).

Børn

Børn og unge (3-17 år):

Dosis afhænger af barnets vægt. Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er, og hvor længe behandlingen varer.

Børn på 2 år og derunder:

Børn på 2 år og derunder må kun få Thiamazol Copyfarm efter lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Thiamazol Copyfarm tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Thiamazol Copyfarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber, evt. mathed, koldsved, sult, forvirring, bevidstløshed pga. lavt blodglukose og påvirkning af leverens funktion. Ved længere tids overdosering kan du få struma og for lavt stofskifte.

Hvis du har glemt at tage Thiamazol Copyfarm

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tage aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Thiamazol Copyfarm

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: *kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter.*

- forstørret skjoldbruskkirtel. Kontakt lægen
- almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger: *kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter.*

- gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen
- blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger: *kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter.*

- træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen
- svær leversygdom. Søg straks læge eller skadestue
- udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen
- smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: *kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter*

- allergiske reaktioner med udslæt. Nældefeber
- smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse
- nedsat antal hvide blodlegemer (granulocytopeni).

Almindelige bivirkninger: *kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter.*

- feber
- almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge

- smerter i leddene (især i tommelfingerens grundled).

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter.

- smagsforstyrrelser, svimmelhed
- kvalme, opkastning og mavesmerter
- påvirkning af leverens funktion (ingen symptomer).

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter.

- hævede lymfeknuder
- betændelse i en spytkirtel.

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter.

- fald i glucoseniveau i blodet (Autoimmunt insulinsyndrom)
- muskelsmerter
- hårtab.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Thiamazol Copyfarm utilgængeligt for børn.
Opbevar Thiamazol Copyfarm i ydre karton.

Tag ikke Thiamazol Copyfarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Thiamazol Copyfarm indeholder:

Aktivt stof: Thiamazol 5 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, mikrokrySTALLinsk cellulose, majsstivelse, magnesiumstearat, natriumstivelsesglycolat.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid, rund, let hvælvet tablet mærket "T5" og med delekærv på den ene side.

Thiamazol Copyfarm fås i pakningsstørrelser á 50 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2015.