

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diclin 250 mg kapsler, hårde
Diclin 500 mg kapsler, hårde
dicloxacillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diclin
3. Sådan skal du tage Diclin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diclin er et lægemiddel, som indeholder det aktive stof dicloxacillin, som er et antibiotikum, der tilhører penicillingruppen. Det forhindrer bakterierne i at opbygge en ny cellevæg og virker derfor ved at dræbe de bakterier, som har forårsaget infektionen.

Diclin bruges til behandling af infektioner, der er forårsaget af visse typer af stafylokokker i blandt andet huden, vævet, leddene og knoglerne.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diclin:

Tag ikke Diclin:

- hvis du er allergisk over for dicloxacillin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diclin (angivet i punkt 6).
- hvis du er allergisk over for penicillin
- hvis du får en allergisk reaktion (type I) mod cefalosporiner

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diclin:

- hvis du er allergisk over for andre antibiotika, da Diclin kan reagere med dem. Spørg lægen, hvis du mener, at du kan være allergisk, men ikke er sikker.
- Hvis du er ældre og har gennemgået en operation som f.eks. en hofteoperation, bør lægen kontrollere din nyrefunktion før og under behandling med dette lægemiddel.
- Hvis du har diarré eller diarré med slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse

(colitis).

Børn

Diclin må ikke gives til for tidligt fødte og nyfødte børn.
Det frarådes at anvende Diclin til børn under 20 kg.

Brug af anden medicin sammen med Diclin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det omfatter:

- probenecid (et lægemiddel, som anvendes til at forstærke virkningen af antibiotika som f.eks. penicillin)
- p-piller. Virkningen kan blive nedsat.
- methotrexat (medicin til behandling af forskellige sygdomme, f.eks. autoimmune sygdomme), da dicloxacillin kan øge risikoen for bivirkninger af dette lægemiddel.
- tetracyclin (et bakteriehæmmende antibiotikum)

Tag ikke Diclin sammen med warfarin/dicoumarol (lægemidler mod blodpropper), da deres virkning kan blive nedsat.

Brug af Diclin sammen med mad og drikke

Diclin tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid.

Graviditet og amning

- Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
- Lang erfaring med dette lægemiddel under graviditet har ikke vist nogen skadelige virkninger. Dette lægemiddel bør dog kun anvendes under graviditet, hvis der er tvingende behov for det.
- Det er muligt, at spædbørn påvirkes, hvis de ammes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen kendt påvirkning.

Diclin indeholder natrium

Diclin indeholder 0,5 mmol (eller 11,5 mg) natrium pr. 250 mg.

Diclin indeholder 1 mmol (eller 23 mg) natrium pr. 500 mg.

Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn til dette.

3. Sådan skal du tage Diclin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis for voksne er 500 mg til 1 g 3 - 4 gange dagligt, men den kan øges til 6 g, hvis infektionen er alvorlig. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis for patienter med nyresvigt.

Brug til børn

Den anbefalede dosis er:

20-40 kg, 250 mg 3 - 4 gange dagligt. Dosis kan fordobles, hvis infektionen er alvorlig.

Over 40 kg, 500 mg 3 - 4 gange dagligt. Dosis kan sættes op til 6 g, hvis infektionen er alvorlig.

Diclin skal tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid. Kapslerne skal sluges hele med rigeligt vand. Patienten må ikke tage dem i liggende stilling eller umiddelbart før sengetid.

Hvis du har taget for meget Diclin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Diclin end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for mange kapsler, kan du få mavesmerter, krampe og nedsat bevidsthed. Kontakt **straks** lægen. Du kan have brug for lægehjælp. Tag medicinpakningen med.

Hvis du har glemt at tage Diclin

- Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
- Fortsæt derefter som normalt.
- Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

- Kredsløbskollaps og død (sjælden, kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer).
- Blod i urinen (sjælden, kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer).
- Alvorligt fald i antallet af hvide blodlegemer, hvilket giver større sandsynlighed for infektioner (agranulocytose) (sjælden, kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer).
- Nyresvigt (sjælden, kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)
- Ændret antal af blodceller på grund af en allergisk reaktion (eosinofili) (sjælden, kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)
- Fald i antal røde blodlegemer, som kan gøre huden bleggul og give svækkelse eller åndenød (hæmolytisk anæmi), (sjælden, kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)
- Fald i antallet af en bestemt type hvide blodlegemer, som nedbryder mikroorganismer (granulocytopeni), (sjælden, kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)
- Nedsat knoglemarvsfunktion (sjælden, kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)
- Nyresygdom (sjælden, kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter)
- Hurtig hævelse af slimhinderne i ansigtet (angioneurotisk ødem eller Quinckes ødem) (sjælden, kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)
- Alvorlig allergisk reaktion, som kan give vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed (sjælden, kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)
- En bestemt type overfølsomhedsreaktion (serumsyge) med symptomer som udslæt, kløe, ledsmerter (artralgi), feber, hævede lymfeknuder (lymfadenopati) og utilpashed. (ikke kendt: Hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)
- Leverskade (hepatotoksicitet) (ikke kendt: Hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Dette er meget alvorlige bivirkninger. Hvis du får en af ovenstående bivirkninger, skal du øjeblikkelig holde op med at tage medicinen og omgående søge læge.

Andre bivirkninger

Hvis en af følgende bivirkninger forekommer, skal du søge læge så hurtigt som muligt:

Almindelige bivirkninger: kan påvirke op til 1 ud af 10 personer.

- Kvalme
- Opkastning
- Fordøjelsesbesvær
- Luftafgang fra tarmene
- Diarré

- Udslæt

Ikke almindelige bivirkninger: kan påvirke op til 1 ud af 100 personer.

- Allergisk reaktion (nældefeber, som kan give hævelse i ansigt, tunge eller hals)
- Kløe

Sjældne bivirkninger: kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer.

- Fald i antallet af nogle bestemte hvide blodlegemer (neutropeni)
- Fald i antallet af hvide blodlegemer i blodet (leukopeni)
- Fald i antallet af blodplader, som øger risikoen for blødning eller blå mærker (trombocytopeni)
- Vanskelighed ved at frembringe lyd, når du forsøger at tale. Stemmen kan lyde meget svag og skrattende (hæshed)
- Nysen
- Mavesmerter
- Betændelse, som giver mavesmerter og diarré (colitis)
- Halsbrand
- Betændelse i halsen på grund af tilbagestrømning af mavesyre (oesophagitis)
- Dannelse af sår
- Leverbetændelse
- Muskelsmerter
- Ledsmerter
- Nyrebetændelse, som kan give hævede ankler eller forhøjet blodtryk (nephritis)
- Skummende urin (proteinuri)
- Ukontrolleret muskelsammentrækning i stemmebåndene (laryngospasme)
- Pludselig ufrivillig sammentrækning af lungerne som ved astma (bronkospasme)
- Fald i blodtrykket
- Hævelse i halsen (larynksødem)
- Feber

Ikke kendt: (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- Svampeinfektion i munden og/eller maven
- Allergisk reaktion (nældefeber, som kan give hævelse i ansigt, tunge eller hals)
- Ufrivillige muskeltrækninger
- Utilpashed
- Ændringer i blodprøveresultater (serumkreatinin, alkalisk fosfatase)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
- Efter første åbning af glasset: Kapslerne skal bruges inden 10 dage.
- Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

- den sidste dag i den nævnte måned.
- Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.
 - Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diclin indeholder:

- Aktivt stof: dicloxacillinnatrium.
En hård kapsel indeholder dicloxacillinnatriummonohydrat svarende til 250 mg dicloxacillin.
En hård kapsel indeholder dicloxacillinnatriummonohydrat svarende til 500 mg dicloxacillin.
- Øvrige indholdsstoffer: Silica, kolloid, magnesiumstearat
- Kapslerne er fremstillet af:
250 mg: Titandioxid (E171), gelatine
500 mg: Titandioxid (E171), Patent blue V (E131), Quinolingult (E104), gelatine

Udseende og pakningsstørrelser

Topas-glas.

Glassene er pakket i en papæske.

250 mg: 30 kapsler.

500 mg: 30, (2x30), (3x30), 50, (2x50) og 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 ApS
Tømmervej 9,
DK-6710 Esbjerg V
Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

250 mg, kapsler, hårde:

Danmark: Diclin

Norge: Diclin 250 mg kapsler, harde

500 mg, kapsler, hårde:

Danmark: Diclin

Norge: Diclin 500 mg kapsler, harde

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12-2016

Pakningsvedlegg: Information til patienten

Diclin 250 mg kapsler, harde
Diclin 500 mg kapsler, harde

dikloksacillin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
- Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Diclin er og hva det brukes mot
2. Hva du må vite før du bruker Diclin
3. Hvordan du bruker Diclin
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Diclin
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Diclin er og hva det brukes mot

Diclin er et legemiddel som inneholder virkestoffet dikloksacillin som er et antibiotikum av penicillintype. Det hindrer bakteriene å danne ny cellevegg og har således en dødelig effekt på bakteriene som forårsaker infeksjonen.

Diclin brukes ved infeksjoner forårsaket av såkalte stafylokokkbakterier i blant annet hud og bløtvev, ledd og skjelett.

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Diclin

Bruk ikke Diclin:

- dersom du er allergisk overfor dikloksacillin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
- dersom du er allergisk overfor penicillin
- dersom du har en allergisk reaksjon (type I) overfor cefalosporiner.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Diclin:

- Hvis du er allergisk mot andre antibiotika, da Diclin kan reagere med dem. Dersom du tror du kan være allergisk, men ikke er sikker, spør legen din om råd.
- Hvis du er eldre og har gjennomgått en operasjon slik som bytte av hoften, bør legen din undersøke nyrefunksjonen din før og i løpet av behandlingen med dette legemidlet.
- Hvis du får diaré eller tykktarmsbetennelse

Barn

Diclin kan ikke gis til for tidlig fødte eller nyfødte babyer.

Diclin anbefales ikke til barn som veier under 20 kg.

Andre legemidler og Diclin

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Dette gjelder:

- probenecid (et legemiddel som brukes til å forbedre virkningen av antibiotika slik som penicillin)
- p-piller. Den terapeutiske effekten kan bli påvirket.
- metotreksat (et legemiddel som brukes ved en rekke tilstander slik som autoimmune sykdommer) da giftigheten av dette legemidlet forsterkes av dikloksacillin.
- tetrasyklin (et bakteriostatisk antibiotikum).

Ikke ta Diclin med warfarin/dicoumarol (legemidler som brukes mot blodpropp) da deres effekt kan bli redusert.

Inntak av Diclin sammen med mat og drikke

Diclin bør tas minst 1 time før eller 2 timer etter et måltid.

Graviditet og amming

- Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
- Lang erfaring ved bruk av dette legemidlet under graviditet viser ingen risiko for skadelige effekter. Men dette legemidlet skal ikke brukes under svangerskap med mindre det er strengt tatt nødvendig.
- Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ingen kjent effekt.

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Diclin inneholder natrium

Diclin 250 mg inneholder 0,5 mmol (eller 11,5 mg) natrium per 250 mg.

Diclin 500 mg inneholder 1 mmol (eller 23 mg) natrium per 500 mg.

Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.

3. Hvordan du bruker Diclin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen til voksne er 500 mg til 1 gram 3-4 ganger daglig, men dette kan økes til inntil 6 gram ved alvorlige infeksjoner. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan dosejustering være nødvendig.

Bruk hos barn

Anbefalt dose er;

20-40 kg: 250 mg gitt 3-4 ganger daglig. Denne kan dobles ved alvorlige infeksjoner.

Over 40 kg: 500 mg gitt 3-4 ganger daglig. Denne kan økes til 6 g ved alvorlige infeksjoner.

Diclin bør tas minst 1 time før eller 2 timer etter måltid. Kapslene må svelges hele og skylles ned med rikelig med vann. De skal ikke inntas liggende eller umiddelbart før sengetid.

Dersom du tar for mye av Diclin

Dersom du får i deg for mange kapsler ved et uhell kan du få magesmerter, kramper eller redusert bevissthet. Snakk med legen din **umiddelbart**. Du kan trenge øyeblikkelig hjelp. Ta legemiddelpakningen med deg.

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Dersom du har glemt å ta Diclin

- Dersom du glemmer en dose, ta den så snart du husker det. Er det derimot nesten tid for en ny dose, hopp over den glemte dosen.
- Fortsett så med vanlig behandlingsregime.
- Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Alvorlige bivirkninger

- Vaskulær kollaps og død (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
- Blod i urinen (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
- Alvorlig reduksjon i antall hvite blodlegemer som øker infeksjonsfaren (agranulocytose) (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
- Nyresvikt (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
- Redusert antall blodcelletype forårsaket av en allergisk reaksjon (eosinofili) (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
- Reduksjon i antall røde blodlegemer som kan gjøre huden blek gul og gi slapphet eller åndenød (hemolytisk anemi) (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
- Redusert antall av en bestemt type hvite blodlegemer som angriper mikroorganismer (granulocytopeni) (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
- Benmargsdepresjon (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
- Nyresykdom (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
- Rask hevelse i slimhinnene i ansiktet (angioneurotisk ødem eller Quinckes ødem) (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
- Alvorlig allergisk reaksjon som fører til pustevansker eller svimmelhet (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
- En spesiell type hypersensitivitetsreaksjon (serumsykdom) med symptomer som utslett, kløe, leddsmerter (artragi), feber og hovne lymfeknuter (lymfadenopati), og sykdomsfølelse (ikke kjent: frekvensen kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
- Leverskade (hepatotoksisitet) (ikke kjent: frekvensen kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data).

Dette er svært alvorlige bivirkninger. Hvis noen av det ovennevnte inntreffer, slutte å ta legemidlet med en gang og søke akutt legehjelp.

Andre bivirkninger

Dersom noen av de følgende bivirkninger forekommer, kontakt legen din så snart som mulig:

Vanlige bivirkninger: oppstår hos 1 av 10 personer.

- Kvalme, oppkast
- Fordøyelsesbesvær
- Luft i magen
- Diaré
- Utslett

Mindre vanlige bivirkninger: oppstår hos 1 av 100 personer.

- Allergisk reaksjon (elveblest; som kan gi hevelse i ansiktet, tunge og hals)
- Kløe

Sjeldne bivirkninger: oppstår hos 1 av 1000 personer.

- Nedgang i antall spesifikke hvite blodlegemer (nøytropeni)
- Nedgang i antall hvite blodlegemer i blodet (leukopeni)
- Reduksjon i antall blodplater som øker risikoen for blødning eller blåmerker (trombocytopeni)
- Vansker med å produsere lyd når du prøver å snakke, stemmen din kan høres veldig svak og hakkete (heshet)
- Nysing
- Magesmerter
- Betennelse som forårsaker magesmerter og diaré (kolitt)
- Halsbrann
- Betennelse i halsen på grunn av oppstøt (øsofagitt)
- Utvikling av magesår
- Betennelse i leveren
- Muskelsmerter
- Leddsmerter
- Betennelse i nyrene som kan føre til hovne ankler eller høyt blodtrykk (nefritt)
- Skummende urin (proteinuri)
- Ukontrollert muskelkontraksjon i stemmebåndene (strupehodespasmer)
- Plutselig ufrivillig sammentrekning i lungene, som ved astma (bronkospasme)
- Blodtrykksfall
- Hevelse i halsen (larynksødem)
- Feber

Ikke kjent: (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):

- Soppinfeksjon i munnen og/eller mage
- Allergisk reaksjon (elveblest, som kan føre til hevelse i ansikt, tunge eller svelg)
- Ufrivillige rykninger i muskler
- Uvelhet
- Endringer i blodprøveresultater (serumkreatinin, alkalisk fosfatase)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk:

www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Diclin

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 25 °C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Etter første gangs åpning av glasset: Kapslene skal brukes opp innen 10 dager.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Diclin

- Virkestoff er dikloksacillinnatrium.
250 mg: Hver kapsel inneholder dikloksacillinnatriummonohydrat tilsvarende 250 mg dikloksacillin.
500 mg: Hver kapsel inneholder dikloksacillinnatriummonohydrat tilsvarende 500 mg dikloksacillin.
- Andre innholdsstoffer er: Silikondioksid, kolloidal og magnesiumstearat
Kapslene er laget av:
250 mg: Titandioksid (E171), gelatin.
500 mg: Titandioksid (E171), patentblått V (E131), kinolingult (E104), gelatin.

Hvordan Diclin ser ut og innholdet i pakningen

Topas glassflasker.

Hvert glass er pakket i en kartong.

250 mg: 30 kapsler.

500 mg: 30, (2 x 30), (3 x 30), 50, (2 x 50), 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

2care4 ApS

Tømrervej 9,

DK-6710 Esbjerg V

Danmark

Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

250 mg, kapsler, harde:

Danmark: Diclin

Norge: Diclin 250 mg kapsler, harde

500 mg, kapsler, harde:

Danmark: Diclin

Norge: Diclin 500 mg kapsler, harde

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert.

12-2016