

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Xylocaine® 10 mg/dosis kutanspray, opløsning

lidocain

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Xylocaine til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocaine
3. Sådan skal du bruge Xylocaine
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Xylocaine er et lokalbedøvende lægemiddel.

Du kan bruge Xylocaine til bedøvelse af hud eller til bedøvelse af slimhinder i forbindelse med lægeundersøgelser eller operationer i mund, hals, næse, luftvej, underliv eller endetarm.

Xylocaine må kun bruges til voksne og børn over 2 år.

2. DET SKAL DU VIDE VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE XYLOCAINE

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Xylocaine, hvis du:

- er allergisk over for lidocain eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xylocaine (angivet i punkt 6).
- er allergisk over for lokalbedøvende lægemidler af samme type som lidocain (amid-typen).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, inden du bruger Xylocaine, hvis du:

- har sår eller betændelse i området, hvorpå Xylocaine skal påføres.
- lider af en hjerte-karsygdom eller andre hjerteproblemer så som forstyrrelse i hjertets ledningsevne (hjerteblok) eller hjerterytmeforstyrrelser (Wolff-Parkinson-White syndrom).
- eller nogen i din familie lider af porfyri (en arvelig sygdom i stofskiftet).
- har alvorligt nedsat nyrefunktion.
- har en leversygdom.
- har epilepsi.
- har langsom puls eller for lavt blodtryk.
- har generelt dårligt helbred eller er ældre.

Vær opmærksom på følgende

- Brug af Xylocaine i mund og svælg, kan påvirke evnen til at synke. Dette kan øge risikoen for, at få Xylocaine ned i luftrøret. Følelsesløshed af tunge eller mundslimhinde kan desuden øge risikoen for bidskader. Du bør vente med at spise og drikke til ca. 2 timer efter bedøvelsen.

Brug af anden medicin sammen med Xylocaine

Fortæl det altid til lægen eller sundhedsspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin mod uregelmæssig hjerterytme (fx amiodaron).
- anden lokalbedøvende medicin eller medicin, der ligner lidocain (amid-typen).
- cimetidin (mod mavesår).
- beta-blokkere (mod forhøjet blodtryk).
- fluvoxamin (mod depression).

Xylocaine kutanspray, opløsning, indeholder alkohol.

Hvis du er i behandling med disulfiram (Antabus) eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Xylocaine uden først at tale med lægen eller sundheds-personalet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger Xylocaine.

Graviditet

Du kan bruge Xylocaine under graviditet.

Amning

Du kan bruge Xylocaine, selvom du ammer. Dog må Xylocaine ikke anvendes på brystvorterne lige før amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xylocaine kan i mindre grad og kortvarigt påvirke bevægelse og koordination. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Xylocaine indeholder ethanol

Xylocaine indeholder ethanol og bør derfor ikke anvendes til personer i behandling med disulfiram eller metronidazol. Brug af Xylocaine frarådes hos alkoholikere, børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE XYLOCAINE

Brug altid Xylocaine nøjagtigt efter lægens eller sundheds-personalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen.

Du vil normalt få Xylocaine af en læge eller tandlæge.

Sprayrørets spids er allerede bøjet til rette position, og der bør ikke ændres ved røret før brug. Spidsen på røret må ikke afkortes, da dette ødelægger sprayfunktionen. Sprayrør bør ikke genbruges og bør kasseres direkte efter brug.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 20-200 mg (2-20 pust). Dosering er individuel og afhænger af den smertelindring, som er nødvendig for dig, samt din fysiske tilstand.

Børn over 12 år, der vejer mindre end 25 kg: Dosering er individuel og afhænger af barnets vægt og fysiske tilstand.

Børn under 12 år: Dosering er individuel. Dosis bør ikke overstige 3 mg/kg ved anvendelse i struben, og 4-5 mg/kg ved anvendelse i næse, mund og svælg.

Til nyfødte og spædbørn anbefales en lidocain opløsning med lavere koncentration.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har brugt for meget Xylocaine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Xylocaine kutanspray, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er: prikkende, snurrende fornemmelse i læberne, følelsesløshed i tungen, uklarhed, skærpet hørelse, susen for ørerne (tinnitus), synsforstyrrelser, muskelrysten, bevidstløshed, krampeanfald og påvirkning af vejrtrækningen, for lavt blodtryk, langsom puls, hjerterytmeforstyrrelser og shock.

Hvis du har glemt at bruge Xylocaine

Brug aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at bruge en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Xylocaine

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Xylocaine kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud ad 10.000 patienter):

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Lokal irritation.
- Forbigående ondt i halsen, hæshed, mistet stemme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

- Opbevar Xylocaine utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Xylocaine, efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
- Sprayrør bør ikke genbruges og kasseres direkte efter brug.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Xylocaine 10 mg/dosis kutanspray, opløsning, indeholder:

- Aktivt stof: Lidocain 100 mg/ml svarende til 10 mg/dosis.
- Øvrige indholdsstoffer: Ethanol 96 %, macrogol 400, bananessens, menthol, saccharin og rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelse:

Xylocaine er en klar til næsten klar, svagt lyserød eller gul opløsning.

Xylocaine fåes i 50 ml glasflaske med pumpe-spray dosering (500 doser). Pakken indeholder et kort sprayrør.

Lange (ca. 230 mm) og korte (ca. 120 mm) sprayrør er tilgængelige i separate pakninger.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S,
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2. tv
DK-2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2015.

