

Indlægsseddel: Information til brugeren

Esomeprazol Orion 20 mg enterotabletter **Esomeprazol Orion 40 mg enterotabletter**

Esomeprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Esomeprazol Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Esomeprazol Orion
3. Sådan skal du tage Esomeprazol Orion
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Esomeprazol Orion indeholder et stof, der kaldes esomeprazol. Det tilhører en gruppe medicin, der kaldes syrepumpe-hæmmere. Det virker ved at nedsætte den mængde syre, der produceres i maven.

Esomeprazol Orion anvendes til behandling af følgende tilstande:

Voksne

- ”Gastroesophageal refluxsygdom” (GERD). Det er en sygdom, hvor syre fra maven går op i spiserøret (som forbinder svelget med maven) og medfører smerte, betændelse og halsbrand.
- Sår i mavesækken eller den øvre del af tarmen (tolvvingertarmen), der er inficeret med en bakterie, som kaldes ”*Helicobacter pylori*”. Hvis du har denne tilstand, kan din læge også ordinere antibiotika for at behandle infektionen og fremme helingen af såret.
- Mavesår, der skyldes medicin, der kaldes NSAID’ere (ikke-steroid betændelseshæmmende medicin). Hvis du tager NSAID’ere kan Esomeprazol Orion også forebygge sårdannelse.
- For meget syre i maven på grund af en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-Ellison syndrom).
- Langtidsbehandling efter forebyggende behandling med esomeprazol, givet i en blodåre, for tilbagevendende, blødende mavesår.

Unge på 12 år og derover

- Gastroesophageal refluxsygdom” (GERD). Det er en sygdom, hvor syre fra maven går op i spiserøret (som forbinder svelget med maven) og medfører smerte, betændelse og halsbrand.
- Sår i mavesækken eller den øvre del af tarmen (tolvvingertarmen), der er inficeret med en bakterie, som kaldes ”*Helicobacter pylori*”. Hvis du har denne tilstand, kan din læge også ordinere antibiotika for at behandle infektionen og fremme helingen af såret.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Esomeprazol Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Esomeprazol Orion:

- hvis du er allergisk over for esomeprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Esomeprazol Orion (angivet i afsnit 6).
- hvis du er allergisk over for andre protonpumpehæmmere (f.eks. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol).
- hvis du tager medicin, der indeholder nelfinavir (til behandling af hiv-infektion).

Tag ikke Esomeprazol Orion, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du ikke er sikker, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Esomeprazol Orion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Esomeprazol Orion:

- hvis du har alvorlige leverproblemer.
- hvis du har alvorlige nyreproblemer.
- hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som Esomeprazol Orion, der nedsætter syreindholdet i maven.

Esomeprazol Orion kan skjule symptomerne på andre sygdomme. **Derfor skal du straks tale med din læge, inden du begynder at tage, eller mens du tager Esomeprazol Orion, hvis du oplever noget af følgende:**

- du har et stort vægttab uden grund og har problemer med at synke.
- du får mavesmerter eller fordøjelsesbesvær.
- du begynder at kaste mad eller blod op.
- du har sort afføring (blodholdig afføring).

Hvis du har fået ordineret Esomeprazol Orion ”efter behov” skal du kontakte lægen, hvis symptomerne fortsætter eller ændrer karakter.

Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Esomeprazol Orion. Husk også at nævne andre negative virkninger såsom ledsmerter.

Når du tager protonpumpehæmmere som Esomeprazol Orion, kan din risiko for brud på hofte, håndled og ryg være øget en smule, især når de tages i en periode over et år. Fortæl det til din læge, hvis du har osteoporose, eller hvis du tager kortikosteroider (hvilket kan øge risikoen for osteoporose).

Børn og unge

Børn under 12 år

Esomeprazol Orion anbefales ikke til børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Esomeprazol Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det er fordi Esomeprazol Orion kan påvirke anden medicins virkning, og anden medicin kan påvirke Esomeprazol Orion.

Du må ikke tage Esomeprazol Orion, hvis du tager medicin, der indeholder **nelfinavir** (til behandling af hiv-infektion).

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager noget af følgende medicin:

- Atazanavir (anvendes til behandling af hiv-infektion).

- Clopidogrel (anvendes til forebyggelse af blodpropper).
- Ketoconazol, itraconazol eller voriconazol (anvendes til behandling af svampeinfektioner).
- Erlotinib (anvendes til behandling af kræft).
- Citalopram, imipramin eller clomipramin (anvendes til behandling af depression).
- Diazepam (anvendes til behandling af angst, som muskelafslappende middel eller ved epilepsi).
- Phenytoin (anvendes ved epilepsi). Hvis du tager phenytoin, vil din læge kontrollere dig, når du begynder eller stopper behandling med Esomeprazol Orion.
- Medicin, der fortynder dit blod, f.eks. warfarin. Det kan være nødvendigt for lægen at kontrollere dig, når du begynder eller stopper med at tage Esomeprazol Orion.
- Cilostazol (anvendes til behandling af claudicatio intermittens- en smerte i dine ben, når du går, der er forårsaget af en utilstrækkelig blodforsyning).
- Cisaprid (anvendes mod fordøjelsesbesvær og halsbrand).
- Digoxin (anvendes mod hjerteproblemer).
- Methotrexat (et kemoterapi medicin, der anvendes i høje doser til behandling af kræft) - hvis du tager en høj dosis af methotrexat, kan din læge midlertidigt stoppe din Esomeprazol Orion behandling.
- Rifampicin (anvendes til behandling af tuberkulose).
- Tacrolimus (organtransplantation)
- Perikum (hypericum perforatum) (anvendes til behandling af depression).

Hvis din læge har ordineret antibiotikabehandling med amoxicillin og clarithromycin sammen med Esomeprazol Orion til behandling af sår, der skyldes infektion med *Helicobacter pylori*, er det meget vigtigt, at du fortæller om al anden medicin, du tager.

Brug af Esomeprazol Orion sammen med mad og drikke

Du kan tage tabletterne sammen med mad eller på tom mave.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Lægen vil tage stilling til, om du kan tage Esomeprazol Orion i denne periode.

Det vides ikke, om Esomeprazol Orion udskilles i modermælk. Derfor bør du ikke tage Esomeprazol Orion, mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Esomeprazol Orion påvirker sandsynligvis ikke evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner. Bivirkninger såsom svimmelhed og synsforstyrrelser kan dog forekomme, som ikke almindelige eller sjældne bivirkninger (se afsnit 4). Hvis du er påvirket, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Esomeprazol Orion indeholder saccharose og lactose

Esomeprazol Orion indeholder saccharose og lactose, som er sukkertyper. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Esomeprazol Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

- Hvis du tager denne medicin i lang tid, vil din læge kontrollere dig (især hvis du tager det i mere end et år).
- Hvis din læge har sagt, at du skal tage denne medicin efter behov, skal du fortælle det til lægen, hvis dine symptomer ændrer sig.

Hvor meget skal du tage

- Din læge vil fortælle dig, hvor mange tabletter du skal tage, og hvor længe du skal tage dem. Det vil afhænge af din tilstand, hvor gammel du er, og hvor godt din lever fungerer.

- De anbefalede doser er angivet nedenfor.

Voksne i alderen 18 år eller derover

Til behandling af halsbrand, som skyldes gastroesofageal refluxsygdom (GERD):

- Hvis din læge har påvist, at dit spiserør er let beskadiget, er den anbefalede dosis én Esomeprazol Orion 40 mg enterotablet én gang dagligt i 4 uger. Hvis spiserøret ikke er helet op, kan lægen ordinere samme dosis i yderligere 4 uger.
- Når spiserøret er helet op, er den sædvanlige dosis én Esomeprazol Orion 20 mg enterotablet én gang dagligt.
- Hvis dit spiserør ikke er beskadiget, er den anbefalede dosis én Esomeprazol Orion 20 mg enterotablet dagligt. Når sygdommen er under kontrol, kan lægen bede dig om at tage medicinen efter behov, op til en maksimal dosis på én Esomeprazol Orion 20 mg enterotablet dagligt.
- Hvis du har alvorlige leverproblemer, kan lægen give dig en mindre dosis.

Til behandling og forebyggelse af nye sår, som skyldes infektion med *Helicobacter pylori*:

- Den anbefalede dosis er én Esomeprazol Orion 20 mg enterotablet to gange dagligt i en uge.
- Din læge vil også ordinere antibiotika, f.eks. amoxicillin og clarithromycin.

Til behandling af mavesår, der skyldes NSAID'ere (ikke-steroid betændelseshæmmende medicin):

- Den anbefalede dosis er én Esomeprazol Orion 20 mg enterotablet én gang dagligt i 4-8 uger.

Til forebyggelse af mavesår, hvis du tager NSAID'ere (ikke-steroid betændelseshæmmende medicin):

- Den anbefalede dosis er én Esomeprazol Orion 20 mg enterotablet én gang dagligt.

Til behandling af for meget mavesyre, der skyldes en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-Ellison syndrom):

- Den anbefalede dosis er Esomeprazol Orion 40 mg enterotablet to gange dagligt.
- Din læge vil tilpasse dosis efter dine behov og vil også afgøre, hvor længe du har behov for at tage medicinen. Den maksimale dosis er 80 mg to gange dagligt.

Opfølgende behandling efter forebyggende behandling med Esomeprazol Orion, givet i en blodåre, for tilbagevendende, blødende mavesår:

- Den anbefalede dosis er én Esomeprazol Orion 40 mg enterotablet én gang dagligt i 4 uger.

Brug til unge (12 år eller derover)

Til behandling af halsbrand, som skyldes gastroesofageal refluxsygdom (GERD):

- Hvis din læge har påvist, at dit spiserør er let beskadiget, er den anbefalede dosis én Esomeprazol Orion 40 mg enterotablet én gang dagligt i 4 uger. Hvis spiserøret ikke er helet op, kan lægen ordinere samme dosis i yderligere 4 uger.
- Når spiserøret er helet op, er den anbefalede dosis én Esomeprazol Orion 20 mg enterotablet én gang dagligt.
- Hvis dit spiserør ikke er beskadiget, er den anbefalede dosis én Esomeprazol Orion 20 mg enterotablet dagligt.
- Hvis du har alvorlige leverproblemer, kan lægen give dig en lavere dosis.

Til behandling og forebyggelse af nye sår, som skyldes infektion med *Helicobacter pylori*:

- Den anbefalede dosis er én Esomeprazol Orion 20 mg enterotablet to gange dagligt i én uge.
- Din læge vil også ordinere antibiotika, f.eks. amoxicillin og clarithromycin.

Sådan skal du tage medicinen

- Du kan tage tabletterne på et hvilket som helst tidspunkt af dagen.
- Du kan tage tabletterne sammen med mad eller på tom mave.
- Synk tabletterne hele sammen med vand. Du må ikke tygge eller knuse tabletterne. Det er fordi tabletterne indeholder små overtrukne kugler, som forhindrer, at medicinen nedbrydes af syren i din mave. Det er vigtigt, at de små kugler ikke bliver beskadiget.

Hvad du skal gøre, hvis du har besvær med at synke tabletterne

- Hvis du har besvær med at synke tabletterne:
 - Læg dem i et glas vand uden brus. Brug ikke andre former for væske.
 - Rør indtil tabletterne er opløst (blandingen er uklar). Drik blandingen med det samme eller indenfor 30 minutter. Omrør altid blandingen lige inden du drikker den.
 - For at være sikker på, at du får al medicin, skal du skylle glasset godt med et halvt glas vand og drikke det. De hårde bestanddele indeholder medicinen – du må ikke tygge eller knuse dem.
- Hvis du slet ikke kan synke, kan tabletten blandes med noget vand og trækkes op i en sprøjte. Således kan den gives gennem et rør direkte ned i din mave ("mavesonde").

Børn under 12 år

Esomeprazol Orion enterotabletter anbefales ikke til børn under 12 år.

Ældre

Der er ikke behov for dosisjustering hos ældre.

Hvis du har taget for mange Esomeprazol Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Esomeprazol Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at tage Esomeprazol Orion

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må aldrig tage en dobbeltdosis (to doser på samme tid), som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Esomeprazol Orion og straks kontakte en læge:

- Pludselig hvæsende vejrtrækning, hævelse af læber, tunge og svælg eller krop, udslæt, besvimelse eller synkebesvær (alvorlig allergisk reaktion).
- Rødme af huden med blærer og afskalning. Der kan også være alvorlige blærer og blødning på læber, i øjne, mund, næse og på kønsorganer. Dette kan skyldes "Stevens-Johnson syndrom" eller "toksisk epidermal nekrolyse".
- Gul hud, mørk urin og træthed, som kan være symptomer på leverproblemer.

Disse bivirkninger er sjældne, kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer.

Andre bivirkninger er:

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

- Hovedpine.
- Påvirkning af mave eller tarm: diarré, mavesmerter, forstoppelse, luft i maven (flatulens).
- Utilpashed (kvalme) eller opkastning.

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

- Hævede fødder og ankler.
- Søvnforstyrrelser (søvnbesvær).
- Svimmelhed, snurrende følelser som prikken og stikken, søvnighed.

- Følelse af ubalance (svimmelhed udløst fra øret).
- Mundtørhed.
- Forandring i blodprøver, som fortæller, hvordan leveren arbejder.
- Hududslæt, ujævnt udslæt (nældefeber), og hudkløe.
- Brud på hoften, håndleddet eller rygraden (hvis Esomeprazol Orion anvendes i høje doser og over lang tid).

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

- Problemer med blodet, f.eks. nedsat antal hvide blodlegemer eller blodplader. Dette kan medføre svaghed, blå mærker eller tilbøjelighed til at få infektioner.
- Lave værdier af natrium i blodet. Dette kan medføre svaghed, opkastning og kramper.
- Følelse af uro, forvirring eller depression.
- Smagsændringer.
- Synsforstyrrelser, f.eks. sløret syn.
- Pludselig hvæsende vejrtrækning eller åndenød (krampe i bronkierne).
- Betændelse i mundhulen.
- Infektion som kaldes ”trøske”, som kan påvirke tarmen, og som skyldes en svamp.
- Leverproblemer, herunder gulsot, som kan medføre gul hud, mørk urin og træthed.
- Hårtab (alopeci).
- Hududslæt, hvis huden udsættes for solskin.
- Ledsmarter (artralgi) eller muskelsmerter (myalgi).
- Følelse af almen utilpashed og mangel på energi.
- Øget svedtendens.

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer)

- Ændringer i blodbilledet, herunder agranulocytose (mangel på hvide blodlegemer).
- Aggressivitet.
- Se, føle eller høre ting, der ikke er der (hallucinationer).
- Alvorlige leverproblemer, der kan medføre leversvigt og hjernebetændelse.
- Pludseligt udbrud af alvorligt udslæt eller blærer eller hudafskalning. Dette kan være forbundet med høj feber og ledsmarter (erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
- Muskelsvaghed.
- Alvorlige nyreproblemer.
- Vækst af bryster hos mænd.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

- Hvis du tager Esomeprazol Orion i mere end tre måneder, kan koncentrationen af magnesium i dit blod falde. Lav magnesiumkoncentration kan ses som træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed og øget puls. Hvis du får nogen af disse symptomer, skal du omgående kontakte din læge. Lav magnesiumkoncentration kan også føre til en reduktion i kalium- eller calciumkoncentrationen i blodet. Det kan være, at din læge vil tage regelmæssige blodprøver på dig for at holde øje med magnesiumkoncentrationen.
- Betændelse i tarmen (der fører til diarré).
- Udslæt, eventuelt med ledsmarter.

Esomeprazol Orion kan i meget sjældne tilfælde påvirke de hvide blodlegemer og medføre nedsat immunforsvar.

Hvis du får en infektion med symptomer som feber med en **alvorligt** påvirket almentilstand eller feber med symptomer på en lokal infektion såsom ondt i halsen, svælget eller munden eller vandladningsbesvær, skal du så hurtigt som muligt kontakte lægen for at få taget en blodprøve, der undersøger, om du mangler hvide blodlegemer (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser om din medicin på det tidspunkt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakning og beholder efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Esomeprazol Orion skal anvendes inden for 100 dage efter åbning af beholderen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Esomeprazol Orion indeholder:

- Aktivt stof: Esomeprazol. Esomeprazol Orion enterotabletter findes i to styrker, der indeholder 20 mg eller 40 mg esomeprazol (som esomeprazolmagnesium).
- Øvrige indholdsstoffer:
 - Overtrukne sukkerkugler:* Sukkerkugler (saccharose og majsstivelse), ethylcellulose, magnesiumstearat.
 - Lægemidlovertræk:* Povidon K 90, magnesiumoxid, let (E 530).
 - Barriereovertræk:* Povidon, magnesiumoxid, let (E 530), magnesiumstearat.
 - Enteroovertræk:* Methacrylsyre - ethylacrylat copolymer (1:1) dispersion 30 % (indeholder natriumlaurilsulfat og polysorbat 80), diethylphthalat, talcum (E 553b).
 - Tabletterne:* Silicificeret mikrokrystallinsk cellulose (mikrokrystallinsk cellulose og kolloid vandfri silica, starlac (lactosemonohydrat og majsstivelse), copovidon K 28, macrogol 8000, crospovidon, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.
 - Filmovertræk:* Hypromellose (E 464), macrogol 8000, talcum (E 553b), titandioxid (E 171), kolloid vandfri silica, rød jernoxid (E172).
 - Tiltryk:* Opacode S-1-17823 sort blæk (indeholder propylenglycol, sort jernoxid (E172), shellac glasur).

Udseende og pakningsstørrelser

Esomeprazol Orion 20 mg enterotabletter

Teglstensrød, rund, hvælvet filmovertrukket tablet, præget med "20" på den ene side og glat på den anden side.

Esomeprazol Orion 40 mg enterotabletter

Teglstensrød, rund med skrå kanter, hvælvet filmovertrukket tablet, præget med "40" på den ene side og glat på den anden side.

Blister (Aluminium/Aluminium) eller HDPE-beholder (HDPE-beholder med snap-låg med forseglet plade og et hylster med silicagel som tørremiddel).

Pakningsstørrelser:

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 enterotabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S,
medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2016

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Administration gennem ernæringssonde

1. Læg tableten i en passende sprøjte og fyld sprøjten med ca. 25 ml. vand og ca. 5 ml luft. For nogle sonder kan det være nødvendigt med opløsning i 50 ml vand for at undgå at pellets tilstopper sonden.
2. Ryst sprøjten umiddelbart efter i ca. 2 minutter for at opløse tableten.
3. Hold sprøjten med spidsen opad og check at spidsen ikke er stoppet til.
4. Fastgør sprøjten til sonden, mens ovenstående position opretholdes.
5. Ryst sprøjten og vend den med spidsen pegende nedad. Injicér umiddelbart derefter 5-10 ml ind i sonden. Vend sprøjten om efter injektion og ryst (sprøjten skal holdes med spidsen opad for at undgå, at spidsen stopper til).
6. Vend sprøjten med spidsen nedad og injicér umiddelbart derefter yderligere 5-10 ml ind i sonden. Gentag denne procedure indtil sprøjten er tom.
7. Fyld sprøjten med 25 ml vand og 5 ml luft og gentag om nødvendigt trin 5 for at vaske evt. tilbageværende rester ned. For nogle sonder kan det være nødvendigt med 50 ml vand.